

# セパゾン錠 1

# セパゾン錠 2

# セパゾン散 1%

## 【この薬は？】

販売名	セパゾン錠 1 SEPAZON Tablets 1	セパゾン錠 2 SEPAZON Tablets 2	セパゾン散 1% SEPAZON Powder 1%
一般名	クロキサゾラム Cloxazolam		
含有量 (1 錠中 または 散 1g 中)	クロキサゾラムとして 1mg	クロキサゾラムとして 2mg	クロキサゾラムとして 10mg

## 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗不安薬で、ベンゾジアゼピン系と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳が興奮している状態をしずめ、不安、緊張などをやわらげる働きがあります。

- ・次の病気の人に処方されます。  
**神経症における不安・緊張・抑うつ・強迫・恐怖・睡眠障害**  
**心身症（消化器疾患、循環器疾患、更年期障害、自律神経失調症）における身体症候ならびに不安・緊張・抑うつ**
- ・次の目的で処方されます。  
**術前の不安除去**
- ・この薬は、体調が良くなったと自己判断で使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲むことが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することができません。医師または薬剤師にその旨を教えてください。
  - ・過去にセパゾンに含まれる成分で過敏症のあった人
  - ・急性閉塞隅角緑内障の人
  - ・重症筋無力症の人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。飲み始める前に医師または薬剤師にその旨を教えてください。
  - ・心臓に障害のある人
  - ・肝臓に障害のある人、腎臓に障害のある人
  - ・脳に器質的な障害のある人
  - ・低出生体重児、新生児、乳児、幼児または小児
  - ・高齢の人
  - ・衰弱している人
  - ・中等度または重篤な呼吸不全のある人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。医師の指示どおりに飲んでください。

[神経症・心身症の人]

販売名	セパゾン錠1	セパゾン錠2	セパゾン散1%
1日量	3～12錠	1.5～6錠	300～1200mg
飲む回数	1日3回		

#### [術前の不安除去の場合]

販売名	セパゾン錠1	セパゾン錠2	セパゾン散1%
1回量 (手術前)	クロキサゾラムとして 体重1kgあたり0.1~0.2mg		

#### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

#### ●飲み忘れた場合の対応

##### [神経症・心身症の人]

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

##### [術前の不安除去の場合]

決して2回分を一度に飲まないでください。

#### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

誤って多く飲んだ場合、異常を感じたら、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

### 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こる事があるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。
- ・この薬を続けて飲んでいくと、薬をたくさん飲みたい、薬がないといられない気持ちになるなど、薬物依存の症状があらわれることがあるので、長期間の使用は避けることとされています。このような症状があらわれたら、医師に連絡してください。また、この薬の量を急激に減らしたり、中止したりすることで、痙攣発作、せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚、妄想などの離脱症状があらわれることがあるので、この薬を中止する場合には、徐々に減量されます。この薬の飲む量や飲む期間については医師の指示に従ってください。
- ・アルコール飲料は、この薬に影響しますので控えてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳中の方は授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいくことを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
依存性 いぞんせい	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、手足のふるえ、発汗、幻覚、不眠
刺激興奮 しげきこうふん	口数が多くなる、大声で叫ぶ、周囲に暴力をふるう、器物を破壊する、些細なことで怒る

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発汗
頭部	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、不眠、口数が多くなる、大声で叫ぶ、周囲に暴力をふるう、器物を破壊する、些細なことで怒る、幻覚
手・足	手足のふるえ

## 【この薬の形は？】

販売名	セパゾン錠 1	セパゾン錠 2	セパゾン散 1%
PTP シート			—
形状	素錠 	素錠 	散剤 (微細な粒を含む粉末) 
直径	6.0 mm	7.0 mm	—
厚さ	1.9 mm	2.4 mm	—
重さ	75 mg	120 mg	—
色	白色	白色	白色
識別コード	NF125	NF126	—

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	セパゾン錠1	セパゾン錠2	セパゾン散1%
有効成分	クロキサゾラム（日局）		
添加物	乳糖水和物、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム	D-マンニトール、乳糖水和物、バレイシヨデンブン、ヒドロキシプロピルセルロース	

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・この薬は吸湿すると微黄色～淡黄色に変化することがありますので、光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：アルフレッサ ファーマ株式会社

(<https://www.alfresa-pharma.co.jp/>)

製品情報部 くすり相談室

電話番号：0120-060334

受付時間：9時～17時

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）