

患者向医薬品ガイド

2021年9月更新

ミダフレッサ静注 0.1%

【この薬は？】

販売名	ミダフレッサ静注 0.1% MIDAFRESA Injection 0.1%
一般名	ミダゾラム Midazolam
含有量 (1 バイアル 10mL 中)	10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗てんかん剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経の過剰な興奮をしずめて、てんかん発作を抑えます。
- ・次の目的で、医療機関で使用されます。
 - ・てんかん重積状態

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人には、この薬を使用することはできません。
- ・過去にミダフレッサ静注に含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・急性閉塞隅角緑内障の人
 - ・重症筋無力症の人
 - ・HIV プロテアーゼ阻害剤（リトナビルを含む薬剤（ノービア、カレトラ）、ネルフィナビル（ビラセプト）、アタザナビル（レイアタツ）、ホスアンプレナビ

- ル（レクシヴァ）、ダルナビルを含む薬剤（プリジスタ、プリジスタナイープ、プレジコビックス）、エファビレンツ（ストックリン）、コビシスタットを含む薬剤（スタリビルド、ゲンボイヤ、プレジコビックス）を使用している人
- ・ショック状態の人、昏睡状態の人、バイタルサインの抑制がみられる急性アルコール中毒の人

○次のは、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・著しく疾患が重症である人、呼吸能力が低下している人
- ・衰弱している人
- ・脳に器質的な障害のある人
- ・重い心不全などの心臓に障害のある人
- ・重い脱水または電解質障害のある人
- ・過去にアルコールや薬物の乱用をしたことがある人
- ・睡眠時無呼吸症候群の人
- ・腎臓に障害のある人
- ・肝臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬〔HIV プロテアーゼ阻害剤（リトナビルを含む薬剤（ノービア、カレトラ）、ネルフィナビル（ビラセプト）、アタザナビル（レイアタッツ）、ホスアンプレナビル（レクシヴァ）、ダルナビルを含む薬剤（プリジスタ、プリジスタナイープ、プレジコビックス）、エファビレンツ（ストックリン）、コビシスタットを含む薬剤（スタリビルド、ゲンボイヤ、プレジコビックス）〕や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

〔医療機関で使用される場合〕

使用量、使用回数、使用方法などは、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
呼吸抑制 こきゅうよくせい	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる
無呼吸 むこきゅう	呼吸が止まる
舌根沈下 ぜっこんちんか	舌が喉の奥に落ち込んだ状態、呼吸ができない
心停止 しんていし	気を失う
心室頻拍 しんしつひんぱく	めまい、動悸、胸の不快感、気を失う
心室性頻脈 しんしつせいひんみやく	めまい、動悸、胸の不快感、気を失う
ショック ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白(そうはく)、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
悪性症候群 あくせいしょうこうぐん	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する
依存性 いぞんせい	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、手足のふるえ、発汗、幻覚、不眠

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき、高熱、汗をかく、体のこわばり、発汗
頭部	意識の消失、気を失う、めまい、ぼーっとする、ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、幻覚、不眠
顔面	顔面蒼白(そうはく)
口や喉	舌が喉の奥に落ち込んだ状態、喉のかゆみ、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい
胸部	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる、呼吸が止まる、呼吸ができない、動悸、胸の不快感、息苦しい、呼吸数が増える
手・足	手足が冷たくなる、手足のふるえ、脈が速くなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

性状	無色透明の液
形状	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ミダゾラム
添加剤	塩酸、塩化ナトリウム、水酸化ナトリウム

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などにより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：アルフレッサ ファーマ株式会社

(<https://www.alfresa-pharma.co.jp/>)

製品情報部 くすり相談室

電話番号：0120-060334

受付時間：9時～17時

(土、日、祝日、その他当社の休業日を除く)