

レイボー錠 50mg

レイボー錠 100mg

【この薬は？】

販売名	レイボー錠 50mg REYVOW tablets 50mg	レイボー錠 100mg REYVOW tablets 100mg
一般名	ラスミジタンコハク酸塩 Lasmiditan Succinate	
含有量 (1錠中)	57.824mg (ラスミジタンとして 50mg)	115.65mg (ラスミジタンとして 100mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、5-HT_{1F}受容体作動型片頭痛治療剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬はセロトニン（5-HT）と呼ばれる物質が作用する受容体のうち、5-HT_{1F}受容体に選択的に作用することにより、脳において痛みの伝達経路を抑制するほか、末梢では三叉神経からの炎症や痛みをおこす物質の放出を抑えて、片頭痛を改善します。
- ・次の目的で処方されます。

片頭痛

- ・この薬は、医師の指示に従って飲んでください。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にレイボー錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・肝臓に重度の障害がある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

一回量	通常100mg ただし状態に応じて、一回50mgまたは200mgを飲むよう指示されることもあります。
飲む回数	片頭痛の発作がおこっている時に飲んでください。 頭痛が治まった後に再び痛み出した場合には、再度飲むことができますが、24時間あたりの総投与量が200mgを超えないようにしてください。

- ・この薬は片頭痛の発作の時のみに使用し、予防を目的として使用しないでください。
- ・この薬を使用しても全く効果が認められない場合には、他の原因による頭痛の可能性があるので、それ以上この薬を使用せず、医師に相談してください。

●どのように飲むか？

苦味を感じることがあるため、かんだり割ったり砕いたりせずに、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を飲むことによりめまいや眠気などがあらわれることがありますので、この薬を飲んだ時は自動車の運転など危険を伴う機械の操作を行わないようにしてください。

さい。特に高齢の人では、これらの症状により転倒するおそれがありますので、注意してください。

- ・この薬を含む片頭痛発作治療薬の服薬日数が多く、頭痛が悪化する場合には、医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・アルコール飲料は鎮静作用など中枢神経抑制作用をおこす可能性があるため、この薬を服用時の飲酒には注意してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？









特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
セロトニン症候群 セロトニンしょうこうぐん	急に精神的に落ち着かなくなる、体が震える、汗が出る、脈が速くなる、発熱、筋肉のこわばり、手足のびくつき、下痢、皮膚に赤みがさす

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体が震える、汗が出る、発熱
頭部	急に精神的に落ち着かなくなる
手・足	脈が速くなる、手足のびくつき
皮膚	皮膚に赤みがさす
筋肉	筋肉のこわばり
便	下痢

【この薬の形は？】

販売名	レイボー錠 50mg	レイボー錠 100mg
形状	フィルムコーティング錠	フィルムコーティング錠
	表面 	表面 
	裏面 	裏面 
	側面 	側面 
PTPシート		
直径	長径：8.90mm 短径：4.90mm	長径：11.20mm 短径：6.15mm
厚さ	3.30mm	4.0mm
重さ	120mg	240mg
色	明るい灰色	薄い紫色
識別コード	L-50 4312	L-100 4491

【この薬に含まれているのは？】

販売名	レイボー錠 50mg	レイボー錠 100mg
有効成分	ラスミジタンコハク酸塩	
添加剤	結晶セルロース、アルファー化デンプン、クロスカルメロースナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、酸化チタン、マクロゴール4000、タルク、黒酸化鉄、三二酸化鉄(100mg錠のみ含有)	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日本イーライリリー株式会社 (<https://www.lilly.co.jp>)

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

Lilly Answers（リリーアンサーズ）

電話：0120-245-970（一般の方、患者様向け）

受付時間：8時45分～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）

販売会社：第一三共株式会社 (<https://www.daiichisankyo.co.jp>)

製品情報センター

電話：0120-693-132

受付時間：9時00分～17時30分

（土、日、祝日、当社休日を除く）