

## ジャイパーカ錠 50mg ジャイパーカ錠 100mg

### 【この薬は？】

販売名	ジャイパーカ錠 50mg Jaypirca Tablets	ジャイパーカ錠 100mg Jaypirca Tablets
一般名	ピルトブルチニブ Pirtobrutinib	
含有量 (1錠中)	ピルトブルチニブ 50mg	ピルトブルチニブ 100mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗悪性腫瘍剤に属する薬です。
- ・この薬は、B細胞の活性化に関与するブルトン型チロシンキナーゼ (BTK) というタンパク質の働きを阻害することにより、がん細胞の増殖を抑制します。
- ・次の病気の人に処方されます。  
**他の BTK 阻害剤に抵抗性又は不耐容の再発又は難治性のマンテル細胞リンパ腫**
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 患者さんまたは家族の方は、この薬の効果や注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。この薬による治療の説明に同意した場合に使用が開始されます。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にジャイパーカに含まれる成分で重篤な過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	ジャイパーカ錠 50mg	ジャイパーカ錠 100mg
一回量	4 錠	2 錠
飲む回数	1 日 1 回	1 日 1 回

- ・この薬と他の抗悪性腫瘍剤との併用投与での有効性および安全性は確立していません。
- ・副作用があらわれた場合には、休薬したり用量調整をしたりすることがあります。

### ●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れに気づいたとき、できるだけ早く 1 回分を飲んでください。ただし、服用予定時間から 12 時間以上過ぎているときは、飲み忘れ分は飲まないでください。また、次の日からいつも通りの時間に飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・出血があらわれることがあり、外科的処置に伴って大量出血が生じる可能性があります。手術や侵襲的手技を受ける場合、この薬を3～5日間、中断することがあるので医師に相談してください。
- ・骨髄抑制があらわれることがあるので、この薬を飲んでいる間は定期的に血液検査が行われます。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・妊娠する可能性のある人は、この薬を使用している間および使用を終了してから1ヵ月間は、適切な避妊を行ってください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

### 副作用は？











特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
感染症 かんせんしょう	発熱、寒気、体がだるい 【肺炎】 発熱、咳、痰、息切れ、息苦しい
出血 しゅっけつ	出血 【消化管出血】 吐き気、嘔吐（おうと）、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、便に血が混じる、黒い便が出る 【頭蓋内出血】 突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐、突然のめまい、突然しゃべりしくくなる、突然言葉が出しくくなる
骨髄抑制 こつずいよくせい	発熱、寒気、喉の痛み、鼻血、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい、頭が重い、動悸（どうき）、息切れ 【好中球減少症】 発熱、寒気、喉の痛み 【血小板減少症】 鼻血、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい 【貧血】 体がだるい、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、寒気、体がだるい、出血、出血が止まりにくい
頭部	突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然の頭痛、突然のめまい、頭が重い、めまい、頭痛
顔面	鼻血
耳	耳鳴り
口や喉	咳、痰、吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、突然の嘔吐、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる、喉の痛み、歯ぐきからの出血
胸部	息切れ、息苦しい、動悸
腹部	腹痛
手・足	突然片側の手足が動かしくくなる
皮膚	あおあざができる
便	便に血が混じる、黒い便が出る

## 【この薬の形は？】

販売名	ジャイパーカ錠 50mg	ジャイパーカ錠 100mg		
形状	三角形の フィルムコーティング錠		円形の フィルムコーティング錠	
	表面		表面	
	裏面		裏面	
	側面		側面	
PTP シート	 		 	
直径	長径：9.4mm 短径：9.0mm		10mm	
厚さ	3.9mm		5.9mm	
重さ	237mg		473mg	
色	青色		青色	
識別コード	<i>Lilly</i> 6902		<i>Lilly</i> 7026	

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	ジャイパーカ錠 50mg	ジャイパーカ錠 100mg
有効成分	ピルトブルチニブ	
添加剤	クロスカルメロースナトリウム、ヒプロメロース酢酸エステルコハク酸エステル、乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、含水二酸化ケイ素、ヒプロメロース、酸化チタン、トリアセチン、青色2号アルミニウムレーキ	

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日本イーライリリー株式会社 (<https://www.lilly.com/jp>)

販売会社：日本新薬株式会社 (<https://www.nippon-shinyaku.co.jp/>)

製品情報担当

電話番号：0120-321-822

（一般の方・患者様向け）

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）