患者向医薬品ガイド

2023 年 2 月更新

エナロイ錠 2mg
エナロイ錠 4mg

【この薬は？】

販売名	エナロイ錠 2mg ENAROY tablets 2mg	エナロイ錠 4mg ENAROY tablets 4mg
一般名	エナロデュスタット Enarodustat	
含有量 （1 錠中）	2mg	4mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは，患者の皆様や家族の方などに，医療用医薬品の正しい理解と，重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって，この医薬品を使用するときに，特に知っていただきたいことを，医療関係者向けに作成されている添付文書を基に，わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には，ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら，末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として，PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」（https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html）に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

・この薬は，低酸素誘導因子（HIF : hypoxia inducible factor）−プロリン水酸化酵素（PH : prolyl hydroxylase）阻害薬と呼ばれるグループに属する薬です。

・この薬は，低酸素誘導因子−プロリン水酸化酵素（HIF-PH）を阻害することにより，赤血球のもとになる細胞を刺激する物質が増え，赤血球が作られやすくなって貧血が改善されます。

・次の病気の人に処方されます。

腎性貧血

・この薬は，体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり，量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に，確認すべきことは？】

○ この薬の使用中に，脳梗塞，心筋梗塞，肺塞栓などの重篤な血栓塞栓症があらわれ，死亡に至ることがあります。血栓塞栓症が疑われる症状（吐き気，嘔吐（おうと），脱力，まひ，激しい頭痛，胸の痛み，押しつぶされるような胸の痛み，突然の息切れ，激しい腹痛，お腹が張る，足の激しい痛みなど）があらわれた場合には，すみやかに医療機関を受診してください。

○ 次の人は，この薬を使用することはできません。
- 過去にエナロイ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- 妊婦または妊娠している可能性がある女性

○ 次の人は，特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
- 脳梗塞，心筋梗塞，肺塞栓などにかかっている人，または過去にかかったことがある人
- 高血圧症にかかっている人
- 悪性腫瘍のある人
- 増殖糖尿病網膜症，黄斑浮腫，滲出性加齢黄斑変性症，網膜静脈閉塞症などにかかっている人
- 授乳中の人

○ この薬を使用する前に，貧血の検査（ヘモグロビン濃度の検査）が行われます。

○ この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や，新たに使用する場合は，必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

● 使用量および回数

- 飲む量は，あなたの症状などにあわせて，医師が決めます。
- 通常，成人の飲む量及び飲む回数は，次のとおりです。

〔保存期慢性腎臓病患者，腹膜透析患者〕

１回量	２ｍｇから使用を開始します。その後，必要に応じて使用量が調節されます。最高用量は８ｍｇです。
飲む回数	１日１回 食前又は就寝前

〔血液透析患者〕

１回量	４ｍｇから使用を開始します。その後，必要に応じて使用量が調節されます。最高用量は８ｍｇです。
飲む回数	１日１回 食前又は就寝前

● **どのように飲むか？**

コップ１杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

● **飲み忘れた場合の対応**

決して２回分を一度に飲まないでください。飲み忘れに気がついた時に，１回分を飲んでください。ただし，翌日に気がついた場合や次の飲む時間が近い場合は１回とばして，次の時間に１回分飲んでください。

● **多く使用した時（過量使用時）の対応**

多く使用してしまったことに気がついた場合は，使用を中止し，ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・ヘモグロビン濃度などを測定するために定期的な血液検査が行われます。
・この薬の使用により血圧が上昇する場合があります。
・造血には鉄が必要なことから，必要に応じて鉄剤が使われることがあります。
・妊娠可能な女性は，この薬の使用中および使用終了から一定期間は適切な避妊をしてください。
・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
・この薬の使用中および使用終了から４日間は授乳を避けてください。
・他の医師を受診する場合や，薬局などで他の薬を購入する場合は，必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と，主な自覚症状を記載しました。副作用であれば，いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には，ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
血栓塞栓症 けっせんそくせんしょう	吐き気，嘔吐，脱力，まひ，激しい頭痛，胸の痛み，押しつぶされるような胸の痛み，突然の息切れ，激しい腹痛，お腹が張る，足の激しい痛み

以上の自覚症状を，副作用のあらわれる部位別に並び替えると，次のとおりです。

これらの症状に気づいたら，重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	脱力，まひ
頭部	激しい頭痛
口や喉	吐き気，嘔吐
胸部	胸の痛み，押しつぶされるような胸の痛み，突然の息切れ
腹部	激しい腹痛，お腹が張る
手・足	足の激しい痛み

【この薬の形は？】

製剤		エナロイ錠２ｍｇ	エナロイ錠４ｍｇ
ＰＴＰシート			
形状		フィルムコーティング錠	フィルムコーティング錠
	上面		
	下面		
	側面		
直径		７．１ｍｍ	７．１ｍｍ
厚さ		３．２ｍｍ	３．２ｍｍ
重さ		１３７ｍｇ	１３７ｍｇ
色		白色	白色

【この薬に含まれているのは？】

販売名	エナロイ錠２ｍｇ	エナロイ錠４ｍｇ
有効成分	エナロデュスタット	
添加剤	D-マンニトール，低置換度ヒドロキシプロピルセルロース，ヒプロメロース，ステアリン酸Ｍｇ，ヒドロキシプロピルメチルセルロース・酸化チタン・マクロゴール混合物	

【その他】

● この薬の保管方法は？

・直射日光と湿気を避けて，室温（１～３０℃）で保管してください。

・子供の手の届かないところに保管してください。

● 薬が残ってしまったら？

・絶対に他の人に渡してはいけません。

・余った場合は，処分の方法について，薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状，使用方法，副作用などのより詳しい質問がある場合は，主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は，下記へお問い合わせください。

製造販売元：日本たばこ産業株式会社 医薬事業部 医薬情報部

電話：０１２０－１８９－１５９

受付時間：９時００分～１７時３０分

（土，日，祝日，その他休業日を除く）

販　売　元：鳥居薬品株式会社（http://www.torii.co.jp）お客様相談室

電話：０１２０－３１６－８３４

受付時間：９時００分～１７時３０分

（土，日，祝日及び会社休日を除く）

ENR02BA-D02