患者向医薬品ガイド

2024 年 9 月更新

シルデナフィル錠 20mgRE「JG」

【この薬は？】

販売名	シルデナフィル錠 20mgRE「JG」 Sildenafil Tablets 20mgRE “JG”
一般名	シルデナフィルクエン酸塩 Sildenafil Citrate
含有量 (1 錠中)	28.09mg （シルデナフィルとして 20mg）

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

・この薬は、ホスホジエステラーゼ５阻害薬です。

・この薬は、肺血管平滑筋を弛緩させることによって、肺動脈圧と肺血管抵抗を低下させます。

・次の病気の人に処方されます。

肺動脈性肺高血圧症

・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○この薬とニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジルなどの硝酸薬あるいは一酸化窒素（ＮＯ）供与薬を併用した場合、過度に血圧が低下することがあります。

○次の人は、この薬を使用することはできません。

・過去にシルデナフィル錠に含まれる成分で過敏症のあった人
・ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジルなどの硝酸薬あるいはＮＯ供与薬を使用している人
・肝臓に重い障害がある人
・リトナビル含有製剤、ダルナビル含有製剤、イトラコナゾールおよびコビシスタット含有製剤を使用している人
・可溶性グアニル酸シクラーゼ（ｓＧＣ）刺激剤（リオシグアト）を使用している人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

・最近６ヵ月以内に脳梗塞、脳出血、心筋梗塞をおこしたことがある人
・出血性疾患または消化性潰瘍のある人
・低血圧、体液減少、重度左室流出路閉塞、自律神経機能障害などの人
・網膜色素変性症の人
・陰茎の構造に欠陥（屈曲、陰茎の線維化、ペイロニー病など）がある人
・鎌状赤血球性貧血のある人
・多発性骨髄腫、白血病の人
・肺静脈閉塞性疾患のある人
・出血しやすい人（ビタミンＫ拮抗薬などの抗凝固療法を受けている人、血小板の機能を抑えることにより血液を固まりにくくする治療を受けている人、結合組織疾患に伴い血小板の機能に異常のある人、経鼻酸素療法を受けている人）
・腎臓に重い障害がある人
・肝臓に障害がある人
・妊婦または妊娠している可能性のある人
・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬［硝酸薬およびＮＯ供与薬（ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジルなど）、リトナビル含有製剤（ノービア、カレトラ、パキロビッド）、ダルナビル含有製剤（プリジスタ、プレジコビックス）、イトラコナゾール（イトリゾール）、コビシスタット含有製剤（ゲンボイヤ、プレジコビックス、シムツーザ）、ｓＧＣ刺激剤リオシグアト（アデムパス）］や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●飲む量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	シルデナフィル錠 20mgRE「JG」
1回量	1錠
飲む回数	1日3回

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。
気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

副作用（頭痛、潮紅、めまい、消化不良、鼻炎、視覚異常など）があらわれる頻度が高くなり、重い副作用になることがあります。薬剤を多く服用してしまった場合には、ただちに医師または薬剤師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・めまいや視覚障害（文字や形がみえにくい、視野の異常）、色視症（物体が本来とは違う色に見える状態）、霧視（霧がかかったような見え方）があらわれることがあります。自動車の運転や機械の操作をする場合には注意してください。
・出血しやすい人では、鼻出血などの出血があらわれることがありますので、医師を受診してください。
・急激な視力低下（視力の低下、目のかすみ、物がゆがんで見える）や急激な視力喪失などの症状があらわれたら、すぐに眼科を受診してください。
・急激な聴力低下や突発性難聴（人の声、音が聞こえづらい、耳鳴り、耳がつまる感じ）などの症状があらわれたら、すぐに耳鼻科を受診してください。
・この薬を長期間飲む場合には、眼科的検査を行うことがあります。
・ぼっ起が4時間以上続く可能性があり、6時間以上ぼっ起が続いた場合、処置が遅れるとぼっ起機能が失われることがあります。ぼっ起が4時間以上続いたら、ただちに医師を受診して下さい。
・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
・授乳している人は医師に相談してください。
・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

販売名	シルデナフィル錠 20mgRE「JG」
PTP シート	 表面
	 裏面
形　状	円形
直　径	6.7mm
厚　さ	3.2mm
重　さ	125mg
色	白色
本体表示	シルデナ RE 20 JG

【この薬に含まれているのは？】

販売名	シルデナフィル錠 20mgRE「JG」
有効成分	シルデナフィルクエン酸塩
添加剤	無水リン酸水素カルシウム、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク

【その他】

●この薬の保管方法は？

・直射日光と湿気を避けて室温（１～３０℃）で保管してください。
・子供の手の届かない所に保管してください。

●薬が残ってしまったら？

・絶対に他の人に渡してはいけません。
・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日本ジェネリック株式会社
（https://www.nihon-generic.co.jp）
お客さま相談室：0120-893-170
受付時間：9 時～17 時 30 分（土、日、祝日を除く）