

トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」

【この薬は？】

販売名	トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」 Trichlormethiazide Tablets 2mg
一般名	トリクロルメチアジド Trichlormethiazide
含有量 (1 錠中)	2mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、チアジド系利尿薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、腎臓に働いてナトリウムを減らし、尿量を増やすことで血圧を下げます。
- ・次の病気の人に処方されます。
高血圧症（本態性、腎性等）、悪性高血圧、心性浮腫（うっ血性心不全）、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・無尿の人
- ・急性腎不全の人
- ・体液（血液、尿など）のナトリウム・カリウムが明らかに減少している人
- ・過去にチアジド系薬剤またはその類似化合物（例えばクロルタリドン等のスルホンアミド誘導体）で過敏症のあった人
- ・デスモプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）を夜間多尿による夜間頻尿に使用している男性

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・重篤な冠動脈硬化症の人、または脳動脈硬化症の人
- ・本人または両親、兄弟が痛風、糖尿病の人
- ・下痢、嘔吐（おうと）のある人
- ・高カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症の人
- ・減塩療法中の人
- ・交感神経切除後の人
- ・腎臓に重篤な障害のある人
- ・進行した肝硬変症のある人
- ・肝疾患、肝臓に障害のある人
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬〔デスモプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿に使用している場合）〕や、併用を注意すべき薬や飲み物があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

一日量	2～8mg
飲む回数	1日1～2回に分けて飲む

- ・夜間にトイレに行く回数が増えるのを避けるため、できるだけ午前中に飲むことが望ましいです。
- ・高血圧症の場合は、少量から開始して徐々に増量されます。また、悪性高血圧の場合は、通常、他の降圧剤と併用されます。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・利尿効果（尿量が増える）が急激にあらわれることがあるので、電解質失調（低ナトリウム血症、低カリウム血症など）、脱水に十分注意してください。
- ・使い続ける場合、電解質失調（低ナトリウム血症、低カリウム血症など）があらわれることがあるので、定期的に血液検査がおこなわれます。
- ・血圧が下がることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には注意してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？


特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
再生不良性貧血 さいせいふりょうせいひんけつ	めまい、体がだるい、息切れ、動悸（どうき）、あおあざができる、出血が止まりにくい、発熱、寒気、喉の痛み
低ナトリウム血症 ていナトリウムけっしょう	けいれん、意識の低下、頭痛、吐き気、嘔吐
低カリウム血症 ていカリウムけっしょう	体に力が入らない、体が動かせない、息苦しい、お腹が張る
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	発熱、咳、息苦しい、息切れ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	けいれん、体がだるい、発熱、体に力が入らない、体が動かせない、出血が止まりにくい、寒気
頭部	めまい、意識の低下、頭痛
口や喉	吐き気、嘔吐、咳、喉の痛み
胸部	息苦しい、息切れ、動悸
腹部	お腹が張る
皮膚	あおあざができる

【この薬の形は？】

形状	花型の片面 1/2 割線入り素錠
	
PTP シート	
直径	8.0mm
厚さ	2.4mm
重さ	150mg
色	淡赤色
識別コード (PTP シート)	t 246 2 mg

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	トリクロルメチアジド
添加剤	カルメロース、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色 102 号、黄色 5 号

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

発 売 元：日医工株式会社 (<https://www.nichiiko.co.jp>)

くすりの相談窓口の電話番号 TEL（フリーダイヤル）：(0120) 039-215

受付時間：9時～17時（土、日、祝祭日その他当社の休業日を除く）

製造販売元：日医工岐阜工場株式会社