

患者向医薬品ガイド

2021年9月作成

ベリキューボ錠 2.5mg

ベリキューボ錠 5mg

ベリキューボ錠 10mg

【この薬は？】

販売名	ベリキューボ錠 2.5mg Verquvo tablets 2.5mg	ベリキューボ錠 5mg Verquvo tablets 5mg	ベリキューボ錠 10mg Verquvo tablets 10mg
一般名	ベルイシグアト Vericiguat		
含有量 (1錠中)	2.5mg	5mg	10mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、可溶性グアニル酸シクラーゼ (sGC) 刺激薬と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、sGC を刺激することにより、心臓や血管の機能を調節し、慢性心不全の悪化を抑制します。
- ・次の病気の人に処方されます。

慢性心不全

ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にベリキューボ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激薬（リオシグアト）を投与中の人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・投与前の収縮期血圧が 100mmHg 未満又は症候性低血圧の人
- ・腎機能に障害がある人
- ・肝機能に障害がある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

[併用してはいけない薬]

- ・可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激薬
リオシグアト（アデムパス錠）

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

	開始量	最高用量
1 回量	2.5mg	10mg
飲む回数	1 日 1 回食後に飲む	

1 回 2.5mg から使用を開始し、あなたの状態に応じて、最高 1 回 10mg まで増量されることがあります。

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

割ったり、砕いたり、すりつぶしたりしないで、かまずにそのまま飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

- ・決して 2 回分を一度に飲まないでください。
- ・気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

ひどい血圧低下（脱力感、めまい、ふらつき、立ちくらみ、気を失う）があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・脱力感、めまい、ふらつき、立ちくらみ、意識の消失などの症状があらわれた場合医師に相談してください。
- ・めまいなどがあらわれることがあるので、高いところでの作業や自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意してください。
- ・妊娠する可能性のある人は、この薬を使用している間および使用終了後一定期間は適切な避妊を行ってください。また、この薬を使用している間に妊娠がわかった場合には、すぐに主治医に相談してください。妊娠を希望する場合も、主治医に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。

副作用は？










特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。このような症状があらわれた場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
低血圧 ていけつあつ	脱力感、めまい、ふらつき、立ちくらみ、意識の消失

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	脱力感、ふらつき
頭部	めまい、立ちくらみ、意識の消失

【この薬の形は？】

販売名	ベリキューボ錠 2.5mg	ベリキューボ錠 5mg	ベリキューボ錠 10mg
PTP シート	<p>表面</p> 	<p>表面</p> 	<p>表面</p> 
	<p>裏面</p> 	<p>裏面</p> 	<p>裏面</p> 
形状	<p>円形のフィルムコーティング錠</p> 	<p>円形のフィルムコーティング錠</p> 	<p>円形のフィルムコーティング錠</p> 
直径	7 mm	7 mm	9 mm
厚さ	3.0 mm	3.0 mm	3.7 mm
重さ	124 mg	124 mg	246 mg
色	白色	褐赤色	黄橙色
識別コード	2.5 VC	5 VC	10 VC

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ベリキューボ錠 2.5mg	ベリキューボ錠 5mg	ベリキューボ錠 10mg
有効成分	ベルイシグアト		
添加剤	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、ラウリル硫酸ナトリウム、酸化チタン、タルク		
	-	三二酸化鉄	黄色三二酸化鉄

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：バイエル薬品株式会社 (<https://www.pharma.bayer.jp/>)

電話：0120-106-398

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、弊社休日を除く）