

患者向医薬品ガイド

2023年5月更新

ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg

【この薬は?】

販売名	ネキシウム 懸濁用顆粒分包 10mg Nexium Granules for Suspension 10mg	ネキシウム 懸濁用顆粒分包 20mg Nexium Granules for Suspension 20mg
一般名	エソメプラゾールマグネシウム水和物 Esomeprazole Magnesium Hydrate	
含有量 (1包中)	エソメプラゾール 10mg (エソメプラゾールマグネシ ウム水和物として 11.1mg)	エソメプラゾール 20mg (エソメプラゾールマグネシ ウム水和物として 22.3mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報
が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、プロトンポンプ・インヒビターと呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は胃の中で、酸分泌を抑えます。
- ・次の目的で処方されます。

ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg
<ul style="list-style-type: none">・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・吻合部潰瘍・逆流性食道炎・非びらん性胃食道逆流症・Zollinger-Ellison 症候群・非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制・低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	<ul style="list-style-type: none">・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・吻合部潰瘍・逆流性食道炎・Zollinger-Ellison 症候群・非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制・低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制
下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	

- ・この薬は、体調がよくなつたと判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人には、この薬を使用することはできません。

- ・過去にネキシウム懸濁用顆粒分包に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩を使用している人

○次の人には、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・過去に薬剤で過敏症のあった人
- ・肝臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の

○この薬には併用してはいけない薬 [アタザナビル硫酸塩（レイアタツ）、リルピビリン塩酸塩（エジュラント）] や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

[胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger - Ellison 症候群の場合]

[成人]

1回量	20mg	
飲む回数	1日1回	
飲む期間	胃潰瘍、吻合部潰瘍	8週間まで
	十二指腸潰瘍	6週間まで

[1歳以上の幼児及び小児]

	体重 20kg 未満	体重 20kg 以上
1回量	10mg	症状に応じて 10~20mg
飲む回数	1日1回	
飲む期間	胃潰瘍、吻合部潰瘍	8週間まで
	十二指腸潰瘍	6週間まで

[逆流性食道炎の場合]

[成人]

逆流性食道炎	1回量	20mg
	飲む回数	1日1回
	飲む期間	8週間まで
再発・再燃を繰り返す 逆流性食道炎の維持療法	1回量	10mg~20mg
	飲む回数	1日1回

[1歳以上の幼児及び小児]

逆流性食道炎		体重 20kg 未満	体重 20kg 以上
	1回量	10mg	症状に応じて 10~20mg
	飲む回数	1日1回	
	飲む期間	8週間まで	

[非びらん性胃食道逆流症の場合]

[成人、1歳以上の幼児及び小児]

1回量	10mg
飲む回数	1日1回
飲む期間	4週間まで

[非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合]

[成人]

1回量	20mg
飲む回数	1日1回

[低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合]

[成人]

1回量	20mg
飲む回数	1日1回

[ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の場合]

[成人]

1回量	以下の3剤を同時に飲みます。 エソメプラゾールとして20mg アモキシシリソ水和物として750mg（力価） クラリスロマイシンとして200mg*（力価）
飲む回数	1日2回
飲む期間	7日間

*クラリスロマイシンは必要に応じて適宜増量します。ただし、400mg（力価）が上限です。

[ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助（除菌治療が不成功の場合）の場合]

[成人]

1回量	以下の3剤を同時に飲みます。 エソメプラゾールとして20mg アモキシシリソ水和物として750mg（力価） メトロニダゾールとして250mg
飲む回数	1日2回
飲む期間	7日間

●どのように飲むか？

この薬を受け取る際に、使用方法について説明を受けてください。詳しくは巻末の「ネキシウム懸濁用顆粒分包の飲み方」を参照してください。

約15mLの水に懸濁し、2~3分ほど置いて粘り気が増してから飲んでください。なお、懸濁後は、顆粒が沈殿する可能性があるため30分以内に服用してください。服用後、容器に顆粒が残った場合は、さらに水を加えて懸濁して飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回分を飛ばし、次に飲む時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

脱力、ゆるい便、吐き気等が報告されています。異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用中に血液、肝機能、腎機能等の検査が行われることがあります。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷や汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい
汎血球減少症 はんけつきゅうげんしゅうじょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸、あおあざができる、出血しやすい、発熱、寒気、喉の痛み
無顆粒球症 むかりゅうきゅうじょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
溶血性貧血 ようけつせいひんけつ	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
血小板減少 けっしょうばんげんしゅう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
劇症肝炎 げきしょうかんえん	急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
肝機能障害 かんきのうじょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる

重大な副作用	主な自覚症状
肝不全 かんふぜん	意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
中毒性表皮壊死融解症 (TEN) ちゅうどくせいひょうひえしゅうかいしょう (てん)	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群） ひふねんまくがんじょうこうぐん (スティーブンス・ジョンソンじょうこうぐん)	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
間質性腎炎 かんしつせいじんえん	発熱、発疹、関節の痛み、吐き気、嘔吐（おうと）、下痢、腹痛、むくみ、尿量が減る
急性腎障害 きゅうせいじんじょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
低ナトリウム血症 ていナトリウムけっしょう	吐き気、頭痛、嘔吐、けいれん、意識の低下
錯乱状態 さくらんじょうたい	注意力が散漫になる、問い合わせに間違った答えをする、行動にまとまりがない
視力障害 しりょくじょうがい	文字や形がみえにくい、視野の異常

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	脱力感、疲れやすい、発熱、体がだるい、むくみ、寒気、急激に体重が増える、ふらつき、出血が止まりにくい、出血しやすい、体がかゆくなる、突然の高熱、力が入らない、冷や汗が出る、けいれん
頭部	めまい、意識の消失、意識の低下、急な意識の低下、行動にまとまりがない、注意力が散漫になる、頭痛、問い合わせに間違った答えをする
顔面	顔面蒼白、鼻血

部位	自覚症状
眼	視野の異常、白目が黄色くなる、文字や形がみえにくい、目の充血やただれ
耳	耳鳴り
口や喉	咳、血を吐く、喉のかゆみ、喉の痛み、吐き気、嘔吐、歯ぐきの出血、唇や口内のただれ
胸部	息苦しい、息切れ、動悸
腹部	食欲不振、腹痛、お腹が張る
手・足	手足のこわばり、手足のしびれ、関節の痛み、手足が冷たくなる
皮膚	皮膚が黄色くなる、全身のかゆみ、じんま疹、あおあざができる、粘膜のただれ、発疹、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
筋肉	筋肉の痛み
尿	尿が赤褐色になる、尿の色が濃くなる、尿量が減る
便	下痢、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）

【この薬の形は？】

販売名	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg
形状	懸濁用顆粒 	
分包	懸濁用顆粒分包 10mg 	懸濁用顆粒分包 20mg 
剤形	腸溶性の顆粒剤 内容物：白色～うすい黄色の顆粒剤。 また、褐色の顆粒を認めることができます。	

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg
有効成分	エソメプラゾールマグネシウム水和物	
添加剤	モノステアリン酸グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、メタクリル酸コポリマー LD、ポリソルベート 80、白糖・デンプン球状顆粒、タルク、クエン酸トリエチル、無水クエン酸、クロスボビドン、ブドウ糖、キサンタンガム、黄色三二酸化鉄	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・1つの包装の薬は開封後もしくは懸濁後は保管せず、一度に使用してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売元 アストラゼネカ株式会社 (<https://www.astrazeneca.co.jp/>)
患者様相談窓口
電話：0120-119-703
受付時間：9時00分～17時30分
(土、日、祝祭日、会社の休業日を除く)

ネキシウム懸濁用顆粒分包の飲み方

ネキシウム懸濁用顆粒分包を服用されている方へ

ネキシウム[®] の服用方法

1




ネキシウム懸濁用顆粒分包を取り出します。

2



図のように左上の角を点線に沿って山折りにします。

3



袋に記載されている斜めの線を切り口にして開けます。

4



本剤を約15mLの水が入ったコップに移します。

5



本剤をコップの中でよくかきmezます。
(できるだけゆっくりかきませてください)

6



かきmezた後、2~3分ほどおいて服用してください。
(できるだけ30分以内に服用してください)

服用時の注意点

- 服用後、容器に顆粒が残った場合は、さらに水を加えて懸濁し、服用してください。
- 1つの包装の薬は一度に使用してください。
- 開封後、あるいは水にまぜた後の薬剤は保管せず、廃棄してください。