

ミニリンメルト OD錠 60 $\mu$ g  
 ミニリンメルト OD錠 120 $\mu$ g  
 ミニリンメルト OD錠 240 $\mu$ g

## 【この薬は？】

販売名	ミニリンメルト OD錠 60 $\mu$ g MINIRINMELT OD Tablet 60 $\mu$ g	ミニリンメルト OD錠 120 $\mu$ g MINIRINMELT OD Tablet 120 $\mu$ g	ミニリンメルト OD錠 240 $\mu$ g MINIRINMELT OD Tablet 240 $\mu$ g
一般名	デスマプレシン酢酸塩水和物 Desmopressin Acetate Hydrate		
含有量 (1錠中)	デスマプレシン酢酸塩 水和物 66 $\mu$ g (デスマプレシ ンとして60 $\mu$ g)	デスマプレシン酢酸塩 水和物 133 $\mu$ g (デスマプレシ ンとして120 $\mu$ g)	デスマプレシン酢酸塩 水和物 266 $\mu$ g (デスマプレシ ンとして240 $\mu$ g)

## 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、夜尿症用剤、中枢性尿崩症用剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、体内で尿の量を調節する抗利尿ホルモンのバソプレシン（脳の下垂体から分泌される）の分泌不足が関係しておきる尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症および中枢性尿崩症の治療に用います。

この薬は、バソプレシンと同じような働きを持つ物質（誘導体）であり、バソプ

レシンの不足を体外から補うものです。

- ・次の病気の人に処方されます。

### **尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症**

#### **中枢性尿崩症**

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

### **〔尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症に使用する場合〕**

- ・この薬は原則として6歳以上の人を使用します。

## **【この薬を使う前に、確認すべきことは？】**

### **〔この薬を使用される全ての方に共通〕**

- この薬を使用して、水中毒\*によるけいれんがおこったとの報告があります。患者の皆様と家族の方は、水中毒（けいれん、体がだるい、頭痛、吐き気、嘔吐、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力の低下など）があらわれることや、水分摂取の管理の重要性について十分理解できるまで説明を受けてください。

\*過剰に水分が体にたまること

- 次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・低ナトリウム血症の人
- ・習慣性または心因性多飲症の人
- ・過去に心不全があった人またはその疑いがあり、利尿薬による治療が必要な人
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群の人
- ・腎臓に中等度以上の障害がある人
- ・過去にミニリンメルト OD錠に含まれる成分で過敏症のあった人

- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・高血圧を伴う循環器疾患、高度動脈硬化症、冠動脈血栓症、狭心症がある人
- ・下垂体前葉不全の人
- ・腎臓に軽度の障害がある人
- ・高齢の人

- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

### **〔尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症に使用する場合〕**

- この薬の使用前に尿検査が行われます。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

#### 【この薬を使用される全ての方に共通】

この薬の効果や作用は食事の影響を受けますので、食事と薬を飲むタイミングについては医師の指示を守ってください。

#### 【尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症に使用する場合】

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量は、次のとおりです。

	ミニリンメルト OD錠 120 $\mu$ g	ミニリンメルト OD錠 240 $\mu$ g
1回量	120 $\mu$ g から開始されます。 効果が不十分な場合は、240 $\mu$ g に増量されます。	
飲む回数	1日1回寝る前	

#### 【中枢性尿崩症に使用する場合】

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。


通常、飲む量と回数は、次のとおりです。

	ミニリンメルト OD錠 60 $\mu$ g	ミニリンメルト OD錠 120 $\mu$ g	ミニリンメルト OD錠 240 $\mu$ g
1回量	60～120 $\mu$ g		
飲む回数	1日1～3回		

1回の最大使用量はデスマプレシンとして 240  $\mu$ g で、1日の最大使用量は 720  $\mu$ g です。

### ●どのように飲むか？

- ・この薬は口の中（舌下）に入れると速やかに溶けます。
- ・水分の摂取を少なくするために、水なしで飲んでください。
- ・この薬は湿気と光に不安定なため、飲む直前に包装シートから取り出してください。
- ・包装シートから取り出すときは、裏面のシールをはがして、ゆっくりと指の腹でおしだしてください。かけたり、割れたりしてもその分はすべて飲んでください。



## ●飲み忘れた場合の対応

### 〔尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症に使用する場合〕

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、次回から通常どおり、指示された量を飲んでください。

### 〔中枢性尿崩症に使用する場合〕

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、医師に相談してください。

## ●多く使用した時（過量使用時）の対応

頭痛、冷感、吐き気、嘔吐、けいれん、意識喪失(そうしつ)などがあらわれることがあります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、医師に連絡してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

### 〔この薬を使用される全ての方に共通〕

○妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。

### 〔尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症に使用する場合〕

○この薬を1週間以上使用する場合は、血液検査（血漿浸透圧や血清ナトリウム値の検査）が行われます。

○水中毒の予防のために、患者の皆様と家族の方は次のことを理解できるまで十分に説明を受けてください。

- ・この薬を使用する2～3時間前（夕食後）より翌朝までの飲水は極力避けてください。水分をとり過ぎた場合にはこの薬を使用しないでください。水分補給が必要となる急性疾患（全身性感染症、発熱、胃腸炎など）がある人は、この薬の使用を中止してください。
- ・寝る前に必ずトイレに行ってください。
- ・指示された使用量を守ってください。
- ・水中毒を疑わせる症状（けいれん、体がだるい、頭痛、吐き気、嘔吐、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力の低下など）があらわれた場合にはただちに使用を中止し、速やかに医師に連絡してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

○夜尿症は自然に軽快したり、治ったりすることがあるので、この薬を長期間使用する場合は、定期的（3ヵ月前後）に休薬（1～2週間）してこの薬の有効性の評価が行われます。

## 〔中枢性尿崩症に使用する場合〕

- この薬の使用中は、血液検査（血清ナトリウム値の検査）が行われます。
- 水中毒の予防のために、患者の皆様と家族の方は次のことを理解できるまで十分に説明を受けてください。

- ・指示された飲水量、この薬の用法、使用量を守ってください。
- ・水分をとり過ぎた場合にはこの薬を使用しないでください。発熱、喘息などの水分を多く取る必要がある病気の方は、水分の取りすぎに特に注意してください。
- ・水中毒を疑わせる症状（けいれん、体がだるい、頭痛、吐き気、嘔吐、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力の低下など）があらわれた場合にはただちに使用を中止し、速やかに医師に連絡してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

### 副作用は？













特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
脳浮腫、昏睡、痙攣などを伴う重篤な水中毒 のうふしゆ、こんすい、けいれんな どをともなうじゅうとくなみず ちゅうどく	〔水中毒〕体がだるい、頭痛、吐き気、嘔吐、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力の低下、けいれん 〔脳浮腫を伴う場合〕めまい、意識の低下、頭痛、視力の低下、深く大きい呼吸、手足のふるえ、精神の混乱 〔昏睡を伴う場合〕意識がなくなる 〔けいれんを伴う場合〕けいれん

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい、けいれん
頭部	頭痛、めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、意識の低下、意識がなくなる
眼	視力の低下
口や喉	吐き気、嘔吐
胸部	吐き気、深く大きい呼吸
腹部	吐き気
手・足	手足のふるえ
その他	判断力の低下、精神の混乱

## 【この薬の形は？】

販売名	ミニリンメルト OD 錠 60 $\mu$ g			ミニリンメルト OD 錠 120 $\mu$ g			ミニリンメルト OD 錠 240 $\mu$ g		
ブリスターシート									
形状	口腔内崩壊錠								
	上面	下面	側面	上面	下面	側面	上面	下面	側面
									
直径	12mm								
厚さ	3mm								
色	白色								

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	ミニリンメルト OD 錠 60 $\mu$ g	ミニリンメルト OD 錠 120 $\mu$ g	ミニリンメルト OD 錠 240 $\mu$ g
有効成分	デスマプレシン酢酸塩水和物		
添加物	ゼラチン、D-マンニトール、無水クエン酸		

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

### 製造販売会社

フェリング・ファーマ株式会社 (<http://www.ferring.co.jp/>)

くすり相談室

フリーダイヤル：0120-093-168

受付時間 9：00～17：30

(土・日・祝日及び弊社休日を除く)

### 販売元

キッセイ薬品工業株式会社 (<https://www.kissei.co.jp/>)

くすり相談センター

フリーダイヤル：0120-007-622

受付時間 9：00～17：40

(土・日・祝日及び弊社休日を除く)