

## シスタドロップス点眼液 0.38%

### 【この薬は？】

販売名	シスタドロップス点眼液 0.38% Cystadrops Ophthalmic Solution
一般名	システアミン塩酸塩 Cysteamine Hydrochloride
含有量 (1 mL 中)	5.6mg (システアミンとして 3.8mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、シスチン症治療剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、シスチン症患者の角膜に蓄積したシスチン結晶を減少させます。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### シスチン症における角膜シスチン結晶の減少

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、使用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

### 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にシスタドロップス点眼液 0.38%に含まれる成分で過敏症のあった人

- ・過去にペニシラミンで過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人

## 【この薬の使い方は？】

この薬は点眼薬です。

### ●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、使用する量および回数は、次のとおりです。

1回1滴、1日4回点眼します。

### ●どのように使用するか？

- ・澄明で粘性がある液ですが、微量の繊維状物質を含むことがあります。
- ・冷蔵庫から取り出した直後の点眼液は高い粘性があります。最初に使うときは常温（15～25℃）で1時間以上置いて、液がなめらかになったことを確認してから点眼してください。
- ・手をよく洗い、容器の先端が直接目に触れないように注意して点眼してください。
- ・点眼後、まぶたを閉じて涙嚢部（目頭のやや鼻より）を指先で軽く押さえて、1～5分間経ってから眼を開けてください。
- ・他の点眼剤も使用する場合には、少なくとも10分間以上の間隔をあけてから点眼してください。
- ・ソフトコンタクトレンズをつけている場合には、レンズを外してから点眼し、15分間以上経過後にレンズをつけてください。（ベンザルコニウム塩化物がソフトコンタクトレンズに吸着することがあります。）

### ●使用し忘れた場合の対応

- ・決して1回に2滴（2回分）を点眼しないでください。
- ・気がついたとき、決められた時刻の1時間以内であれば点眼し、1時間を過ぎてしまった場合は次の回に点眼してください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・異物感、眼痛などの自覚症状が続く場合には、ただちに受診してください。
- ・点眼後、一時的に目がかすむことがありますので、症状が消失するまでは機械の操作や自動車などの運転は行わないでください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください副作用と、それぞれの主な症状を記載しました。  
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

副作用	主な自覚症状
角膜潰瘍 かくまくかいよう	目の痛み、目の異物感、涙がでる、まぶしい、目の充血、視力の低下

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。  
これらの症状に気づいたら、副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	目の痛み、目の異物感、涙がでる、まぶしい、目の充血、視力の低下

## 【この薬の形は？】

性状	澄明で粘稠性のある液
形状	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>バイアル</p></div><div style="text-align: center;"><p>点眼用ノズル</p></div></div> <p>※ バイアルのキャップを取り外してノズルを装着します</p>

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	システアミン塩酸塩
添加剤	カルメロースナトリウム、クエン酸水和物、エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物、pH 調節剤

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・開栓前は、箱のまま冷蔵庫（2～8℃）で保管してください。
- ・開栓後は、常温（15～25℃）で点眼液のキャップをよく締めてから箱に入

れて保管してください。

- ・開栓後の点眼液は、冷蔵庫には戻さないでください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

**●薬が残ってしまったら？**

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・使い始めてから7日間経過した残液は使用しないでください。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

**【この薬についてのお問い合わせ先は？】**

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ヴィアトリス製薬合同会社

メディカルインフォメーション部

フリーダイヤル 0120-419-043

受付時間：月～金 9時～17時30分

(土日祝および当社休業日を除く)