

デュファストン錠 5mg

【この薬は？】

販売名	デュファストン錠 5mg Duphaston Tablets
一般名	ジドロゲステロン Dydrogesterone
含有量 (1 錠中)	5mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

〔この薬を使用されるすべての方に共通〕

- ・この薬は、レトロ・プロゲステロン剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、黄体ホルモンとしての作用をあらわします。
- ・次の病気の人又は目的で処方されます。

**無月経、月経周期異常（稀発月経、多発月経）又は生殖補助医療における調節
卵巣刺激の開始時期の調整、月経困難症、機能性子宮出血、黄体機能不全によ
る不妊症、子宮内膜症、切迫流早産、習慣性流早産、調節卵巣刺激下における
早発排卵の防止、生殖補助医療における黄体補充**

〔生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整の場合〕

- ・本剤を含む黄体ホルモン剤と卵胞ホルモン剤の併用で調節卵巣刺激の開始時期の調整を行った場合は、開始時期の調整を行わない場合と比べて、妊娠率や生産率が低下する可能性のあることが報告されています。この目的で処方を受け

る場合は、必要性を十分に理解できるまで説明を受けてください。

〔調節卵巣刺激下における早発排卵の防止の場合〕

- ・新鮮胚移植を予定していない場合のみに使用されます。

〔この薬を使用されるすべての方に共通〕

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化したり、本来の効果が得られないことがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・肝臓に重篤な障害がある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・心臓に障害のある人または過去に心臓に障害があった人
- ・ポルフィリン症の人
- ・腎臓に障害のある人または過去に腎臓に障害があった人
- ・肝臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

〔無月経、月経周期異常（稀発月経、多発月経）又は生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整、月経困難症、機能性子宮出血、黄体機能不全による不妊症、切迫流産、習慣性流産の場合〕

1日量	5～15mg
飲む回数	1日1～3回に分けて飲む

〔子宮内膜症の場合〕

1日量	5～20mg
飲む回数	1日1～3回に分けて飲む

〔調節卵巣刺激下における早発排卵の防止の場合〕

1日量	20mg
飲む回数	1日1～2回に分けて飲む
飲む時期	月経周期2～5日目より卵胞成熟の誘発当日まで

〔生殖補助医療における黄体補充の場合〕

1回量	10mg
飲む回数	1日3回
飲む時期	・新鮮胚移植の場合：採卵日から妊娠成立（妊娠4～7週）まで ・自然周期での凍結融解胚移植の場合：排卵日から妊娠成立（妊娠4～7週）まで

	・ホルモン補充周期での凍結融解胚移植の場合：卵胞ホルモン剤の投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点から最長妊娠12週まで
--	--

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

形状	
PTP シート	 表面  裏面
直径	7.0mm
厚さ	2.6mm
重さ	130mg
色	白色
剤形	割線入りの素錠
識別コード	M17

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	日局 ジドロゲステロン
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、タルク、ステアリン酸マグネシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（１～３０℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ヴィアトリス製薬合同会社

メディカルインフォメーション部

フリーダイヤル ０１２０-４１９-０４３

受付時間：月～金 ９時～１７時３０分

（土日祝および当社休業日を除く）