

ノバミン錠 5mg

【この薬は？】

販売名	ノバミン錠 5mg Novamin Tablets 5mg
一般名	プロクロルペラジンマレイン酸塩 Prochlorperazine Maleate
含有量 (1錠中)	プロクロルペラジンマレイン酸塩 8.1mg (プロクロルペラジンとして 5mg に相当)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

統合失調症

術前・術後等の悪心・嘔吐

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・昏睡状態の人、循環虚脱状態にある人
- ・バルビツール酸誘導体や麻酔剤などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
- ・アドレナリンを使用している人(アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療、又は歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く)
- ・過去にフェノチアジン系化合物及びその類似化合物で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・皮質下部の脳障害（脳炎、脳腫瘍、頭部外傷後遺症など）の疑いのある人
- ・血液障害のある人
- ・褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある人、または動脈硬化症、あるいは心臓に障害の疑いのある人
- ・重い喘息の人、肺気腫の人、呼吸器感染症などの人
- ・てんかんなどのけいれんをおこす病気のある人、または過去にてんかんなどのけいれんがあった人
- ・高温環境下にある人
- ・脱水の人や栄養状態の悪い人
- ・長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人
- ・肝臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬[アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療、又は歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く）（ボスミン）]や併用を注意すべき薬、接触しないよう注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの年齢、疾患や症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

[精神科領域以外の場合]

一日量	1錠～4錠
飲む回数	一日量を医師が決めた回数に分けて飲みます。

[精神科領域の場合]

一日量	3錠～9錠
飲む回数	一日量を医師が決めた回数に分けて飲みます。

(参考) 幼児、小児の飲む量および飲む回数は、次のとおりです。

一回量	プロクロルペラジンとして 2.5mg
飲む回数	一日に 1～3 回飲みます。

- ・体重 15kg 以下の幼児，小児では一日量が 7.5mg を超えないよう注意すること。
- ・生後 6 ヶ月未満の乳児への使用は避けることが望ましいとされています。

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

傾眠（刺激がないと眠ってしまう）、昏睡（意識の消失、刺激に全く反応しない）、血圧の低下、錐体外路症状（動きが遅い、眼球が上を向く、首のねじれやつっぱり、手足のふるえやこわばり、筋肉のこわばり、足がそわそわして落ち着かない）、激越（感情が激しくたかぶった状態、落ち着きがない）、情緒不安、けいれん、口渇、腸閉塞（便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐（おうと）、お腹が張る）、心電図変化および不整脈などの症状があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・治療初期に起立性低血圧が起こることがあるので、立ちくらみやめまいなどの症状があらわれたら、医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
Syndrome malin (悪性症候群) シンドローム マリン (あくせいしょうこうぐん)	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する

重大な副作用	主な自覚症状
突然死 とつぜんし	気を失う
再生不良性貧血 さいせいふりょうせいひんけつ	めまい、体がだるい、息切れ、動悸、あおあざができる、出血が止まりにくい、発熱、寒気、喉の痛み
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はっけつきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
麻痺性イレウス まひせいイレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐、お腹が張る
遅発性ジスキネジア ちはっせいジスキネジア	意志に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き、意志に反して体が動く
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) こうりにょうホルモンふてきごうぶんびつしょうこうぐん (エスアイエイディエイチ)	けいれん、意識の低下、意識の消失、吐き気、食欲不振
眼障害 がんしょうがい	目のかすみ、物が見えにくい、まぶしい、目の異物感、目の痛み、視力の低下
SLE 様症状 エスエルイーようしょうじょう	体がだるい、関節の痛み、発熱、顔の赤い発疹、体重減少
肺塞栓症 はいそくせんしょう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみやくけっせんしょう	発熱、皮膚が青紫～暗紫色になる、手足の爪が青紫色～暗紫色になる、唇が青紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、汗をかく、体のこわばり、体がだるい、出血が止まりにくい、発熱、寒気、突然の高熱、意志に反して体が動く、けいれん、体重減少、疲れやすい
頭部	ぼーっとする、気を失う、めまい、意識の低下、意識の消失

部位	自覚症状
顔面	顔の赤い発疹
眼	白目が黄色くなる、目のかすみ、物が見えにくい、まぶしい、目の異物感、目の痛み、視力の低下
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、喉の痛み、吐き気、嘔吐、意志に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き
胸部	呼吸数が増える、動悸、息切れ、胸の痛み、突然の息切れ
腹部	お腹が張る、食欲不振
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、脈がとぶ、関節の痛み、手足の爪が青紫色～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み
皮膚	あおあざができる、皮膚が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる
便	便やおならが出にくい
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

形状	フィルムコーティングを施した錠剤 
PTP	
直径	5.0mm
厚さ	2.3mm
重さ	0.05g
色	微帯黄白色
識別コード	5/KW NVM

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	プロクロルペラジンマレイン酸塩
添加物	乳糖水和物，トウモロコシデンプン，バレイショデンプン，デンプングリコール酸ナトリウム，ステアリン酸マグネシウム，ヒドロキシプロピルセルロース，マクロゴール 6000，タルク

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：共和薬品工業株式会社

(<http://www.kyowayakuhin.co.jp/>)

お問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-041-189

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）