

バルネチール錠 50
 バルネチール錠 100
 バルネチール錠 200
 バルネチール細粒 50%

【この薬は？】

販売名	バルネチール錠 50 Barnetil Tablets 50	バルネチール錠 100 Barnetil Tablets 100	バルネチール錠 200 Barnetil Tablets 200
一般名	スルトプリド塩酸塩 Sultopride Hydrochloride		
含有量	1錠中、スルトプリド塩酸塩をスルトプリドとして50mg	1錠中、スルトプリド塩酸塩をスルトプリドとして100mg	1錠中、スルトプリド塩酸塩をスルトプリドとして200mg

販売名	バルネチール細粒 50% Barnetil Fine Granules 50%
一般名	スルトプリド塩酸塩 Sultopride Hydrochloride
含有量	1g 中、スルトプリド塩酸塩をスルトプリドとして500mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。



【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。
躁病、統合失調症の興奮及び幻覚・妄想状態
- ・この薬は、自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲むことが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にバルネチールに含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・昏睡状態にある人
 - ・バルビツール酸誘導体などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
 - ・重い心不全の人
 - ・パーキンソン病またはレビー小体型認知症の人
 - ・脳障害（脳炎、脳腫瘍、頭部外傷後遺症など）の疑いのある人
 - ・プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノーマ）のある人
 - ・QT 延長を起こすことが知られている薬剤（イミプラミン、ピモジドなど）による治療を受けている人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・心臓や血管に障害のある人、低血圧のある人、またはこれらの疑いのある人
 - ・QT 延長のある人
 - ・QT 延長を起こしやすい人（著明な徐脈のある人、低カリウム血症のある人など）
 - ・てんかんなどのけいれんをおこす病気のある人、または過去にてんかんなどのけいれんがあった人
 - ・死にたいと行動をおこしたり、強く思ったり考えたことがある人
 - ・うつ状態にある人
 - ・甲状腺機能亢進状態にある人
 - ・脱水の人や栄養状態の悪い人
 - ・褐色細胞腫の疑いのある人
 - ・長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人
 - ・腎臓に障害がある人
 - ・肝臓に障害がある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用してはいけない薬〔イミプラミン（トフラニール）、ピモジド（オーラップ）など QT 延長を起こすことが知られている薬剤〕や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの年齢や症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および飲む回数は、次のとおりです。

一日量	スルトプリドとして 300～600mg を服用します。飲む量は、あなたの症状にあわせて、1800mg を超えない量で医師が決めます。
飲む回数	一日量を医師が決めた回数に分けて飲みます。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

- ・決して2回分を一度に飲まないでください。
- ・気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

発熱、意識障害、首および手足の筋硬直（筋肉のこわばり）、心電図異常があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作を行わないようにしてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。




重大な副作用	主な自覚症状
悪性症候群 (Syndrome malin) あくせいしょうこうぐん (シンドローム マリン)	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する
麻痺性イレウス まひせいイレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐（おうと）、お腹が張る
痙攣 けいれん	顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にぼーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
遅発性ジスキネジア ちはつせいジスキネジア	意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず噛むような口の動き、意思に反して体が動く

重大な副作用	主な自覚症状
QT 延長 キューティーえんちょう	めまい、動悸（どうき）、気を失う
心室頻拍（Torsades de pointes を含む） しんしつひんぱく（トルサードド ポアントをふくむ）	めまい、動悸、胸の不快感、気を失う
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はっけつきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
肺塞栓症 はいそくせんしょう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみゃくけっせんしょう	発熱、皮膚が青紫～暗紫色になる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、汗をかく、体のこわばり、顔や手足の筋肉がぴくつく、意思に反して体が動く、突然の高熱、寒気、発熱
頭部	ぼーっとする、一時的にぼーっとする、意識の低下、めまい、気を失う
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、吐き気、嘔吐、意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず噛むような口の動き、喉の痛み、唇が青紫色になる
胸部	呼吸数が増える、動悸、胸の不快感、胸の痛み、突然の息切れ
腹部	お腹が張る
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、手足の爪が青紫～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み
皮膚	皮膚が青紫～暗紫色になる
便	便やおならが出にくい
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

販売名	バルネチール錠 50	バルネチール錠 100	バルネチール錠 200
形状	フィルムコート錠 	フィルムコート錠 	フィルムコート錠 
直径	5.6mm	7.1mm	9.1mm
厚さ	2.8mm	3.4mm	4.1mm

販売名	バルネチール錠 50	バルネチール錠 100	バルネチール錠 200
重さ	0.071g	0.138g	0.274g
色	白色	白色	白色
識別コード	バルネチール 50	バルネチール 100	バルネチール 200

販売名	バルネチール細粒 50%
性状	白色のフィルムコート細粒剤

【この薬に含まれているのは？】

販売名	バルネチール錠 50	バルネチール錠 100	バルネチール錠 200
有効成分	スルトプリド塩酸塩		
添加物	ステアリン酸マグネシウム、カルナウバロウ、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、結晶セルロース		

販売名	バルネチール細粒 50%
有効成分	スルトプリド塩酸塩
添加物	ステアリン酸マグネシウム、クエン酸トリエチル、タルク、ポリソルベート 80、メタクリル酸コポリマーLD、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、白糖

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：共和薬品工業株式会社

([http:// www.kyowayakuhin.co.jp/](http://www.kyowayakuhin.co.jp/))

お問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-041-189

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）