

塩酸エピナスチン錠 10 mg 「アメル」
塩酸エピナスチン錠 20 mg 「アメル」

【この薬は？】

販売名	塩酸エピナスチン 錠 10 mg 「アメル」 Epinastine HCl tablet 10 mg	塩酸エピナスチン 錠 20 mg 「アメル」 Epinastine HCl tablet 20 mg
一般名	エピナスチン塩酸塩 Epinastine Hydrochloride	
含有量 (1錠中)	10 mg	20 mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アレルギー性疾患治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、アレルギーの原因となる物質（ヒスタミン）や炎症をおこす物質の作用を抑え、アレルギー症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

気管支喘息

アレルギー性鼻炎

蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、痒疹、痒疹を伴う尋常性乾癬

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去に塩酸エピナスチン錠「アメル」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・肝臓に障害のある人または過去に肝臓に障害があった人

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

〔気管支喘息、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚癢痒症、痒疹、瘙癢を伴う尋常性乾癬で使用する場合〕

販売名	塩酸エピナスチン錠 10 mg 「アメル」	塩酸エピナスチン錠 20 mg 「アメル」
一回量	2 錠	1 錠
飲む回数	1 日 1 回	

〔アレルギー性鼻炎で使用する場合〕

販売名	塩酸エピナスチン錠 10 mg 「アメル」	塩酸エピナスチン錠 20 mg 「アメル」
一回量	1～2 錠	0.5～1 錠
飲む回数	1 日 1 回	

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬は、気管支拡張剤やステロイド剤とは異なり、すでに起こっている喘息の発作や症状を速やかに改善する薬ではありません。患者さんまたは家族の方は、正しい使用方法について、十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・眠気があらわれることがあるので、この薬を飲んでいるときは車の運転等の危険を伴う機械の操作に気をつけてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？



特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
肝機能障害 かんきのうしょうがい	吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、かゆみ、尿が黄色い、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、からだのだるい
黄疸 おうだん	尿が褐色になる、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	歯ぐきの出血、出血しやすい、あおあざができる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだのだるい
眼	白目が黄色くなる
口や喉	嘔吐（おうと）、吐き気、歯ぐきの出血
胸部	吐き気
腹部	食欲不振、吐き気
皮膚	皮膚が黄色くなる、かゆみ、あおあざができる
尿	尿が黄色い、尿が褐色になる
その他	出血しやすい

【この薬の形は？】

販売名	塩酸エピナスチン錠 10 mg 「アメル」	塩酸エピナスチン錠 20 mg 「アメル」
形状	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠 
直径	6.1mm	8.2mm
厚さ	2.8mm	3.3mm
重さ	88.0 mg	175.0 mg
色	白色～微黄色	白色～微黄色
識別コード	KW025	KW026

【この薬に含まれているのは？】

販売名	塩酸エピナスチン 錠 10 mg 「アメル」	塩酸エピナスチン 錠 20 mg 「アメル」
有効成分	エピナスチン塩酸塩	
添加物	乳糖、部分アルファー化デンプン、トウモロコシデンプン、ヒプロメロース、タルク、ステアリン酸カルシウム、ポビドン、マクロゴール 6000、酸化チタン、カルナウバロウ、ジブチルヒドロキシトルエン	乳糖、トウモロコシデンプン、部分アルファー化デンプン、D-マンニトール、ヒプロメロース、タルク、ポビドン、ステアリン酸カルシウム、マクロゴール 6000、酸化チタン、カルナウバロウ、ジブチルヒドロキシトルエン

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：共和薬品工業株式会社

(<http://www.kyowayakuhin.co.jp/>)

お問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-041-189

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）