

## チャンピックス錠 0.5 mg、チャンピックス錠 1mg

### 【この薬は？】

販売名	チャンピックス錠 0.5mg CHAMPIX Tablets 0.5mg	チャンピックス錠 1mg CHAMPIX Tablets 1mg
一般名	バレニクリン酒石酸塩 Varenicline Tartrate	
含有量 (1錠中)	0.5mg	1mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、禁煙補助薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、禁煙による離脱症状を和らげます。
- ・次の目的で処方されます。

#### ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助

- ・この薬の使用にあたっては、禁煙する意志があることが確認されます。
- ・この薬は、自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると本来の効果が得られないことがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

### 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

・過去にチャンピックス錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げ

てください。

- ・統合失調症、双極性障害、うつ病等の精神疾患のある人
  - ・腎臓に重い障害のある人
  - ・血液透析を受けている人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- この薬の使用にあたっては、喫煙状況や喫煙中の健康状態等について問診があり、その上で禁煙する意志があることが確認されます。
- この薬の使用前に、ニコチン依存症に係わるスクリーニングテスト（TDS）が行われます。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

	第1～3日目	第4～7日目	第8日目以降
販売名	チャンピックス錠 0.5mg	チャンピックス錠 0.5mg	チャンピックス錠 1mg
一回量	1錠	1錠	1錠
飲む回数	1日1回食後	1日2回朝夕食後	

- ・飲む期間は12週間です。
- ・原則として他の禁煙補助薬との併用はしないでください。
- ・禁煙を開始する日を決めて、その1週間前からこの薬を飲み始めます。
- ・12週間の使用で禁煙に成功した後、禁煙をより確実にするために、この薬をさらに12週間延長されることがあります。
- ・最初の12週間の使用で禁煙に成功しなかったときや、禁煙に成功して使用を終了した後再び喫煙を始めたときは、禁煙失敗の原因を明らかにして対処できた後にのみ、再びこの薬が使用されます。
- ・副作用のために治療が持続できない場合は、8日目以降、1回0.5mg1日2回（朝夕食後）に減量されることがあります。
- ・腎臓に重い障害がある場合は0.5mg1日1回より飲み始め、その後必要に応じて最大0.5mg1日2回（朝夕食後）に増量されることがあります。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

嘔吐（おうと）など異常を感じたら使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・禁煙を維持するため、医師などによる禁煙治療プログラムに基づいた禁煙指導があります。
- ・禁煙中においては、不快、抑うつ気分、不眠、いらだたしさ、欲求不満、怒り、不安になる、集中困難、落ち着きのなさ、心拍数の減少、食欲増加、体重増加等がしばしば見られますが、この薬の使用中でもあらわれたり悪化するとの報告があります。また、精神疾患のある人はその症状が悪化することがあります。
- ・この薬との関連性は明らかではありませんが、抑うつ気分、不安になる、あせる、興奮しやすい、行動および思考の変化、精神障害、気分の変動、攻撃的になる、敵意を持つ、死んでしまいたいと感じる、などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合には、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。
- ・めまい、眠気、意識障害などがあらわれ、自動車事故に至った報告がありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作はしないでください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
皮膚粘膜眼症候群 (Stevens Johnson 症候群)、多形紅斑 <small>ひふねんまくがんしょうこうぐん (スティーブンス・ジョンソンしょうこうぐん)、たけいこうはん</small>	からだがだるい、高熱、発熱、関節の痛み、まぶたや眼の充血、結膜のただれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、食欲不振、赤い発疹、中央にむくみをともなった赤い斑点、発疹やみずぶくれができる、陰部の痛み
血管浮腫 <small>けっかんふしゅ</small>	まぶたのはれ、唇のはれ、舌のはれ、息苦しい、じんましん
意識障害 <small>いしきしょうがい</small>	意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下
肝機能障害 <small>かんきのうしょうがい</small>	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
黄疸 <small>おうだん</small>	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、高熱、発熱、関節の痛み
頭部	意識の低下、考えがまとまらない
眼	まぶたや眼の充血、結膜のただれ、まぶたのはれ、白目が黄色くなる
口や喉	ひどい口内炎、唇や口内のただれ、唇のはれ、舌のはれ、吐き気、嘔吐
胸部	息苦しい、吐き気
腹部	食欲不振、吐き気
手・足	関節の痛み
皮膚	赤い発疹、中央にむくみをともなった赤い斑点、発疹やみずぶくれができる、じんましん、かゆみ、皮膚が黄色くなる
尿	尿の色が濃くなる、尿が褐色になる
その他	陰部の痛み、判断力の低下

## 【この薬の形は？】

販売名	チャンピックス錠 0.5mg	チャンピックス錠 1mg
形状	表 裏 	表 裏 
色	白色	淡青色
剤形	フィルムコート錠	フィルムコート錠
識別コード	Pfizer・CHX 0.5	Pfizer・CHX 1.0

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	チャンピックス錠 0.5mg	チャンピックス錠 1mg
有効成分	バレニクリン酒石酸塩	
添加物	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、トリアセチン	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、トリアセチン、青色2号

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ファイザー株式会社 (<http://www.pfizer.co.jp/pfizer/>)

製品情報センター

患者さん・一般の方：0120-965-485

FAX：03-3379-3053

受付時間：月～金 9時～17時30分

（土日祝祭日を除く）