

メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」

【この薬は？】

販売名	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」 Metronidazole Gel 0.75% “Maruishi”
一般名	メトロニダゾール Metronidazole
含有量 (100g中)	メトロニダゾール0.75g

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、がん性皮膚潰瘍臭改善薬と呼ばれるグループに属する塗り薬です。
- ・皮膚潰瘍部位において臭気物質を産生する数種類の菌に対して抗菌作用を発揮することによってがん性皮膚潰瘍に伴う臭気を軽減します。
- ・次の目的で、使用されます。

がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にメトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- ・脳、脊髄に器質的な疾患（脳・脊髄腫瘍は除きます）のある人
- ・妊娠3ヵ月以内の人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・血液疾患のある人
- ・脳・脊髄腫瘍のある人
- ・妊娠3ヵ月を過ぎた人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は塗り薬です。

●使用量および回数

【がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減に使用する場合】

症状や病巣の広さに応じて適量を使用してください。潰瘍面をきれいに拭いた後、1日1～2回ガーゼなどにのぼして貼付するか、患部に直接塗布しその上をガーゼなどで保護してください。

●使用し忘れた場合の対応

気がついた時に、できるだけ早く1回分を塗布してください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・使用中は、紫外線に当たること（日光または日焼けランプなど）を避けてください。紫外線が当たると、効果が弱まる場合があります。
- ・塗布部位が広範囲の場合などには、全身性の副作用（末梢神経障害（手足のしびれ、手足の痛み、手足の感覚がなくなる、手足の力が入らない、物がつかみづらい、歩行時につまずく）、中枢神経障害（頭の痛み、しゃべりにくい、手足のふるえ、集中力の低下、物事が思い出せない・覚えられない）、白血球減少、好中球減少（突然の高熱、寒気、喉の痛み）など）が起こることがあります。異常を感じたら医師または薬剤師に相談してください。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある人、授乳中の人には医師に相談してください。
- ・この薬はアルコールの代謝に影響するため、使用中は飲酒を控えてください。
- ・刺激を伴う症状が認められた場合は、使用回数を減らすか、一時的に使用をやめて医師の指示を受けるようにしてください。
- ・患部を刺激することにより、潰瘍部位から出血することがあるので、ガーゼの交換などは十分注意してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。



このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

副作用	主な自覚症状
潰瘍部位からの出血	潰瘍部位からの出血

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
皮膚	潰瘍部位からの出血

【この薬の形は？】

販売名	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」
性状	無色～微黄色で粘りのある均一なゲル剤 ^[注] 注) この薬は、かすかな黄色の場合がありますが、ご使用に問題はありません。
外観	50g チューブ 
	100g チューブ 

【この薬に含まれているのは？】

販売名	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」
有効成分	メトロニダゾール
添加剤	エデト酸ナトリウム水和物、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・容器から取り出したゲルは、速やかに使用してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：丸石製薬株式会社 (<https://www.maruishi-pharm.co.jp/>)

学術情報部

電話：0120-014-561

受付時間：9：00～17：00

(土日祝日、当社休日を除く)