

ラピフォート®ワイプ 2.5%

【この薬は？】

販売名	ラピフォートワイプ 2.5% Rapifort Wipes
一般名	グリコピロニウムトシル酸塩水和物 Glycopyrronium Tosilate Hydrate
含有量 (1包 (薬液 2.5g) 中)	グリコピロニウムトシル酸塩水和物 62.5mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、原発性腋窩多汗症治療剤と呼ばれるグループに属する塗り薬です。
- ・この薬は、汗腺細胞のムスカリン M3 受容体に結合し、アセチルコリンの作用を阻害することで、薬を塗布した腋窩（脇の下）の発汗を抑制します。
- ・次の病気の人に処方されます。

原発性腋窩多汗症

- ・この薬は、症状がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると本来の効果が得られないことがあります。医師の指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・閉塞隅角（へいそくぐうかく）緑内障の人
- ・前立腺肥大による排尿障害のある人
- ・過去にラピフォートワイプに含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・前立腺肥大症のある人
- ・塗布部位（脇の下）に傷や湿疹・皮膚炎等のある人
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

- ・この薬はワイプ型の塗り薬です。

●使用量および回数

1日1回、1包に封入されている不織布1枚を用いて薬液を両方の腋窩（脇の下）に塗ります。

●どのように使用するか？

- ・使用直前に開封してください。
- ・脇をタオルで拭く等、清潔で乾いた状態の腋窩（脇の下）に使用してください。
- ・左右の腋窩（脇の下）に1回ずつ使用してください。
- ・塗布部位をラップフィルム等で密封しないでください。
- ・この薬は1回使い切りです。使用後は、他の人が誤って触れないように注意して廃棄してください。
- ・使用後は、薬が付いた手で眼に触れず、直ちに手をよく洗い、手に付いた薬をきれいに洗い流してください。
- ・薬が眼に入った場合、まぶしい、霧がかかったような見え方、刺激を感じる等の症状があらわれることがあるので、眼に入らないよう注意してください。万一、誤って眼に入った場合には、直ちによく水で洗い流してください。

●塗り忘れた場合の対応

使い忘れた場合は、気がついたときに本剤1枚を用いて塗ってください。ただし、2回分を一度に使用しないでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ この薬には、アセチルコリンの作用を阻害する作用（抗コリン作用）があり、目の調節障害（まぶしい、霧がかかったような見え方）があらわれることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作を行う際には注意してください。
- ・ この薬は発汗を抑制するため、発汗が促進される環境（気温や湿度が高い場所・運動時等）で汗が出ず、体温が上がるおそれがあります。熱中症を疑う症状があらわれた場合には、涼しい場所に移動する、身体を冷やす、医療機関を受診する等の適切な対応を行ってください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳している人は医師に相談してください。
- ・ 他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

性状	無色～微黄色澄明の薬液を不織布に含浸させた製剤	
外観	<p>包装（1包）</p> 	<p>広げた不織布</p> 

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	グリコピロニウムトシル酸塩水和物
添加剤	無水エタノール、pH 調節剤、不織布（担体）

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：マルホ株式会社 (<https://www.maruho.co.jp>) 製品情報センター

電話：0120-45-8712

受付時間：9時30分～17時30分

（土・日・休日および当社休業日を除く）