

アメナリーフ錠 200mg

【この薬は？】

販売名	アメナリーフ錠 200mg Amenalief Tablets
一般名	アメナメビル Amenamevir
含有量 (1 錠中)	200mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗ヘルペスウイルス剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、単純疱疹と帯状疱疹の原因となるウイルスの増殖を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

帯状疱疹

再発性の単純疱疹

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にアメナリーフ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・リファンピシン（リファジン）を使用している人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・免疫機能が低下している人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬〔リファンピシン（リファジン）〕や、併用を注意すべき薬や飲食物があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

- ・飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
- ・通常、成人の飲む量および回数は、次の通りです。

〔带状疱疹の場合〕

1回量	2錠
飲む回数	1日1回
飲む期間	原則、7日間

〔再発性の単純疱疹の場合〕

初期症状（患部の違和感、灼熱感、そう痒等）を感じてから、速やかに（6時間以内）服用してください。また、口唇ヘルペスでは皮疹（水疱、膿疱、びらん、潰瘍、痂皮）発現前に服用してください。

1回量	6錠
飲む回数	1回

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

この薬は空腹時に投与すると吸収が低下し、効果が減弱するおそれがあるので、食後に服用してください。食前又は食間のタイミングで服用する必要がある場合は、軽食等を摂取した上で服用してください。

●効果が不十分な場合の対応

指示どおりに飲み続けても症状が改善しなかったり悪化したりした場合は、できるだけ早く受診してください。

効果が得られない場合は他の治療法に切り替えられることがあります。

●使用し忘れた場合の対応

〔帯状疱疹に対して 1 回 400mg を 1 日 1 回飲む場合〕

決して 2 回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

〔再発性の単純疱疹に対して 1200mg を 1 日 1 回飲む場合〕

初期症状があらわれてから 6 時間以内、または口唇ヘルペスでは皮疹発現前に服用することができなかった場合で、治療を希望する場合は、服用せずに医療機関を受診してください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、使用を中止し、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊婦又は妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・グレープフルーツジュース、セイヨウオトギリソウを含有する食品はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。




重大な副作用	主な自覚症状
多形紅斑 たけいこうはん	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、 発熱、関節や喉の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。

これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱
手・足	関節や喉の痛み
皮膚	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する

【この薬の形は？】

PTP シート				
				
性状	楕円形のフィルムコーティング錠			
				
直径	15.0mm			
短径	7.9mm			
厚さ	5.7mm			
重さ	536mg			
色	淡黄色			
識別コード	MA211			

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	アメナメビル
添加剤	ヒプロメロース、クロスカルメロースナトリウム、クロスポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、マクロゴール、酸化チタン、三二酸化鉄

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：マルホ株式会社 (<https://www.maruho.co.jp>)

製品情報センター

電話：0120-45-8712

受付時間：9時30分～17時30分

（土・日・休日および当社休業日を除く）