

# 患者向医薬品ガイド

2024年7月更新

## プレドニゾロン錠 1mg 「VTRS」 プレドニゾロン錠 5mg 「VTRS」

### 【この薬は？】

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 販売名          | プレドニゾロン錠 1mg 「VTRS」<br>PREDNISOLONE Tablets | プレドニゾロン錠 5mg 「VTRS」<br>PREDNISOLONE Tablets |
| 一般名          | プレドニゾロン<br>Prednisolone                     |   |
| 含有量<br>(1錠中) | 1.0mg                                       | 5.0mg                                       |

### 患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- この薬は、合成副腎皮質ホルモン剤（ステロイド）と呼ばれるグループに属する薬です。
- この薬は、炎症やアレルギー症状を改善したり、免疫を抑制するなどさまざまな働きがあり、多くの病気に用いられます。ただし、病気の原因そのものを治す薬ではありません。
- 次の病気の人に処方されます。

## ○内科・小児科領域

- (1) 内分泌疾患：慢性副腎皮質機能不全（原発性、続発性、下垂体性、医原性）、急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ）、副腎性器症候群、亜急性甲状腺炎、甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）クリーゼ〕、甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症、ACTH単独欠損症
- (2) リウマチ疾患：関節リウマチ、若年性関節リウマチ（スチル病を含む）、リウマチ熱（リウマチ性心炎を含む）、リウマチ性多発筋痛
- (3) 膜原病：エリテマトーデス（全身性及び慢性円板状）、全身性血管炎（高安動脈炎、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症を含む）、多発性筋炎（皮膚筋炎）、強皮症
- (4) 川崎病の急性期（重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合）
- (5) 腎疾患：ネフローゼ及びネフローゼ症候群
- (6) 心疾患：うっ血性心不全
- (7) アレルギー性疾患：気管支喘息、喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎を含む）、薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹、中毒疹を含む）、血清病
- (8) 重症感染症：重症感染症（化学療法と併用する）
- (9) 血液疾患：溶血性貧血（免疫性又は免疫性機序の疑われるもの）、白血病（急性白血病、慢性骨髓性白血病の急性転化、慢性リンパ性白血病）（皮膚白血病を含む）、顆粒球減少症（本態性、続発性）、紫斑病（血小板減少性及び血小板非減少性）、再生不良性貧血、凝固因子の障害による出血性素因
- (10) 消化器疾患：限局性腸炎、潰瘍性大腸炎
- (11) 重症消耗性疾患：重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期、スプレーを含む）
- (12) 肝疾患：劇症肝炎（臨床的に重症とみなされるものを含む）、胆汁うっ滞型急性肝炎、慢性肝炎（活動型、急性再燃型、胆汁うっ滞型）（但し、一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る）、肝硬変（活動型、難治性腹水を伴うもの、胆汁うっ滞を伴うもの）
- (13) 肺疾患：サルコイドーシス（但し、両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く）、びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎を含む）
- (14) 結核性疾患：肺結核（粟粒結核、重症結核に限る）（抗結核剤と併用する）、結核性髄膜炎（抗結核剤と併用する）、結核性胸膜炎（抗結核剤と併用する）、結核性腹膜炎（抗結核剤と併用する）、結核性心のう炎（抗結核剤と併用する）
- (15) 神経疾患：脳脊髄炎（脳炎、脊髄炎を含む）（但し、一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ、かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること）、末梢神経炎（ギランバレー症候群を含む）、筋強直症、重症筋無力症、多発性硬化症（視束脊髄炎を含む）、小舞蹈病、顔面神経麻痺、脊髄蛇網膜炎、デュシェンヌ型筋ジストロフィー
- (16) 悪性腫瘍：悪性リンパ腫及び類似疾患（近縁疾患）、多発性骨髄腫、好酸性肉芽腫、乳癌の再発転移
- (17) その他の内科的疾患：特発性低血糖症、原因不明の発熱

## ○外科領域

副腎摘除、臓器・組織移植、侵襲後肺水腫、副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲、蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされを含む）

## ○整形外科領域

強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）

## ○産婦人科領域

卵管整形術後の癒着防止、副腎皮質機能障害による排卵障害

## ○泌尿器科領域

前立腺癌（他の療法が無効な場合）、陰茎硬結

## ○皮膚科領域

★湿疹・皮膚炎群（急性湿疹、亜急性湿疹、慢性湿疹、接触皮膚炎、貨幣状湿疹、自家感作性皮膚炎、アトピー皮膚炎、乳・幼・小児湿疹、ビダール苔癬、その他の神経皮膚炎、脂漏性皮膚炎、進行性指掌角皮症、その他の手指の皮膚炎、陰部あるいは肛門湿疹、耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎、鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など）（但し、重症例以外は極力投与しないこと）、★痒疹群（小児ストロフルス、蕁麻疹様苔癬、固定蕁麻疹を含む）（但し、重症例に限る。また、固定蕁麻疹は局注が望ましい）、蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例に限る）、★乾癬及び類症〔尋常性乾癬（重症例）、乾癬性関節炎、乾癬性紅皮症、膿疱性乾癬、稽留性肢端皮膚炎、疱疹状膿瘍疹、ライター症候群〕、★掌蹠膿疱症（重症例に限る）、★毛孔性紅色粒糠疹（重症例に限る）、★扁平苔癬（重症例に限る）、成年性浮腫性硬化症、紅斑症（★多形滲出性紅斑、結節性紅斑）（但し、多形滲出性紅斑の場合は重症例に限る）、IgA 血管炎（重症例に限る）、ウェーバークリスチヤン病、粘膜皮膚眼症候群〔開口部びらん性外皮症、スチブンス・ジョンソン病、皮膚口内炎、フックス症候群、ベーチェット病（眼症状のない場合）、リップシュツ急 性陰門潰瘍〕、レイノ一病、★円形脱毛症（悪性型に限る）、天疱瘡群（尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡、Senear-Usher 症候群、増殖性天疱瘡）、デューリング疱疹状皮膚炎（類天疱瘡、妊娠性疱疹を含む）、先天性表皮水疱症、帶状疱疹（重症例に限る）、★紅皮症（ヘブラ紅色粒糠疹を含む）、顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例に限る）、アレルギー性血管炎及びその類症（急性痘瘡様苔癬状粒糠疹を含む）、潰瘍性慢性膿皮症、新生児スクレーマ

## ○眼科領域

内眼・視神經・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブドウ膜炎、網脈絡膜炎、網膜血管炎、視神經炎、眼窩炎性偽腫瘍、眼窩漏斗尖端部症候群、眼筋麻痺）、外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合（眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、虹彩毛様体炎）、眼科領域の術後炎症

## ○耳鼻咽喉科領域

急性・慢性中耳炎、滲出性中耳炎・耳管狭窄症、メニエル病及びメニエル症候群、急性感音性難聴、血管運動（神経）性鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症（枯草熱）、副鼻腔炎・鼻茸、進行性壊疽性鼻炎、喉頭炎・喉頭浮腫、食道の炎症（腐蝕性食道炎、直達鏡使用後）及び食道拡張術後、耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法、難治性口内炎及び舌炎（局所療法で治癒しないもの）、嗅覚障害、急性・慢性（反復性）唾液腺炎

**★印 外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること。**

- この薬は、体調がよくなつたと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると、発熱、頭痛、食欲不振、脱力感、筋肉痛、関節痛、ショックなどの症状があらわれることがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

**【この薬を使う前に、確認すべきことは？】**

○がん化学療法としてこの薬を使用する場合は、患者さんまたは家族の方は、この治療の必要性や注意すべき点などについて十分に理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した場合に使用が開始されます。

○次の人には、この薬を使用することはできません。

- 過去にプレドニゾロン錠「VTRS」に含まれる成分で過敏症のあった人
- デスモプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）を夜間多尿による夜間頻尿に使用している男性

○次の人には、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- 感染症にかかっている人
- 全身の真菌症にかかっている人
- 消化性潰瘍のある人
- 精神病の人
- 結核にかかっている人
- 単純疱疹性角膜炎の人
- 後嚢白内障の人
- 緑内障の人
- 高血圧の人
- 電解質異常のある人
- 血栓症の人
- 最近、内臓の手術を受けた人
- 急性心筋梗塞をおこした人
- 糖尿病の人
- 骨粗しょう症の人
- 甲状腺機能が低下している人
- 脂肪肝の人
- 脂肪塞栓症の人
- 重症筋無力症の人
- B型肝炎ウイルスに感染している人や、過去にB型肝炎ウイルスに感染したことのある人
- 腎不全の人
- 肝硬変の人

- ・妊娠または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬〔デスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）（男性における夜間多尿による夜間頻尿に使用している場合）〕や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常\*、成人の飲む量および回数は次のとおりです。

|      |                        |                        |
|------|------------------------|------------------------|
| 販売名  | プレドニゾロン錠 1mg<br>「VTRS」 | プレドニゾロン錠 5mg<br>「VTRS」 |
| 1日量  | 5～60錠                  | 1～12錠                  |
| 飲む回数 | 1日1～4回に分けて飲みます。        |                        |

\* 悪性リンパ腫に用いる場合は、抗悪性腫瘍剤との併用で1日量として  $100\text{mg}/\text{m}^2$  [体表面積（身長と体重から計算）あたり] まで使用されます。  
 また、川崎病の急性期に用いる場合は、通常、プレドニゾロンとして体重1kgあたり1日2mg〔最大量は60mg（錠1mg：60錠、錠5mg：12錠）〕を3回に分けて飲みます。熱のある期間は同じ主成分の注射剤が使用されて、解熱した後にこの薬が使用されます。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついたときに、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは?】

- ・この薬の使用により、誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍、糖尿病、精神障害などの重篤な副作用があらわれることがあるので、注意してください。
- ・この薬を使用する前に水痘（みずぼうそう）または麻疹（はしか）にかかったことがあるか、予防接種を受けたことがあるかが確認されます。また、水痘または麻疹に感染すると致命的な経過をたどることがあります。感染が疑われる場合はただちに受診してください。水痘または麻疹にかかったことがあったり、予防接種を受けたことがある人でも感染があるので、気をつけてください。
- ・この薬を連用した後、急に使用を中止すると、発熱、頭痛、食欲不振、脱力感、筋肉痛、関節痛、ショックなどがあらわれることがあります。中止する場合は徐々に減量されます。医師の指示どおりに使用してください。
- ・B型肝炎ウイルスキャリアの人は、この薬の使用中や使用終了後に継続して血液検査などが行われます。
- ・この薬を長期あるいは大量に使用している間、または使用中止後6ヵ月以内は、免疫機能が低下していることがありますので、生ワクチン〔麻疹、風疹（ふうしん）、おたふく風邪、水痘、BCGなど〕の接種を受けないでください。
- ・この薬を連用すると、眼圧上昇、緑内障、後嚢白内障、中心性漿液性網脈絡膜症・多発性後極部網膜色素上皮症があらわれがあるので、定期的に検査が行われことがあります。
- ・リンパ系腫瘍のある人は、この薬の使用中に腫瘍崩壊症候群（意識の低下、意識の消失、尿量が減る、息苦しい、息切れ）があらわれがあるので、血液検査や腎機能検査が行われことがあります。
- ・強皮症の人は、この薬の使用で強皮症腎クリーゼがあらわれやすくなるとの報告がありますので、使用中は血圧や腎機能検査が行われます。頭痛、むかむかする、嘔吐（おうと）、視力低下、けいれんなどの症状があらわれた場合には、速やかに医師に連絡してください。
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれるることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用   | 主な自覚症状  |
|--|---|
| 誘発感染症、感染症の増悪<br>ゆうはつかんせんしょう、かんせんしょうのぞうあく         | 発熱、寒気、体がだるい<br><br>〔B型肝炎ウイルスの増殖による肝炎としてあらわれる場合〕<br>体がだるい、吐き気、嘔吐、食欲不振、発熱、上腹部痛、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる |
| 続発性副腎皮質機能不全<br>ぞくはつせいふくじんひしつきのうふぜん               | 体がだるい、意識の低下、意識の消失、嘔吐、食欲不振、発熱、冷汗が出る、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる  |
| 糖尿病<br>とうようびょう                                   | 体がだるい、体重が減る、喉が渴く、水を多く飲む、尿量が増える  |
| 消化管潰瘍<br>しょうかかんかいよう                              | 吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色ときに黒色）、腹痛、胃がむかむかする、黒い便が出る   |
| 消化管穿孔<br>しょうかかんせんこう                              | 吐き気、嘔吐、寒気、発熱、激しい腹痛、ふらつき、息切れ、意識の低下   |
| 消化管出血<br>しょうかかんしゅつけつ                             | 吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、便に血が混じる、黒い便が出る   |
| 膵炎<br>すいえん                                       | 強い腹痛、背中の痛み、お腹が張る、吐き気、嘔吐、体重が減る、喉が渴く、尿量が増える、皮膚が黄色くなる、油っぽい下痢が出る  |
| 精神変調<br>せいしんへんちょう                                | 普段とは違う精神状態、幻覚、妄想、興奮抑うつ  |
| うつ状態<br>うつじょうたい                                  | 気分がゆううつになる、悲観的になる、思考力の低下、不眠、食欲不振、体がだるい  |
| 痙攣<br>けいれん                                       | 顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーッとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える   |
| 骨粗鬆症<br>こつそしょうしょう                                | 骨折しやすい、腰・背中の痛み、手足の痛み、背が低くなった、背中が丸くなつた   |
| 大腿骨及び上腕骨の骨頭無菌性壞死<br>だいたいこつおよびじょうわんこつのこつとうむきんせいえし | 脚の付け根の痛み、膝からももへの痛み、腕の付け根の痛み   |


| 重大な副作用                                     | 主な自覚症状   |
|--|--|
| ミオパチー<br>りょくないしよう                          | 筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋萎縮  |
| 緑内障<br>こうのうはくないしよう                         | 目のかすみ、視力の低下、視野が欠けて狭くなる   |
| 後囊白内障<br>こうのうはくないしよう                       | 視力の低下、かすんで見える、まぶしい、眼鏡で視力が出ない   |
| 中心性漿液性網脈絡膜症<br>ちゅうしんせいしょうえきせいもうみやくらくまくしよう  | 視力の低下、目のかすみ、物がゆがんで見える  |
| 多発性後極部網膜色素上皮症<br>たはつせいこうきょくぶもうまくしきそじょうひしよう | 視力の低下、目のかすみ、物がゆがんで見える  |
| 血栓症<br>けっせんしよう                             | ふくらはぎの痛み・腫れ、手足のしびれ、鋭い胸の痛み、突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み、激しい頭痛、脱力、まひ、めまい、失神、目のかすみ、舌のもつれ、しゃべりにくい |
| 心筋梗塞<br>しんきんこうそく                           | しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷汗が出る  |
| 脳梗塞<br>のうこうそく                              | 突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしにくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐、突然のめまい、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる          |
| 動脈瘤<br>どうみやくりゅう                            | 通常無症状  |
| 硬膜外脂肪腫<br>こうまくがいしほうしゅ                      | 腰痛、背中の痛み、上手く歩けない、足がしびれる、尿が出にくい   |
| 腱断裂<br>けんだんれつ                              | アキレス腱の痛み、歩行障害  |
| 腫瘍崩壊症候群<br>しゅようほうかいしようこうぐん                 | 意識の低下、意識の消失、尿量が減る、息苦しい、息切れ   |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

| 部位 | 自覚症状  |
|----|---|
| 全身 | 発熱、寒気、体がだるい、体がかゆくなる、冷汗が出る、ふらつき、体重が減る、顔や手足の筋肉がぴくつく、骨折しやすい、背が低くなった、脱力、まひ  |
| 頭部 | 意識の低下、意識の消失、普段とは違う精神状態、妄想、興奮抑うつ、気分がゆううつになる、悲観的になる、思考力の低下、不眠、一時的にボーっとする、激しい頭痛、めまい、幻覚、失神、突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然の頭痛、突然のめまい |
| 顔面 | 顔面蒼白  |

| 部位  | 自覚症状  |
|-----|---|
| 眼   | 白目が黄色くなる、目のかすみ、視力の低下、視野が欠けて狭くなる、かすんで見える、まぶしい、眼鏡で視力が出ない、物がゆがんで見える  |
| 口や喉 | 吐き気、嘔吐、喉が渴く、水を多く飲む、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色ときに黒色）、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、舌のもつれ、しゃべりにくい、突然の嘔吐、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる               |
| 胸部  | 息切れ、鋭い胸の痛み、突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み、しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい  |
| 腹部  | 食欲不振、上腹部痛、腹痛、胃がむかむかする、激しい腹痛、強い腹痛、お腹が張る  |
| 背中  | 背中の痛み、腰・背中の痛み、背中が丸くなった、腰痛   |
| 手・足 | 手足が冷たくなる、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、手足の痛み、脚の付け根の痛み、膝からももへの痛み、腕の付け根の痛み、ふくらはぎの痛み・腫れ、手足のしびれ、突然片側の手足が動かしにくくなる、上手く歩けない、足がしびれる、アキレス腱の痛み、歩行障害 |
| 皮膚  | 皮膚が黄色くなる  |
| 筋肉  | 筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋萎縮   |
| 便   | 黒い便が出る、便に血が混じる、油っぽい下痢が出る  |
| 尿   | 尿の色が濃くなる、尿量が増える、尿が出にくい、尿量が減る  |

## 【この薬の形は？】

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 販売名     | プレドニゾロン錠 1mg<br>「VTRS」  | プレドニゾロン錠 5mg<br>「VTRS」  |
| 形状      |    |    |
| PTP シート |  <p>表面</p>  <p>裏面</p> |  <p>表面</p>  <p>裏面</p> |
| 直径      | 5.5mm   | 6.0mm   |

|       |                        |                        |
|-------|------------------------|------------------------|
| 販売名   | プレドニゾロン錠 1mg<br>「VTRS」 | プレドニゾロン錠 5mg<br>「VTRS」 |
| 厚さ    | 2.3mm                  | 2.3mm                  |
| 重さ    | 75mg                   | 85mg                   |
| 色     | 白色                     | 白色                     |
| 剤形    | 円形<br>割線入りの素錠          | 円形<br>割線入りの素錠          |
| 識別コード | MH273                  | h-255                  |

## 【この薬に含まれているのは?】

|      |  |                        |
|------|--|------------------------|
| 販売名  | プレドニゾロン錠 1mg<br>「VTRS」                               | プレドニゾロン錠 5mg<br>「VTRS」 |
| 有効成分 | 日局 プレドニゾロン   |                        |
| 添加剤  | 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム |                        |

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は?

- 直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら?

- 絶対に他の人に渡してはいけません。
- 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は?】

- 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社

販 売 会 社：ヴィアトリス製薬合同会社

メディカルインフォメーション部

フリーダイヤル 0120-419-043

受付時間：月～金 9時～17時30分

(土日祝および当社休業日を除く)