

フルタミド錠 125mg 「VTRS」

【この薬は？】

販売名	フルタミド錠 125mg 「VTRS」 FLUTAMIDE Tablets
一般名	フルタミド Flutamide
含有量 (1 錠中)	125. 0mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、前立腺がん治療薬のうちホルモン療法剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、前立腺がん細胞に対するアンドロゲン(男性ホルモン)の働きを抑え、がん細胞の増殖を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

前立腺癌

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 劇症肝炎などの重篤な肝障害が発現し、中には死亡にいたる例も報告されているので、定期的(少なくとも1ヵ月に1回)に肝機能検査を受ける必要があります。
- 副作用として肝障害が起こることがあります。患者さんと家族の方は十分に理解できるまで説明を受けてください。肝障害(疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振など)の症状があらわれたら、使用を中止し、ただちに受診してください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・肝臓に障害がある人
 - ・過去にフルタミド錠 125mg「VTRS」に含まれる成分で過敏症を経験したことがある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・過去に薬に過敏症を経験したことがある人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

一回量	1錠
飲む回数	1日3回、毎食後

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を飲んでいると尿の色がこはく色や黄緑色になることがあります。薬の成分が尿中に排泄されたためと推測されていますが、肝臓の機能が低下したときにも尿が着色してくるのでご自分では判断せず、医師または薬剤師に伝えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいっていることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
重篤な肝障害 じゅうとくなかんしょうがい	体がだるい、吐き気、食欲不振、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）、意識の低下
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
心不全 しんふぜん	息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加
心筋梗塞 しんきんこうそく	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷汗が出る

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい、体がかゆくなる、急激に体重が増える、発熱、疲れやすい、むくみ、体重の増加、冷汗が出る
頭部	意識の低下
眼	白目が黄色くなる
口や喉	咳、吐き気、血を吐く
胸部	息切れ、息苦しい、しめ付けられるような胸の痛み
腹部	食欲不振、お腹が張る
皮膚	皮膚が黄色くなる
便	便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
尿	尿の色が濃くなる

【この薬の形は？】

形状	素錠  上面 下面 側面
PTP シート	 表面 裏面
直径	8.5mm
厚さ	3.9mm
重さ	250mg
色	淡黄色
識別コード	MH271

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	日局 フルタミド
添加剤	結晶セルロース、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、アルファー化デンプン、ラウリル硫酸ナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社

販 売 会 社：ヴィアトリス製薬合同会社

メディカルインフォメーション部

フリーダイヤル 0120-419-043

受付時間：月～金 9時～17時30分

（土日祝および当社休業日を除く）