

患者向医薬品ガイド

2023年11月更新

カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」

カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」

カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」

【この薬は?】

販売名	カルボプラチン 点滴静注液 50mg「NK」 Carboplatin Injection	カルボプラチン 点滴静注液 150mg「NK」 Carboplatin Injection	カルボプラチン 点滴静注液 450mg「NK」 Carboplatin Injection
一般名	カルボプラチン Carboplatin		
含有量 (1バイアル中)	50mg	150mg	450mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は?】

- ・この薬は、抗悪性腫瘍剤で、白金を含むグループに属する注射薬です。
- ・この薬は、がん細胞のDNA合成を阻害する作用により、がん細胞の増殖を抑制します。
- ・次の病気と診断された人に、医療機関において使用されます。

頭頸部癌、肺小細胞癌、睾丸腫瘍、卵巣癌、子宮頸癌、悪性リンパ腫、非小細胞肺癌、乳癌

以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法

小児悪性固形腫瘍（神経芽腫・網膜芽腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍、再発又は難治性のユーディング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫）

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○患者さんまたは家族の方は、この薬の効果や注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意をした場合に使用が開始されます。

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・重篤な骨髄抑制（貧血、白血球減少、血小板減少など）のある人
- ・過去にカルボプラチニン点滴静注液「NK」に含まれる成分や他の白金を含む薬に対し過敏症を経験したことがある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人（動物実験で、胎児の奇形や胎児の死亡が認められたとの報告があります。）

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・骨髄抑制（貧血、白血球減少、血小板減少など）のある人
- ・感染症にかかっている人
- ・水痘（みずぼうそう）にかかっている人
- ・腎臓に障害がある人
- ・肝臓に障害がある人
- ・授乳中の間

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

通常、成人の使用する量と使用方法は、あなたの体表面積（身長と体重から計算）や症状の程度などにより、医師が決めます。

がんの種類	使用方法
頭頸部がん、肺小細胞がん、睾丸腫瘍、卵巣がん、子宮頸がん、悪性リンパ腫、非小細胞肺がん	1
乳がん	トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びタキサン系抗悪性腫瘍剤との併用の場合
	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）及びゲムシタビン塩酸塩との併用の場合
	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）及びパクチタキセルとの併用の場合
小児悪性固形腫瘍	神経芽腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍、再発又は難治性のユーリング肉腫ファミリー腫瘍・腎芽腫に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法の場合
	網膜芽腫に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法の場合

縦の矢印で示す日に使用し、その後休薬します。副作用の程度などにより、1回の使用量や使用間隔が変更されることがあります。

1	300～400 mg/m ² (体表面積) を1回注射します ^注 。	<p style="text-align: right;">(繰り返す)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="4">1クール</th></tr> <tr><td>1週目</td><td>2週目</td><td>3週目</td><td>4週目</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ 1 日 ↓ 目</p> <p style="text-align: center;">少なくとも4週間</p> <p style="text-align: center;">休薬</p>	1クール				1週目	2週目	3週目	4週目				
1クール														
1週目	2週目	3週目	4週目											
2-1	トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びタキサン系抗悪性腫瘍剤と併用します。 300～400 mg/m ² (体表面積) を1回注射します ^注 。	<p style="text-align: right;">(繰り返す)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="3">1クール</th></tr> <tr><td>1週目</td><td>2週目</td><td>3週目</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ 1 日 ↓ 目</p> <p style="text-align: center;">少なくとも3週間</p> <p style="text-align: center;">休薬</p>	1クール			1週目	2週目	3週目						
1クール														
1週目	2週目	3週目												
2-2	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）及びゲムシタビン塩酸塩と併用します。 AUC（血中濃度曲線下面積） 2 mg・min/mL相当量を 1回注射します ^注 。	<p style="text-align: right;">(繰り返す)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="3">1クール</th></tr> <tr><td>1週目</td><td>2週目</td><td>3週目</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ 1 日 ↓ 目</p> <p style="text-align: center;">↑ 8 日 ↓ 目</p> <p style="text-align: center;">休薬</p>	1クール			1週目	2週目	3週目						
1クール														
1週目	2週目	3週目												
2-3	<p>ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）及びパクリタキセルと併用します。 AUC（血中濃度曲線下面積） 5 mg・min/mL相当量を 1回注射します^注。</p> <p>又はAUC（血中濃度曲線下面積） 1.5 mg・min/mL相当量を1回注射します^注。</p>	<p style="text-align: right;">(4クールまで繰り返す)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="3">1クール</th></tr> <tr><td>1週目</td><td>2週目</td><td>3週目</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ 1 日 ↓ 目</p> <p style="text-align: center;">少なくとも3週間</p> <p style="text-align: center;">休薬</p> <p style="text-align: right;">(4クールまで繰り返す)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="3">1クール</th></tr> <tr><td>1週目</td><td>2週目</td><td>3週目</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">↑ 1 日 ↓ 目</p> <p style="text-align: center;">↓ 6日間 ↓ 休薬</p> <p style="text-align: center;">↑ 8 日 ↓ 目</p> <p style="text-align: center;">↓ 6日間 ↓ 休薬</p> <p style="text-align: center;">↑ 15 日 ↓ 目</p> <p style="text-align: center;">↓ 6日間 ↓ 休薬</p>	1クール			1週目	2週目	3週目	1クール			1週目	2週目	3週目
1クール														
1週目	2週目	3週目												
1クール														
1週目	2週目	3週目												

3-1	<p>イホスファミドとエトポシドと併用します。</p> <p>1日間かけて 635 mg/m^2 (体表面積) を持続注射します。</p> <p>又は2日間かけて 400 mg/m^2 (体表面積) を持続注射します。</p>	<p>(繰り返す)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="3">1クール</th></tr> <tr><th>1週目</th><th>2週目</th><th>3~4週目</th></tr> </table> <p>↑ 1 日 目</p> <p>↓ 1 2 日 日</p> <p>少なくとも3~4週間</p> <p>休薬</p>	1クール			1週目	2週目	3~4週目
1クール								
1週目	2週目	3~4週目						
3-2	<p>ビンクリスチン硫酸塩とエトポシドと併用します。</p> <p>1日間かけて 560 mg/m^2 (体表面積) を持続注射します。</p> <p>36カ月齢以下の患児には、1日間かけて 18.6 mg/kg を持続注射します。</p>	<p>(繰り返す)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="3">1クール</th></tr> <tr><th>1週目</th><th>2週目</th><th>3~4週目</th></tr> </table> <p>↑ 1 日 目</p> <p>↓ 1 日 目</p> <p>少なくとも3~4週間</p> <p>休薬</p>	1クール			1週目	2週目	3~4週目
1クール								
1週目	2週目	3~4週目						

注：30分以上かけて注射します。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・骨髄抑制などの重篤な副作用がおこることがあるので、臨床検査（血液検査、肝機能検査、腎機能検査など）が行われることがあります。使用が長期間にわたると副作用が強くあらわれ、長引くことがあります。
- ・腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度や腎機能検査などが行われることがあります。
- ・G—C S F 製剤が使用されることがあります。
- ・消化器症状（吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振など）があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合にはすぐに医師、薬剤師、看護師に連絡してください。
- ・体の抵抗力が弱まり、かぜのような症状、体がだるい、発熱などの感染症にかかりやすくなることがあります。人ごみを避けたり、外出後は手洗いやうがいなどをしたり、感染症にかかるないように気をつけてください。
- ・出血しやすくなることがあります。出血傾向（歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、あおあざができる、鼻血など）の症状があらわれたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- ・性腺（生殖腺）に副作用があらわれやすくなります。小児の場合や今後子供を望まれる場合は、医師に相談してください。

- ・妊娠する可能性のある女性やパートナーが妊娠する可能性がある男性は、この薬を使用している間および使用を終了してから一定期間は適切に避妊してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
骨髓抑制 こつづいよくせい	発熱、寒気、喉の痛み、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい、頭が重い、動悸（どうき）、息切れ 【汎血球減少】 めまい、鼻血、歯ぐきの出血、出血しやすい、あおあざができる、耳鳴り、息切れ、動悸、発熱、寒気、喉の痛み 【貧血】 体がだるい、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ 【白血球減少、好中球減少】 突然の高熱、寒気、喉の痛み 【血小板減少、出血】 鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血、出血が止まりにくい
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、息苦しい、動悸
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息苦しい、息切れ、発熱
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	体がだるい、むくみ、尿量が減る
ファンコニー症候群 ふあんこにーしょうこうぐん	筋力の低下、骨痛
肝不全 かんふぜん	意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振

重大な副作用	主な自覚症状
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
消化管壞死、消化管穿孔 しょうかかんえし、しょうかかんせんこう	吐き気、激しい腹痛、嘔吐、寒気、発熱、ふらつき、息切れ、意識の低下
消化管出血 しょうかかんしゅつけつ	吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、便に血が混じる、黒い便が出る
消化管潰瘍 しょうかかんかいよう	吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、胃がむかむかする、黒い便が出る
出血性腸炎 しゅつけつせいちょうえん	発熱、ふらつき、息切れ、激しい腹痛、血が混ざった下痢
偽膜性大腸炎 ぎまくせいだいちょうえん	腹痛、血の混ざったゆるい便が出る、ゆるい便が出る、発熱、頭痛、吐き気、冷汗が出る、顔面蒼白、手足が冷たくなる
麻痺性イレウス まひせいれうす	吐き気、嘔吐、お腹が張る、便やおならが出にくい
脳梗塞 のうこうそく	突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしにくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐、突然のめまい、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる
肺梗塞 はいこうそく	発熱、血の混じった痰、胸の痛み、息苦しい
血栓・塞栓症 けっせん・そくせんしょう	吐き気、嘔吐、脱力、激しい頭痛、胸の痛み、押しつぶされるような胸の痛み、突然の息切れ、激しい腹痛、お腹が張る、足の激しい痛み、まひ
心筋梗塞 しんきんこうそく	冷汗が出る、しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい
うつ血性心不全 うつけついしんふぜん	息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加
溶血性尿毒症症候群 ようけつせいにょうどくしょうしようこうぐん	尿量が減る、むくみ、体がだるい、意識の低下、意識の消失、けいれん、深く大きい呼吸、食欲不振、紫色のあざ
急性呼吸窮迫症候群 きゅうせいこきゅうきゅうはくしょうこうぐん	息苦しい、咳、痰、呼吸がはやくなる、脈が速くなる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる
播種性血管内凝固症候群 (D I C) はしゅせいけつかんないぎょうこしょうこうぐん(でいあいしー)	あおあざができる、鼻血、歯ぐきの出血、血尿、便に血が混じる、意識の低下、息切れ、動悸、尿量が減る、皮膚が黄色くなる、白目が黄色くなる
急性膵炎 きゅうせいすいえん	吐き気、嘔吐、激しい上腹部の痛み、背中の痛み、お腹にあざができる、お腹が張る
難聴 なんちょう	人の声、音が聞こえづらい、耳鳴り、耳がつまる感じ

重大な副作用	主な自覚症状
白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む） はくしつのうしょう（かぎやくせいこうはくしつのうしょうしょうこうぐん）	歩行時のふらつき、口のもつれ、動作が鈍くなる、意識の低下、頭痛、意識の消失、けいれん、視力障害
腫瘍崩壊症候群 しゅようほうかいしょうこうぐん	意識の低下、意識の消失、尿量が減る、息苦しい、息切れ
うつ血性乳頭 うつけせいにゅうとう	視力の低下
球後視神経炎 きゅうごししんけいえん	視力の低下、中心部が見づらい、目のかすみ、目を動かすと痛い
皮質盲 ひしつもう	目が見えない
溶血性貧血 ようけついひんけつ	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい、むくみ、疲れやすい、冷汗が出る、ふらつき、まひ、けいれん、発熱、寒気、出血、出血が止まりにくい、出血しやすい、突然の高熱、骨痛、体がかゆくなる、急激に体重が増える、力が入らない、脱力、体重の増加、動作が鈍くなる
頭部	意識の低下、意識の消失、頭痛、めまい、頭が重い、突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然の頭痛、突然のめまい、激しい頭痛
顔面	鼻血、顔面蒼白
眼	視力障害、白目が黄色くなる、視力の低下、中心部が見づらい、目のかすみ、目を動かすと痛い、目が見えない
耳	耳鳴り、人の声、音が聞こえづらい、耳がつまる感じ
口や喉	歯ぐきの出血、吐き気、嘔吐、咳、血を吐く、血の混じった痰、喉の痛み、喉のかゆみ、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、突然の嘔吐、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる、痰、唇が青紫色になる、口のもつれ
胸部	息苦しい、息切れ、動悸、胸の痛み、押しつぶされるような胸の痛み、突然の息切れ、しめ付けられるような胸の痛み、深く大きい呼吸、呼吸がはやくなる
腹部	食欲不振、腹痛、お腹が張る、激しい腹痛、胃がむかむかする激しい上腹部の痛み
背中	背中の痛み
手・足	足の激しい痛み、手足が冷たくなる、突然片側の手足が動かしにくくなる、脈が速くなる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、歩行時のふらつき
皮膚	あおあざができる、じんま疹、紫色のあざ、皮膚が黄色くなる、全身のかゆみ、お腹にあざができる

部位	自覚症状
筋肉	筋力の低下
便	便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）、便に血が混じる、黒い便が出る、血が混ざった下痢、血の混ざったゆるい便が出る、ゆるい便が出る、便やおならが出にくく
尿	尿量が減る、尿の色が濃くなる、血尿

【この薬の形は？】

販売名	カルボプラチナ 点滴静注液 50mg「NK」	カルボプラチナ 点滴静注液 150mg「NK」	カルボプラチナ 点滴静注液 450mg「NK」
性状	無色透明～微黄色透明の液		
形状	バイアル		

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	カルボプラチナ
添加物	-

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社

販売会社：日本化薬株式会社 (<https://www.nipponkayaku.co.jp/>)
くすりの相談窓口

電話：0120-656-216

受付時間：9時～17時30分
(土・日・祝日及び弊社休業日を除く)