

## アネレム静注用 50 mg

### 【この薬は？】

販売名	アネレム静注用 50mg Anerem 50 mg for I.V. Injection
一般名	レミマゾラムベシル酸塩 Remimazolam Besilate
含有量 (1バイアル中)	レミマゾラムベシル酸塩 68.01 mg (レミマゾラムとして 50 mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・ この薬は、全身麻酔剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・ この薬は、脳の興奮状態をしずめることにより、手術中に気持ちや身体を鎮静させる働きがあります。
- ・ 次の目的で、医療機関で使用されます。
  - ・ **全身麻酔の導入及び維持**

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・ 過去にアネレム静注用に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・ 急性閉塞隅角緑内障の人
- ・ 重症筋無力症の人
- ・ ショック状態の人、昏睡状態の人、急性アルコール中毒の人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使用する前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・ 全身状態が著しく悪い人
- ・ 過去に薬物に依存したことがある人
- ・ 脳に器質的な障害のある人
- ・ 肝臓に重度の障害のある人
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人、授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

この薬は注射液です。

使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ 手術の後は医師がこの薬の作用がなくなったことを判断しますが、作用が残っていると感じる場合は、自動車の運転など危険を伴う作業は行わないで下さい。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人、授乳中の人には医師に相談して下さい。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
依存性 いぞんせい	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、手足のふるえ、発汗、幻覚、不眠
徐脈 じよみやく	めまい、立ちくらみ、息切れ、脈が遅くなる、脈がとぶ、気を失う
低血圧 ていけつあつ	脱力感、めまい、ふらつき、立ちくらみ、意識の消失
呼吸抑制 こきゅうよくせい	呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる
覚醒遅延 かくせいちえん	麻酔から覚めるのが遅い
ショック、 アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発汗、脱力感、ふらつき、冷汗が出る
頭部	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない、幻覚、不眠、めまい、立ちくらみ、気を失う、意識の消失
顔面	顔面蒼白（そうはく）
口や喉	喉のかゆみ
胸部	息切れ、呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる、動悸、息苦しい
手・足	手足のふるえ、脈が遅くなる、脈がとぶ、手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹
その他	麻酔から覚めるのが遅い

## 【この薬の形は？】

性状	白色～微黄白色の粉末
形状	

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	レミマゾラムベシル酸塩
添加物	乳糖水和物、デキストラン 40、pH 調節剤

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ムンディファーマ株式会社

お客様相談室

電話：0120-525-272