

## レズロック錠 200mg

### 【この薬は？】

販売名	レズロック錠 200mg REZUROCK Tablets 200mg
一般名	ベルモスジルメシル酸塩 Belumosudil Mesilate
含有量 (1錠中)	ベルモスジルメシル酸塩 242.5mg (ベルモスジルとして200mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている電子添文を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に電子添文情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、選択的 ROCK 2 阻害剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、T 細胞による免疫応答や線維化に関わる酵素 (ROCK 2) を選択的に阻害することで免疫を調整するとともに、線維芽細胞のコラーゲン産生及び細胞増殖を抑制することで組織の線維化を防ぎ、慢性移植片対宿主病の症状を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### **造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病 (ステロイド剤の投与で効果不十分な場合)**

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にレズロック錠に含まれる成分で過敏症のあった人
  - ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・感染症にかかっている人
  - ・肝臓に重度の障害のある人
  - ・授乳中の人
- 肺炎などの重篤な感染症や日和見（ひよりみ）感染があらわれる、または悪化することがあります。  
また、B型肝炎ウイルス、帯状疱疹（たいじょうほうしん）などが再びあらわれることがあります。  
そのため、この薬を飲む前に肝炎ウイルスなどに感染していないか検査がされ、適切な処置がされます。
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人および12歳以上の小児の飲む量および回数は、次のとおりです。

一回量	1錠
飲む回数	1日1回食後

・併用している薬に応じて、効果が不十分な場合には1回1錠を1日2回投与に増量されます。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を飲むことにより、体の抵抗力が弱まり、かぜなどの感染症にかかりやすくなることがあります。人混みを避けたり、外出後は手洗いやうがいなどをしたり、感染症にかからないように気をつけてください。
- ・肝機能障害があらわれることがあるので、この薬を使用している間は定期的に肝機能検査が行われます。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は、この薬を使用することはできません。

ん。

- ・妊娠する可能性がある女性およびパートナーが妊娠する可能性のある男性は、この薬を使用している間および使用終了から1週間は適切な避妊を行ってください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む食品はこの薬の作用が弱まるおそれがあるので、使用を控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
感染症 かんせんしょう	発熱、寒気、体がだるい 【肺炎】 発熱、咳、痰、息切れ、息苦しい 【带状疱疹】 水疱が帯状に生じる発疹、局所の激しい痛み、神経痛

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、寒気、体がだるい
口や喉	咳、痰
胸部	息切れ、息苦しい
皮膚	水疱が帯状に生じる発疹
その他	局所の激しい痛み、神経痛

## 【この薬の形は？】

販売名	レズロック錠200mg
形状	楕円形のフィルムコーティング錠 
直径	長径：14.9mm 短径：7.5mm
厚さ	5.9mm
重さ	525mg
色	微黄色～黄色

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ベルモスジルメシル酸塩
添加剤	結晶セルロース、ヒプロメロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、酸化チタン、マクロゴール4000、タルク、黄色三二酸化鉄

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・ボトル開封後はふたをしっかりと閉め、湿気を避けて保管して下さい。
- ・小分けをする場合には、専用小分けボトル等の湿気を避けられる容器を用いてください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：Meiji Seika ファルマ株式会社

(<https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>)

くすり相談室

電話：(0120)093-396、(03)3273-3539

受付時間：9時～17時(土、日、祝日および当社休業日を除く)