

ワクチン接種を受ける人へのガイド

2020年10月更新

4価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体）

【このワクチンの名前は？】

販売名	メナクトラ筋注 Menactra intramuscular injection
一般名	4価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体） Tetravalent meningococcal vaccine (Diphtheria toxoid conjugate)

ワクチン接種を受ける人へのガイドについて

ワクチンの正しい理解と、重大な副反応の早期発見などに役立てていただくために、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、特に知っていただきたいことをわかりやすく記載しています。添付文書情報はPMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載されています。

※副反応：ワクチンの副作用のこと

【このワクチンの効果は？】

- ・ このワクチンは、次の目的で接種されます。
髄膜炎菌（血清型A、C、YおよびW-135）による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防
 - ・ このワクチンの接種により血清型A、C、YおよびW-135の髄膜炎菌に対する抗体ができ、かかりにくくなります。
- 血清型A、C、YおよびW-135以外による侵襲性髄膜炎菌感染症を予防することはできません（血清型Bによる侵襲性髄膜炎菌感染症は予防することはできません）。
- 既に発症している髄膜炎菌感染症を治療することはできません。
- ジフテリアを予防することはできません。

【このワクチンの接種前に、確認すべきことは？】

- ワクチン接種を受ける人または家族の方などは、このワクチンの効果や副反応などの注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した上で接種を受けてください。
- 医師が問診、検温および診察の結果から、接種できるかどうか判断します。

- 次の人は、このワクチンの接種を受けることはできません。
 - ・ 明らかに発熱（通常37.5℃以上）している人
 - ・ 重篤な急性疾患にかかっている人
 - ・ 過去にこのワクチンに含まれている成分（ジフテリアトキソイドを含む）でアナフィラキシーをおこしたことがある人
 - ・ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適当な状態にあると判断した人
- 次の人は、医師が健康状態や体質に基づいて、接種の適否を判断します。
 - ・ 心臓や血管、腎臓、肝臓、血液の障害や発育の障害などの基礎疾患がある人
 - ・ 他のワクチンの接種を受けて、2日以内に発熱があった人や全身性の発疹などアレルギーが疑われる症状が出たことがある人
 - ・ 過去にけいれんをおこしたことがある人
 - ・ 過去に免疫に異常があると診断されたことがある人や両親や兄弟に先天性免疫不全症の人がいる人
 - ・ このワクチンの成分（ジフテリアトキソイドを含む）に対してアレルギーをおこすおそれがある人
 - ・ 血小板減少症や出血障害がある人
 - ・ 過去にギラン・バレー症候群と診断されたことがある人
 - ・ 高齢の人
- 2歳未満の小児等や妊婦または妊娠している可能性がある人、授乳中の人は医師に相談してください。

【このワクチンの接種スケジュールは？】

● 接種量および回数

1回、0.5mLを筋肉内に接種します。

- 医師が必要と認めた場合には、同時に他のワクチンの接種を受けることができます。

【このワクチンの接種後に気をつけなければならないことは？】

- ・ 接種当日は激しい運動をさけ、接種部位を清潔に保ってください。
- ・ 接種後は、健康状態によく気をつけてください。接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- ・ 接種直後または接種後に、血管迷走神経反射*として失神があらわれることがあります。失神による転倒を避けるために、次のことを守ってください。

- ・接種後30分程度は接種施設で座るなどして体調に変化がないか様子を見てください。
- ・接種後に診察室から待合室などへ移動するときには、看護師さんや保護者の方に腕をもって付き添ってもらってください。
- ・接種後30分間程度は、背もたれや肘かけのあるイスなど、体重を預けられるような場所でまっすぐにしてください。
- ・待っている間は、なるべく立ち上がることを避け、座ってください。
*血管迷走神経反射：注射を打ったときの痛み、恐怖、興奮などによる刺激が脳神経のひとつである迷走神経を介して中枢に伝わり、心拍数が減ったり、血圧がさがったりすることがあります。そのため、気分が悪くなったり、めまいやふらつき、失神などが起こったりします。
- ・接種後に、アナフィラキシー（全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しいなど）がおこることがあります。アナフィラキシーは通常接種後30分以内におこることが多いので、この間接種施設で待機するか、すぐに医師と連絡をとれるようにしておいてください。
- ・他の医師を受診したり、他のワクチンを接種したりする場合は、必ずこのワクチンを接種したことを医師、薬剤師または看護師に伝えてください。

副反応は？

特にご注意いただきたい重大な副反応と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副反応であれば、それぞれの重大な副反応ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師に相談してください。


重大な副反応	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
急性散在性脳脊髄炎 (ADEM) きゅうせいさんざいせいのうせ きずいえん (アデム)	頭痛、発熱、嘔吐、意識の低下、目が見えない、手足が動きにくい、歩きにくい、感覚が鈍い
ギラン・バレー症候群	両側の手や足に力が入らない、歩行時につまずく、階段を昇れない、物がつかみづらい、手足の感覚が鈍くなる、顔の筋肉がまひする、食べ物が飲み込み

	にくい、呼吸が苦しい
横断性脊髄炎 おうだんせいせきずいえん	両足のしびれ・まひ、便が出にくい、尿が出にくい、尿失禁、便失禁
けいれん	顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える

以上の自覚症状を、副反応のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副反応ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき、発熱、感覚が鈍い、顔や手足の筋肉がぴくつく
頭部	めまい、頭痛、一時的にボーっとする、意識の低下、意識の消失
顔面	顔面蒼白、顔の筋肉がまひする
眼	目が見えない、物がつかみづらい
口や喉	喉のかゆみ、嘔吐、食べ物が飲み込みにくい
胸部	呼吸が苦しい、息苦しい、動悸
手・足	手足が冷たくなる、手足が動きにくい、歩きにくい、両側の手や足に力が入らない、歩行時につまずく、手足の感覚が鈍くなる、両足のしびれ・まひ、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹
筋肉	階段を昇れない
便	便が出にくい、便失禁
尿	尿が出にくい、尿失禁

【このワクチンの形は？】

容器の形状	性状
	澄明またはわずかに混濁した液剤

写真はほぼ原寸大です。

【このワクチンに含まれているのは？】

有効成分	髄膜炎菌（血清型A）多糖体ジフテリアトキソイド結合体 髄膜炎菌（血清型C）多糖体ジフテリアトキソイド結合体 髄膜炎菌（血清型Y）多糖体ジフテリアトキソイド結合体 髄膜炎菌（血清型W-135）多糖体ジフテリアトキソイド結合体
添加剤	塩化ナトリウム、無水リン酸一水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム一水和物

【このワクチンについてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副反応などのより詳しい質問がある場合は、医師や薬剤師、看護師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売元： サノフィ株式会社 (<http://e-mr.sanofi.co.jp/>)

サノフィパスツールコールセンター

フリーダイヤル 0120-870-891

受付時間 9時～17時（土日祝日・弊社休業日を除く）