

# ワクチン接種を受ける人へのガイド

2020年10月更新

## 不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)

### 【このワクチンの名前は？】

販売名	「イモバックスポリオ皮下注」 IMOVAX POLIO subcutaneous
一般名	不活化ポリオワクチン(ソークワクチン) Inactivated Poliomyelitis Vaccine (Salk Vaccine)

#### ワクチン接種を受ける人へのガイドについて

ワクチンの正しい理解と、重大な副反応の早期発見などに役立てていただくために、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、特に知っていただきたいことをわかりやすく記載しています。添付文書情報はPMDAホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>に掲載されています。

※副反応：ワクチンの副作用のこと

### 【このワクチンの効果は？】

- ・ このワクチンは、次の目的で接種されます。  
**急性灰白髄炎の予防**
- ・ このワクチンの接種によりポリオウイルス1型、2型及び3型に対する抗体ができ、急性灰白髄炎にかかりにくくなります。

### 【このワクチンの接種前に、確認すべきことは？】

- ワクチン接種を受ける人または家族の方などは、このワクチンの効果や副反応などの注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した上で接種を受けてください。
- 医師が問診、検温および診察の結果から、接種できるかどうか判断します。
- 次の人は、このワクチンの接種を受けることはできません。
  - ・ 明らかに発熱（通常37.5℃以上）している人
  - ・ 重篤な急性疾患にかかっている人
  - ・ 過去にこのワクチンに含まれている成分でアナフィラキシーをおこしたことがある人
  - ・ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適切な状態にあると判断した人


- 次の人は、医師が健康状態や体質に基づいて、接種の適否を判断します。
  - ・ 心臓や血管、腎臓、肝臓、血液の障害や発育の障害などの基礎疾患がある人
  - ・ 他のワクチンの接種を受けて、2日以内に発熱があった人や全身性の発疹などアレルギーが疑われる症状が出たことがある人
  - ・ 過去にけいれんをおこしたことがある人
  - ・ 過去に免疫に異常があると診断されたことがある人や両親や兄弟に先天性免疫不全症の人がいる人
  - ・ このワクチンの成分に対してアレルギーをおこすおそれがある人
- この薬は製造工程でウシ由来成分を使用しています。製造にあたっては、感染症の発生を防止するための方策がとられており、この薬の使用により伝達性海綿状脳（TSE）が伝播したとの報告はありません。しかしながら、理論的な TSE の伝播の可能性を完全には排除できません。
- この薬は製造工程でポリペプチド系およびアミノグリコシド系の抗生物質を使用しています。これらの抗生物質でアレルギーをおこしたことがある人は、接種を受ける前に医師に相談してください。

## 【このワクチンの接種スケジュールは？】

### ● 接種量および回数

初回免疫	3週間～8週間間隔で3回接種
追加免疫	初回免疫から6か月以上経過してから1回接種

[定期接種]



- ・ 個人によって接種スケジュールが異なる場合があります。
- ・ このスケジュール中に、接種を受けられなかった場合は医師に相談してください。

## [任意接種]

- ・ 希望される場合には医師に相談して下さい。

i 定期接種：予防接種法で定められた予防接種を、決められた年齢で受ける場合

ii 任意接種：予防接種法で定められていない予防接種や、定期接種で定められた年齢から外れて受ける場合

- 医師が必要と認めた場合には、同時に他のワクチンの接種を受けることができます。

## 【このワクチンの接種後に気をつけなければならないことは？】

- ・ 接種当日は激しい運動をさげ、接種部位を清潔に保ってください。
- ・ 接種後は、健康状態によく気をつけてください。接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- ・ 接種後に、アナフィラキシー（全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しいなど）がおこることがあります。アナフィラキシーは通常接種後30分以内におこることが多いので、この間接種施設で待機するか、すぐに医師と連絡をとれるようにしておいてください。
- ・ 他の医師を受診したり、他のワクチンを接種したりする場合は、必ずこのワクチンを接種したことを医師、薬剤師または看護師に伝えてください。

## 副反応は？

特にご注意いただきたい重大な副反応と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副反応であれば、それぞれの重大な副反応ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師に相談してください。

重大な副反応	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい

けいれん	顔や手足の筋肉がびくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
------	---

以上の自覚症状を、副反応のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副反応ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき、顔や手足の筋肉がびくつく
頭部	めまい、一時的にボーっとする、意識の低下、意識の消失
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	息苦しい、動悸
手・足	手足が冷たくなる、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

## 【このワクチンの形は？】

容器の形状	性状
	無色透明の液

## 【このワクチンに含まれているのは？】

有効成分	不活化ポリオウイルス 1 型 不活化ポリオウイルス 2 型 不活化ポリオウイルス 3 型
添加剤	フェノキシエタノール、無水エタノール、ホルマリン、M-199 ハンクス、ポリソルベート 80、pH 調節剤

## 【このワクチンについてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副反応などのより詳しい質問がある場合は、医師や薬剤師、看護師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売元： サノフィ株式会社 (<http://e-mr.sanofi.co.jp/>)  
サノフィパスツールコールセンター  
フリーダイヤル 0120-870-891  
受付時間 9時～17時（土日祝日・弊社休業日を除く）