

患者向医薬品ガイド

2023年10月更新

イロクテイト静注用 250 イロクテイト静注用 500 イロクテイト静注用 750 イロクテイト静注用 1000 イロクテイト静注用 1500 イロクテイト静注用 2000 イロクテイト静注用 3000 イロクテイト静注用 4000

【この薬は？】

販売名	イロクテイト 静注用 250 ELOCTATE Intravenous 250	イロクテイト 静注用 500 ELOCTATE Intravenous 500	イロクテイト 静注用 750 ELOCTATE Intravenous 750	イロクテイト 静注用 1000 ELOCTATE Intravenous 1000	イロクテイト 静注用 1500 ELOCTATE Intravenous 1500	イロクテイト 静注用 2000 ELOCTATE Intravenous 2000	イロクテイト 静注用 3000 ELOCTATE Intravenous 3000	イロクテイト 静注用 4000 ELOCTATE Intravenous 4000
一般名	エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え） Efralococog Alfa (Genetical Recombination)							
含有量 （1バイ アル中）	250 国際単位	500 国際単位	750 国際単位	1000 国際単位	1500 国際単位	2000 国際単位	3000 国際単位	4000 国際単位

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・この薬は、血液中に欠乏している血液を固める役割のあるタンパク質（血液凝固第Ⅷ因子）を補うことにより、血が止まりにくくなっている状態を改善します。
- ・次の目的で処方されます。

血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制

- ・この薬は、医療機関において、適切な在宅自己注射教育を受けた患者さんまたは家族の方は、自己注射できます。自己判断で使用を中止したり、量を加減したりせず、医師の指示に従ってください。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・過去にイロクテイトの成分または他の血液凝固第Ⅷ因子製剤で過敏症のあった人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

- ・この薬は注射薬です。

●使用量および回数

- ・使用量と回数は、あなたの症状や体重などにあわせて、医師が決めます。

〔出血が起こってから使用する場合〕

- ・通常、1回の注射で体重1 k gあたり10～30国際単位を投与します。

〔定期的に使用する場合〕

- ・通常、1日目に体重1 k gあたり25国際単位、4日目に体重1 k gあたり50国際単位から開始し、以降はあなたの状態に応じて、投与量は1回の注射で体重1 k gあたり25～65国際単位、投与間隔は3～5日の範囲で適宜調節しながら投与します。
- ・週1回の投与を行う場合は、体重1 k gあたり65国際単位を投与します。

●どのように使用するか？

- ・この薬は添付の溶解液を全量用いて溶解し、ゆっくり静脈内に注射します。
- ・この薬と添付溶解液を冷所保存している場合は、室温（30℃まで）に戻してから溶解してください。また、室温にしたものを再び冷蔵庫に戻さないでください。
- ・添付の溶解液以外は使用しないでください。
- ・この薬に溶解液を全量加えた後、静かに円を描くように回して溶解してください

い。激しく振とうしないでください。

- ・他の薬と混ぜて注射をしないでください。
- ・溶解した液は、無色～微黄色を呈する、澄明～微乳白色です。溶解した液に沈殿物や濁りがあるときは使用しないでください。
- ・溶解した液を注射器に移す場合、添付のフィルター付バイアルアダプターを使用してください。
- ・溶解した液は室温（30℃まで）で6時間保存することができます。6時間以内に使用し、6時間を超えた場合は廃棄してください。
- ・注射が終わった後、容器に残った薬液は細菌感染のおそれがあるので再使用しないでください。
- ・使用済みの針は、そのまま容器等に入れて子供の手の届かないところに保管してください。

●使用し忘れた場合の対応

決して2回分を一度に使用しないでください。

使用し忘れた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用により、血液中に血液凝固第Ⅷ因子に対する抗体（インヒビター）ができることがあります。インヒビターができると、この薬の効果が弱くなります。特に、この薬を使い始めの時期（注射した回数が少ない時期）や短期間に集中してこの薬を使用した時期にインヒビターができやすいことが報告されています。この薬の効果が十分でないと感じられた場合には、ただちに医師に相談してください。
- ・血液凝固第Ⅷ因子の量を確認するため、血液検査が行われることがあります。
- ・小児が使用する場合は、家族の方も正しい使用方法を理解して監督してください。
- ・自己注射をした後、異常を感じた場合や、この薬の効果が十分ではないと感じた場合にはただちに医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しまし

た。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき
頭部	めまい、意識の消失
顔面	顔面蒼白
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

【この薬の形は？】

販売名	イロクテイト 静注用 250	イロクテイト 静注用 500	イロクテイト 静注用 750	イロクテイト 静注用 1000
性状	この薬は凍結乾燥した白色～灰白色の塊または粉末である。添付の溶解液（注射用水）を加えて溶解するとき無色～微黄色を呈する、澄明～微乳白色の液となる。			
含有量	250単位	500単位	750単位	1000単位
容器の形状				

販売名	イロクテイト 静注用 1500	イロクテイト 静注用 2000	イロクテイト 静注用 3000	イロクテイト 静注用 4000
性状	この薬は凍結乾燥した白色～灰白色の塊または粉末である。添付の溶解液（注射用水）を加えて溶解するとき無色～微黄色を呈する、澄明～微乳白色の液となる。			
含有量	1500単位	2000単位	3000単位	4000単位
容器の形状				

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）
添加剤	精製白糖、塩化ナトリウム、L-ヒスチジン、塩化カルシウム水和物、ポリソルベート20

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・使用期限を守ってください。
- ・子供による誤用を避けるため、薬剤の保管には十分注意してください。
- ・凍結を避けて、冷蔵庫（2～8℃）で遮光して保管してください。
- ・光による影響を防ぐため、この薬は外箱に入れた状態で保管してください。
- ・冷蔵庫内で保管することが望ましいですが、室温（30℃まで）で保管することもできます。室温で保管した場合には、使用期限を超えない範囲で6ヵ月以内に使用し、再び冷蔵庫に戻さないでください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

●廃棄方法は？

- ・使用済みの針、薬の瓶および付属品は、医療機関の指示どおりに廃棄してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：サノフィ株式会社（<https://www.sanofi.co.jp/ja/contact>）
くすり相談室
フリーダイヤル 0120-109-905
月～金 9時～17時（祝日・会社休日を除く）