

## デュタステリドカプセル 0.5mgZA 「YD」

### 【この薬は？】

販売名	デュタステリドカプセル 0.5mgZA 「YD」 DUTASTERIDE CAPSULES
一般名	デュタステリド Dutasteride
含有量 (1カプセル中)	0.5mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、男性型脱毛症治療薬と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、テストステロンを、男性型脱毛症に関与する主なアンドロゲンであるジヒドロテストステロンへ変換する1型及び2型5 $\alpha$ 還元酵素を阻害することにより、頭皮中のジヒドロテストステロン濃度を低下させ、発毛作用を示します。
- ・次の病気の人に処方されます。  
**男性における男性型脱毛症**
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にデュタステリドカプセルZA「YD」に含まれる成分及び他の5 $\alpha$ 還元酵素阻害薬で過敏症のあった人
  - ・女性
  - ・小児
  - ・肝臓に重度の障害がある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・肝臓に障害がある人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。  
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	デュタステリドカプセル0.5mgZA「YD」
一回量	1カプセル
飲む回数	1日1回

### ●どのように飲むか？

カプセルは嚙んだり、開けたりせずに、水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・本剤は皮膚を通して体内に吸収されることから、女性や小児はカプセルから漏れた薬剤に触れないでください。漏れた薬剤に触れた場合には、ただちに石鹸と水で洗ってください。
- ・この薬は、血清前立腺特異抗原\*（PSA）に影響を与えるので、前立腺癌等の検査においてPSAの検査を受けるときは、この薬を飲んでいることを検査を行う医師に伝えてください。
  - \*血清前立腺特異抗原（PSA）とは、前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標です。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？


特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
肝機能障害 <small>かんきのうしょうがい</small>	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 <small>おうだん</small>	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、体がかゆくなる
眼	白目が黄色くなる
口や喉	吐き気
腹部	食欲不振
皮膚	皮膚が黄色くなる
尿	尿の色が濃くなる

## 【この薬の形は？】

販売名	デュタステリドカプセル0.5mgZA「YD」
形状	楕円球形の軟カプセル剤 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             デュタステリド 0.5mg ZA YD           </div> PTP シート <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"> <span>前面</span> <span>裏面</span> </div> 
直径	長径：10.9mm、短径：7.0mm
重量	335.7mg
色	淡紅色不透明

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	デュタステリドカプセル 0.5mgZA 「YD」
有効成分	デュタステリド
添加物	中鎖モノ・ジグリセリド、BHT、グリセリン、ゼラチン、コハク化ゼラチン、酸化チタン、三二酸化鉄、中鎖脂肪酸トリグリセリド

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・光と湿気を避けるため、PTP包装のまま、室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：株式会社陽進堂 (<https://www.yoshindo.co.jp/>)

お客様相談室

電話：0120-647-734

受付時間：9時～17時

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）