

2023年9月改訂（第2版）

日本標準商品分類番号

873999

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領 2018（2019年更新版）に準拠して作成

骨粗鬆症治療剤

ラロキシフェン塩酸塩錠

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「あゆみ」

Raloxifene Hydrochloride Tablets 60mg [AYUMI]

剤形	素錠
製剤の規制区分	処方箋医薬品 注意－医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	1錠中 ラロキシフェン塩酸塩…60.0mg
一般名	和名：ラロキシフェン塩酸塩（JAN） 洋名：Raloxifene Hydrochloride（JAN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日	製造販売承認年月日：2017年6月20日（販売名変更による） 薬価基準収載年月日：2018年12月14日（販売名変更による） 販売開始年月日：2016年12月9日
製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	販売元：あゆみ製薬株式会社 製造販売元：シオノケミカル株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	あゆみ製薬株式会社 くすり相談室 TEL 0120-137-413 FAX 0120-431-374 医療関係者向けホームページ https://www.ayumi-pharma.com/medical

本IFは2023年8月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 ー日本病院薬剤師会ー

(2020年4月改訂)

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書（以下、添付文書）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、IF と略す）が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第2小委員会がIFの位置付け、IF記載様式、IF記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がIF記載要領の改訂を行ってきた。

IF記載要領2008以降、IFはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したIFが速やかに提供されることとなった。最新版のIFは、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情報検索のページ (<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>) にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のIFの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせ、IF記載要領2018が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IFに記載する項目配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

IFの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

3. IFの利用にあたって

電子媒体のIFは、PMDAの医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従ってIFを作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により

薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書をPMDAの医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V.5.臨床成績」や「XⅡ.参考資料」、「XⅢ.備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IFは日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には薬機法の広告規則や医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らがIFの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IFを活用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

目次

I. 概要に関する項目	1	VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	17
1. 開発の経緯	1	1. 警告内容とその理由	17
2. 製品の治療学的特性	1	2. 禁忌内容とその理由	17
3. 製品の製剤学的特性	1	3. 効能又は効果に関連する注意とその理由	17
4. 適正使用に関して周知すべき特性	1	4. 用法及び用量に関連する注意とその理由	17
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項	2	5. 重要な基本的注意とその理由	17
6. RMPの概要	2	6. 特定の背景を有する患者に関する注意	17
II. 名称に関する項目	3	7. 相互作用	18
1. 販売名	3	8. 副作用	19
2. 一般名	3	9. 臨床検査結果に及ぼす影響	19
3. 構造式又は示性式	3	10. 過量投与	20
4. 分子式及び分子量	3	11. 適用上の注意	20
5. 化学名（命名法）又は本質	3	12. その他の注意	20
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	3	IX. 非臨床試験に関する項目	21
III. 有効成分に関する項目	4	1. 薬理試験	21
1. 物理化学的性質	4	2. 毒性試験	21
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	X. 管理的事項に関する項目	22
3. 有効成分の確認試験法、定量法	4	1. 規制区分	22
IV. 製剤に関する項目	5	2. 有効期間	22
1. 剤形	5	3. 包装状態での貯法	22
2. 製剤の組成	5	4. 取扱い上の注意	22
3. 添付溶解液の組成及び容量	5	5. 患者向け資材	22
4. 力価	5	6. 同一成分・同効薬	22
5. 混入する可能性のある夾雑物	5	7. 国際誕生年月日	22
6. 製剤の各種条件下における安定性	6	8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準 収載年月日、販売開始年月日	22
7. 調製法及び溶解後の安定性	6	9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等 の年月日及びその内容	22
8. 他剤との配合変化（物理化学的変化）	6	10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその 内容	23
9. 溶出性	7	11. 再審査期間	23
10. 容器・包装	8	12. 投薬期間制限に関する情報	23
11. 別途提供される資材類	8	13. 各種コード	23
12. その他	8	14. 保険給付上の注意	23
V. 治療に関する項目	9	X I. 文献	24
1. 効能又は効果	9	1. 引用文献	24
2. 効能又は効果に関連する注意	9	2. その他の参考文献	25
3. 用法及び用量	9	X II. 参考資料	26
4. 用法及び用量に関連する注意	9	1. 主な外国での発売状況	26
5. 臨床成績	9	2. 海外における臨床支援情報	26
VI. 薬効薬理に関する項目	11	X III. 備考	27
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	11	1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあ たつての参考情報	27
2. 薬理作用	11	2. その他の関連資料	27
VII. 薬物動態に関する項目	12		
1. 血中濃度の推移	12		
2. 薬物速度論的パラメータ	14		
3. 母集団（ポピュレーション）解析	14		
4. 吸収	14		
5. 分布	15		
6. 代謝	15		
7. 排泄	15		
8. トランスポーターに関する情報	16		
9. 透析等による除去率	16		
10. 特定の背景を有する患者	16		
11. その他	16		

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

ラロキシフェン塩酸塩は骨粗鬆症治療剤であり、本邦では平成 16 年に上市されている。旧販売名のラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「SN」は、シオノケミカル株式会社が後発医薬品として開発を企画し、薬食発 1121 第 2 号（平成 26 年 11 月 21 日）に基づき、規格及び試験方法を設定、安定性試験、生物学的同等性試験を実施し、平成 28 年 8 月に承認を取得し、平成 28 年 12 月に発売に至った。その後、名称をラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「あゆみ」へ変更する代替新規申請を行い、平成 29 年 6 月に承認を得て、平成 30 年 12 月に発売に至った。

2. 製品の治療学的特性

- (1) ラロキシフェンはエストロゲン受容体を介して作用を発現する^[1]。骨においてはエストロゲン受容体に結合後、骨代謝回転に関与するサイトカインを介して、エストロゲンと同様な骨吸収抑制作用を示す^{[2][3][4]}。また、脂質代謝に対してもエストロゲンと同様の作用を示す^{[5][6][7][8]}。卵巣切除ラットの子宮重量に関する試験において、エストロゲン 0.1mg/kg/日投与群では子宮重量は 285%増加し、ラロキシフェン 0.01~10mg/kg/日投与群では 18%から 66%増加したが用量反応性は認められなかった^[9]。なお、ラロキシフェン投与により卵巣切除ウサギ（70 及び 210mg/日）及びサル（1 及び 5mg/kg/日）においては子宮重量の増加は認められなかった^{[6][10]}。乳腺刺激作用の有無を確認する目的で、卵巣切除サルを用いて乳腺小葉組織量を計測した結果、ラロキシフェン投与群と対照群との間に差は認められなかった^{[6][11]}。
- (2) 1 日 1 回 1 錠（60mg）、食事や時間に関係なく服用できる。
- (3) 重大な副作用として、静脈血栓塞栓症、肝機能障害が報告されている。（「Ⅷ.-8. (1) 重大な副作用と初期症状」の項（P.19）参照）

3. 製品の製剤学的特性

- (1) 微黄色の楕円形の素錠である。（「Ⅳ.-1. 剤形」の項（P.5）参照）
- (2) PTP シートに製品名・薬効・服用方法を記載している。
- (3) 個装箱から製品名・製造番号・使用期限・GS1 コードを切り取り製品タグとして使用できる。

4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、最適使用推進ガイドライン等	有無	タイトル、参照先
RMP	無	—
追加のリスク最小化活動として作成されている資材	無	—
最適使用推進ガイドライン	無	—
保険適用上の留意事項通知	無	—

(2023 年 8 月 31 日時点)

5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

(1) 承認条件

該当しない

(2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

6. RMPの概要

該当しない

Ⅱ. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「あゆみ」

(2) 洋名

Raloxifene Hydrochloride Tablets 60mg [AYUMI]

(3) 名称の由来

「有効成分名」 + 「剤形」 + 「規格」 + 「屋号」 より命名した。

2. 一般名

(1) 和名（命名法）

ラロキシフェン塩酸塩（JAN）

(2) 洋名（命名法）


Raloxifene Hydrochloride（JAN）

raloxifene（INN）

(3) ステム

抗エストロゲン剤、クロミフェン及びタモキシフェン類縁体：- ifene

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式：C₂₈H₂₇NO₄S · HCl

分子量：510.04

5. 化学名（命名法）又は本質

[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl) benzo [*b*] thien-3-yl] [4-(2-piperidin-1-ylethoxy) phenyl] methanone monohydrochloride (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

該当資料なし

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

微黄色の結晶性の粉末である。

(2) 溶解性

ギ酸にやや溶けやすく、メタノールに溶けにくく、エタノール（99.5）に極めて溶けにくく、水にほとんど溶けない。

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

融点：約 259℃（分解）

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法、定量法

確認試験法：

- (1) ライネッケ塩試液による沈殿反応
- (2) 塩化物の定性反応 (2)
- (3) 赤外吸収スペクトル測定法（塩化カリウム錠剤法）

定量法：

液体クロマトグラフィー




IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別

素錠

(2) 製剤の外観及び性状

色・剤形	微黄色の楕円形の素錠			
外形	表面	裏面	側面	
				
規格	長径	短径	厚さ	重量
	10.8mm	5.9mm	4.3mm	240mg

(3) 識別コード

表示部位：錠剤、PTPシート

表示内容：SK4

(4) 製剤の物性

該当資料なし

(5) その他

該当しない

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量及び添加剤

有効成分 (1錠中)	ラロキシフェン塩酸塩…60.0mg
添加剤	乳糖水和物、クロスポビドン、ポビドン、ポリソルベート 80、ステアリン酸マグネシウム

(2) 電解質等の濃度

該当資料なし

(3) 熱量

該当資料なし

3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

4. 力価

該当しない

5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

6. 製剤の各種条件下における安定性

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度 75%、6 ヶ月）の結果、ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「あゆみ」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

(1) 加速試験^[12]

試験条件：40±1℃、75±5%RH

試験製剤：紙箱入りの PTP 包装

試験項目	規格	開始時	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月
性状	微黄色の楕円形の素錠である	適合	適合	適合	適合
定量試験(%) ^{注)}	95.0～105.0	99.9～101.9	99.7～101.5	99.6～102.3	100.0～101.6

注) 3 ロット各 3 回測定 of 最小値～最大値

その他の試験項目（確認試験、純度試験、製剤均一性試験（質量偏差試験）、溶出試験）についても規格内であった。

(2) 無包装状態の安定性試験^[13]

試験条件：PTP シートから取り出し、無包装としたもの

試験項目：性状、硬度、溶出試験、定量試験

評価方法：「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について（答申）（平成 11 年 8 月 20 日）」に準じる

保存条件		保存期間	性状	硬度	溶出試験	定量試験
温度	40±1℃ 遮光・気密容器（瓶）	3 ヶ月	変化無し	変化無し	変化無し	変化無し
湿度	75±5%RH、25±1℃ 遮光・開放	3 ヶ月	変化有り ^{注1)} (規格外)	変化有り ^{注1)} (規格外)	変化無し	変化無し
光	曝光量 120 万 lx・hr 気密容器	1000lx 50 日	変化有り ^{注2)} (規格内)	変化有り ^{注3)} (規格内)	変化無し	変化無し

注 1) 0.5 ヶ月時点

注 2) 25 日時点

注 3) 50 日時点

7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

8. 他剤との配合変化（物理化学的变化）

該当資料なし

9. 溶出性

溶出挙動における類似性^[14]

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について」(平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号)に基づき実施

試験方法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法 パドル法

試験条件

試験液量：900mL

温度：37.0±0.5℃

試験液：pH1.2、pH5.0、pH6.8、水

回転数：50rpm (pH1.2、pH5.0、pH6.8、水)、100rpm (pH5.0)

判定基準：

○標準製剤が15～30分に平均85%以上溶出する場合

標準製剤の平均溶出率が60%及び85%付近となる適当な2時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又はf2関数の値が42以上である。

(水/50rpm)

○標準製剤が30分以内に平均85%以上溶出しない場合

規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が85%以上となる時、標準製剤の平均溶出率が40%及び85%付近の適当な2時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあるか、又はf2関数の値が42以上である。

(pH5.0/50rpm、pH5.0/100rpm)

○標準製剤が30分以内に平均85%以上溶出しない場合


規定された試験時間において、標準製剤の平均溶出率が50%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にあるか、又はf2関数の値が53以上である。ただし、規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が10%以下の場合、規定された試験時間でのみ評価し、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にある。

(pH1.2/50rpm、pH6.8/50rpm)


試験結果：全ての条件において判定基準に適合した。

<溶出曲線>


pH1.2、50rpm




pH5.0、50rpm




pH6.8、50rpm



水、50rpm



pH5.0、100rpm



(Mean \pm S.D., n = 12)

10. 容器・包装

- (1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報
該当しない
- (2) 包装
100錠 [10錠 (PTP) \times 10]
- (3) 予備容量
該当しない
- (4) 容器の材質
P T P : ポリ塩化ビニル、アルミニウム
バンド : ポリプロピレン
個装箱 : 紙

11. 別途提供される資料類

該当資料なし

12. その他

該当しない

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果
閉経後骨粗鬆症

2. 効能又は効果に関連する注意
設定されていない

3. 用法及び用量

(1) 用法及び用量の解説

通常、ラロキシフェン塩酸塩として、1日1回60mgを経口投与する。

(2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

<副作用等による減量・中止規定>

「VIII.-5. 重要な基本的注意とその理由」の項及び「VIII.-8. 副作用」の項参照

4. 用法及び用量に関連する注意
設定されていない

5. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床薬理試験

該当資料なし

(3) 用量反応探索試験

該当資料なし

(4) 検証的試験

1) 有効性検証試験

有効性及び安全性に関する試験

①国内第III相試験

日本人の閉経後骨粗鬆症女性 284 例を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験において、ラロキシフェン塩酸塩 60mg/日、120mg/日^{註)}又はプラセボを1年間経口投与した(すべての患者にカルシウムとして 500mg/日、ビタミン D200IU/日を補給)。そのうちラロキシフェン塩酸塩 60mg 群(92 例)における結果を下表に示す。ラロキシフェン塩酸塩投与により、腰椎骨密度の有意な増加と、各種骨代謝マーカーの有意な低下が認められた^[15]。

表1)ラロキシフェン塩酸塩60mg群における投与前値からの変化率(%)

	12 週	24 週	40 週	52 週
腰椎骨密度 (第2～第4)	-	+3.3 ^{a)}	+3.7 ^{a)}	+3.5 ^{a)}
血清オステオカルシン	-18.4 ^{a)}	-32.2 ^{a)}	-	-34.5 ^{a)}
骨型アルカリホスファターゼ	-13.7	-41.3 ^{a)}	-	-47.9 ^{a)}
尿中I型コラーゲンC末端テロペプチド/Cr	-35.8 ^{a)}	-43.0 ^{a)}	-	-43.6 ^{a)}
尿中I型コラーゲンN末端テロペプチド/Cr	-25.2 ^{a)}	-34.2 ^{a)}	-	-33.5 ^{a)}

a) プラセボ群との比較で統計学的に有意 ($p < 0.05$) であった。
腰椎骨密度は平均値で、各種骨代謝マーカーは中央値で示した。

副作用発現頻度は、ラロキシフェン塩酸塩 60mg 群で 34.8% (32/92 例) であった。主な副作用は、ほてりが 4.3% (4/92 例)、下肢痙攣、乳房緊満及び皮膚炎が各 3.3% (3/92 例) であった。

②外国第 III 相試験

外国人の閉経後骨粗鬆症女性 7705 例を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験において、ラロキシフェン塩酸塩 60mg/日、120mg/日^{注)}又はプラセボを 3 年間経口投与した (すべての患者にカルシウムとして 500mg/日、ビタミン D400~600IU/日を補給)。ラロキシフェン塩酸塩 60mg 群 (2557 例) において、新規椎体骨折が発生した患者の割合はプラセボ群に対して、既椎体骨折のない患者群で 55%、既椎体骨折のある患者群で 30%低下しており、いずれも統計学的に有意 ($p < 0.05$) であった^[16]。この骨折抑制効果は 4 年まで投与を継続して検討した結果においても維持されていた^[17]。また、投与 1 年目までに自覚症状を伴った新規椎体骨折 (新規臨床椎体骨折) が発生した患者の割合はプラセボ群に比し 68%低下し、統計学的に有意 ($p < 0.05$) であった^[18]。一方、腰椎骨密度 (第 1~第 4) の投与前値からの変化率は、1 年目で+2.5%、2 年目で+2.9%、3 年目で+3.2%と増加し、いずれもプラセボ群と比較して統計学的に有意 ($p < 0.05$) であった^[19]。有害事象発現頻度は、ラロキシフェン塩酸塩 60mg 群で 92.5% (2365/2557 例)、プラセボ群で 92.4% (2380/2576 例) であった。このうち、重篤な有害事象は、ラロキシフェン塩酸塩 60mg 群で 23.9% (610/2557 例)、プラセボ群で 25.2% (650/2576 例) であった^[20]。

注) 本剤の承認された用法及び用量はラロキシフェン塩酸塩として 1 日 1 回 60mg 経口投与である。

2) 安全性試験

該当資料なし

(5) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査 (一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査)、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

該当しない

(7) その他

該当資料なし

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

バゼドキシフェン酢酸塩

注意：関連のある化合物の効能・効果等は、最新の添付文書を参照すること。

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序

ラロキシフェンはエストロゲン受容体を介して作用を発現する^[1]。骨においてはエストロゲン受容体に結合後、骨代謝回転に関与するサイトカインを介して、エストロゲンと同様な骨吸収抑制作用を示す^{[2][3][4]}。また、脂質代謝に対してもエストロゲンと同様の作用を示す^{[5][6][7][8]}。卵巣切除ラットの子宮重量に関する試験において、エストロゲン 0.1mg/kg/日投与群では子宮重量は285%増加し、ラロキシフェン 0.01~10mg/kg/日投与群では18%から66%増加したが用量反応性は認められなかった^[9]。なお、ラロキシフェン投与により卵巣切除ウサギ（70及び210mg/日）及びサル（1及び5mg/kg/日）においては子宮重量の増加は認められなかった^{[6][10]}。乳腺刺激作用の有無を確認する目的で、卵巣切除サルを用いて乳腺小葉組織量を計測した結果、ラロキシフェン投与群と対照群との間に差は認められなかった^{[6][11]}。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

1) 骨密度及び骨強度に及ぼす影響

ラットの卵巣切除モデルにおいてラロキシフェン 1~10mg/kg/日を卵巣切除 4 日後より投与した結果、腰椎、脛骨等における骨密度減少及び骨強度低下を抑制し^{[5][21]}、これらの効果は12ヵ月間投与後でも保持された^[22]。サルにおいてもラロキシフェン1及び5mg/kg/日を卵巣切除翌日より投与した結果、卵巣切除による骨密度減少を抑制し、これらの効果は2年間投与後でも保持され、腰椎における骨密度増加作用と骨強度低下抑制作用との間には正の相関が認められた^[6]。また、卵巣切除したラット及びサルでの生化学的マーカー値の変動から亢進した骨代謝回転に対する抑制効果が示された^{[6][23]}。

2) 骨組織形態に及ぼす影響

ラットの卵巣切除モデルにおいて、ラロキシフェン 3mg/kg/日の投与は海綿骨における骨梁数の減少や骨梁間隙の増大を改善し、正常な微細構造を有する骨を形成した。ラットにおけるこれらの効果は10ヵ月間投与後でも保持された^[7]。

3) 骨折治癒に及ぼす影響

卵巣切除ラットにラロキシフェン 1mg/kg/日を投与し、大腿骨骨折部分における力学的性質及び材質特性を検討した結果、卵巣切除による骨折部分における剛性低下、材質特性（ヤングの剛性率）の低下あるいは骨形成速度の上昇に対する抑制効果が認められた^[24]。

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 臨床試験で確認された血中濃度

1) 単回投与試験

閉経後健康女性 52 例にラロキシフェン塩酸塩 120mg (60mg 錠 2 錠)^{注1)} を空腹時に単回経口投与した時の血漿中ラロキシフェン濃度は複数のピークを示した。C_{max} の CV% は 94.8%、AUC_{0-∞} の CV% は 55.7% を示し、個体間変動が大きいことが示された^{[25][26]}。なお、ラロキシフェン塩酸塩 1.0mg 静脈内投与時^{注1)} の分布容積は 7.5L/kg であった。

表 1) 閉経後健康女性にラロキシフェン塩酸塩 120mg (60mg 錠 2 錠)^{注1)} 単回経口投与時の血漿中ラロキシフェン濃度より算出した薬物動態パラメータ

C _{max} (ng/mL)	t _{max} ^{a)} (hr)	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)	t _{1/2} ^{b)} (hr)
1.635 (94.8)	9 (1~24)	55.9 (55.7)	24.3 (15.8~103.9)

算術平均 (CV%) : n=52

a) 中央値 (範囲) b) 調和平均 (範囲)

2) 反復投与試験

閉経後健康女性 16 例に、ラロキシフェン塩酸塩 60mg を 1 日 1 回 14 日間反復経口投与した。14 日間の反復経口投与により血漿中ラロキシフェン濃度は定常状態に達することが示された。また、60mg 以下において投与量比例性が示された^{[25][27]}。

表 2) 閉経後健康女性にラロキシフェン塩酸塩 60mg を 1 日 1 回 14 日間反復経口投与した時の血漿中ラロキシフェン濃度より算出した薬物動態パラメータ

C _{ss,max} (ng/mL)	C _{ss,ave} (ng/mL)	C _{ss,min} (ng/mL)	t _{max} ^{a)} (hr)	AUC _{ss} (ng·hr/mL)	CL _{p,ss} (L/hr/kg)
1.750(32.4)	1.384(34.2)	1.099(37.0)	8(1~8)	33.2(34.2)	36.5(48.1)

算術平均 (CV%) : n=16

a) 中央値 (範囲)

注 1) 本剤の承認された用法及び用量はラロキシフェン塩酸塩として 1 日 1 回 60mg 経口投与である。

2) 生物学的同等性試験

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について」(平成 24 年 2 月 29 日薬食審査発 0229 第 10 号) に基づき実施

ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「あゆみ」とエビスタ錠 60mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (ラロキシフェン塩酸塩として 60mg) 閉経後健康成人女性に絶食時単回経口投与して血漿中ラロキシフェン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、C_{max}) について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された^[28]。




図1) ラロキシフェン塩酸塩 60mg 錠を単回投与したときの血漿中ラロキシフェン濃度推移

表3) ラロキシフェン塩酸塩 60mg 錠を単回投与したときの薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₉₆ (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	t _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「あゆみ」 (錠剤、60mg)	21.03 ± 6.94	0.57 ± 0.28	9.3 ± 11.3	39.5 ± 25.4
エビスタ錠 60mg (錠剤、60mg)	23.17 ± 8.78	0.60 ± 0.34	11.6 ± 15.1	39.1 ± 29.0

(Mean ± S.D., n=30)

血漿中濃度並びに AUC、C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(3) 中毒域

該当資料なし

(4) 食事・併用薬の影響

1) 食事の影響

外国人の閉経後健康女性 14 例に、空腹時及び食事の摂取下においてラロキシフェン塩酸塩 120mg (60mg 錠 2 錠) 注1) を単回経口投与した結果、空腹時の C_{max} 及び AUC_{0-t} はそれぞれ 0.9ng/mL 及び 41.5ng·hr/mL、食事の摂取下の C_{max} 及び AUC_{0-t} はそれぞれ 1.1ng/mL 及び 49.1ng·hr/mL を示し、これらに統計的に有意な差は認められなかった [29]。

2) 薬物相互作用

① コレステラミン

外国人の閉経後健康女性 14 名において、コレステラミン (無水コレステラミンとして 4~8g を 1~2 回/日) の反復経口投与によりラロキシフェン塩酸塩 120mg (60mg 錠 2 錠) 注1) 単回経口投与時の AUC_{0-t} は 60% 低下した [30]。[10.2 参照]

②アンピシリン

外国人の閉経後健康女性 14 名において、アンピシリン 500mg (4 回/日) の反復経口投与によりラロキシフェン塩酸塩 120mg (60mg 錠 2 錠) ^{注1)} 単回経口投与時の C_{max} は 28%低下した [31]。
[10.2 参照]

注 1) 本剤の承認された用法及び用量はラロキシフェン塩酸塩として 1 日 1 回 60mg 経口投与である。

注 2) 本剤の承認された効能又は効果は閉経後骨粗鬆症である。

「Ⅷ.ー7. 相互作用」の項参照

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) 消失速度定数

0.02282±0.01124 (hr⁻¹) (Mean±S.D., n=30)

(4) クリアランス

該当資料なし

(5) 分布容積

該当資料なし

(6) その他

該当資料なし

3. 母集団 (ポピュレーション) 解析

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸収

バイオアベイラビリティ

外国人の閉経後健康女性 8 例に、クロスオーバーデザインを用いてラロキシフェン塩酸塩 120mg (60mg 錠 2 錠) ^{注1)} の経口投与及びラロキシフェン塩酸塩 1.0mg の静脈内投与^{注1)} を実施し、ラロキシフェンの吸収について評価した。ラロキシフェン塩酸塩 120mg 経口投与時のラロキシフェンの絶対的バイオアベイラビリティは 2.0%、吸収率は 63%であった。なお、ラロキシフェンは腸肝循環することが示唆されている [32]。

注 1) 本剤の承認された用法及び用量はラロキシフェン塩酸塩として 1 日 1 回 60mg 経口投与である。

5. 分布

(1) 血液－脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液－胎盤関門通過性

「Ⅷ.－6. (5) 妊婦」の項参照

(3) 乳汁への移行性

「Ⅷ.－6. (6) 授乳婦」の項参照

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

(6) 血漿蛋白結合率

日本人の閉経後女性 15 例の血漿サンプルを用いて、³H-ラロキシフェンと血漿中蛋白の結合を *in vitro* 試験で評価した。

血漿蛋白結合率の平均値は 97.7% (範囲：96.6～98.5%) であった。また、外国人の閉経後女性の血漿サンプルを用いて評価した結果、³H-ラロキシフェンはアルブミンと 99.6%、α1-酸性糖蛋白質と 88.9%の結合率であった^[33]。

6. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

外国人の健康成人 4 例 (男性^{注2)} 3 例及び閉経後女性 1 例) に ¹⁴C-ラロキシフェン塩酸塩 199.7mg^{注1)} のアルコール性水溶液を単回経口投与した。3 種類のグルクロン酸抱合体のみが血漿中及び尿中に検出され、酸化代謝物は認められなかった。血漿中の未変化体は総放射活性の約 1.0%であった^[34]。

注 1) 本剤の承認された用法及び用量はラロキシフェン塩酸塩として 1 日 1 回 60mg 経口投与である。

注 2) 本剤の承認された効能又は効果は閉経後骨粗鬆症である。

(2) 代謝に関与する酵素 (CYP 等) の分子種、寄与率

該当資料なし

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

該当資料なし

7. 排泄

外国人の健康成人 4 例 (男性^{注2)} 3 例及び閉経後女性 1 例) に ¹⁴C-ラロキシフェン塩酸塩 199.7mg^{注1)} のアルコール性水溶液を単回経口投与した。糞便中に 50～79%、尿中に 3.3～5.5%の放射活性が排泄された^[35]。

注 1) 本剤の承認された用法及び用量はラロキシフェン塩酸塩として 1 日 1 回 60mg 経口投与である。

注 2) 本剤の承認された効能又は効果は閉経後骨粗鬆症である。

8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

9. 透析等による除去率

該当資料なし

10. 特定の背景を有する患者

(1) 腎機能障害

外国人の腎機能正常男性^{注 2)} 10 例及び腎機能障害男性^{注 2)} 10 例にラロキシフェン塩酸塩 120mg (60mg 錠 2 錠)^{注 1)} を単回経口投与した。腎機能障害男性は腎機能正常男性に比較して $AUC_{0-\infty}$ が約 2.2 倍、 C_{max} が約 1.4 倍であった^[36]。[9.2 参照]

(2) 肝機能障害

外国人の健康成人 8 例（閉経後女性 5 例、男性^{注 2)} 3 例）及び肝硬変患者 9 例（閉経後女性 5 例、男性^{注 2)} 4 例）にラロキシフェン塩酸塩 60mg を単回経口投与した。肝硬変患者は健康成人に比較して $AUC_{0-\infty}$ が約 2.5 倍、 C_{max} が約 2.1 倍であった^[37]。[9.3 参照]

注 1) 本剤の承認された用法及び用量はラロキシフェン塩酸塩として 1 日 1 回 60mg 経口投与である。

注 2) 本剤の承認された効能又は効果は閉経後骨粗鬆症である。

11. その他

該当資料なし

Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由

設定されていない

2. 禁忌内容とその理由

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 深部静脈血栓症、肺塞栓症、網膜静脈血栓症等の静脈血栓塞栓症のある患者又はその既往歴のある患者 [これらの症状が増悪することがある。] [8.1、11.1.1 参照]

2.2 長期不動状態（術後回復期、長期安静期等）にある患者 [8.2 参照]

2.3 抗リン脂質抗体症候群の患者 [静脈血栓塞栓症を起こしやすいとの報告がある。]

2.4 妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦 [9.5、9.6 参照]

2.5 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

設定されていない

4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

設定されていない

5. 重要な基本的注意とその理由

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の服用により、静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症、肺塞栓症、網膜静脈血栓症を含む）があらわれることがあるので、患者に対しては、次のような症状が認められた場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明すること。

症状：下肢の疼痛・浮腫、突然の呼吸困難、息切れ、胸痛、急性視力障害等

[2.1、11.1.1 参照]

8.2 静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症、肺塞栓症、網膜静脈血栓症を含む）のリスクが上昇するため、長期不動状態（術後回復期、長期安静期等）に入る 3 日前には本剤の服用を中止し、完全に歩行可能になるまでは投与を再開しないこと。 [2.2 参照]

8.3 患者のカルシウム及び/又はビタミン D の摂取量が十分でない場合は、カルシウム及び/又はビタミン D をそれぞれ補給すること。

6. 特定の背景を有する患者に関する注意

(1) 合併症・既往歴等のある患者

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 経口エストロゲン療法にて顕著な高トリグリセリド血症 (>500mg/dL) の既往歴のある患者

血清トリグリセリド値のモニターを行うこと。本剤の服用により血清トリグリセリド上昇があらわれることがある。

(2) 腎機能障害患者

9.2 腎機能障害患者

国内臨床試験では除外されている。 [16.6.1 参照]

(3) 肝機能障害患者

9.3 肝機能障害患者

国内臨床試験では除外されている。[16.6.2 参照]

(4) 生殖能を有する者

設定されていない

(5) 妊婦

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。妊婦に本剤を投与した場合、胎児に悪影響を及ぼすおそれがある。ウサギでは、流産及び低頻度で胎児心奇形（心室中隔欠損）が認められた。ラットでは、胎児の発達遅延及び発育異常（波状肋骨、腎盂拡張）あるいは分娩遅延又は分娩困難、出生児生存率の低下、身体発育分化の変化、発育分化抑制や下垂体ホルモンの変化、出生児におけるリンパ球組織の減少といった所見が認められ、また、高用量では、分娩困難による母動物及び産児の死亡の報告がある。[2.4 参照]

(6) 授乳婦

9.6 授乳婦

授乳中の女性には投与しないこと。本剤がヒト乳汁中へ移行するかどうかは不明である。[2.4 参照]

(7) 小児等

設定されていない

(8) 高齢者

設定されていない

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

設定されていない

(2) 併用注意とその理由

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
陰イオン交換樹脂 コレスチラミン [16.7.1 参照]	本剤の血中濃度が低下する。	本剤がコレスチラミンに吸着され、消化管内からの吸収量が低下することが知られている。その他の陰イオン交換樹脂についても同様の可能性が考えられる。
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	プロトロンビン時間の減少が報告されている。本剤による治療の開始あるいは終了の際、プロトロンビン時間を注意深くモニターする必要がある。	機序は不明である。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アンピシリン [16.7.2 参照]	本剤の血中濃度が低下するおそれがある。	アンピシリンにより腸内細菌叢が減少することにより本剤の腸肝循環が低下するためと考えられる。

8. 副作用

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(1) 重大な副作用と初期症状

11.1 重大な副作用

11.1.1 静脈血栓塞栓症（頻度不明）

深部静脈血栓症、肺塞栓症、網膜静脈血栓症があらわれることがあるので、下肢の疼痛・浮腫、突然の呼吸困難、息切れ、胸痛、急性視力障害等の症状が認められた場合には投与を中止すること。[2.1、8.1 参照]

11.1.2 肝機能障害（頻度不明）

AST、ALT、 γ -GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害があらわれることがある。

(2) その他の副作用

11.2 その他の副作用

副作用分類	2～5%未満	2%未満	頻度不明
血液			ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板数減少
内分泌・代謝系		血中Al-P減少	血清総蛋白減少、血中アルブミン減少、血清リン減少、血中カルシウム減少
消化器		嘔気	腹部膨満、おくび
肝臓			γ -GTP上昇
皮膚	皮膚炎、そう痒症		
生殖器		膣分泌物	良性の子宮内腔液増加
乳房	乳房緊満		
その他	下肢痙攣、ほてり	多汗	感覚減退、末梢性浮腫、表在性血栓性静脈炎、体重増加

9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

10. 過量投与

13. 過量投与

13.1 症状

1回120mg以上を服用した成人で下肢痙攣、浮動性めまいが報告されている。2歳未満の小児において180mgまで誤って服用したとの報告がある。失調、浮動性めまい、嘔吐、発疹、下痢、振戦、潮紅、Al-P上昇が報告されている。

13.2 処置

特異的解毒剤はない。

11. 適用上の注意

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

12. その他の注意

(1) 臨床使用に基づく情報

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 外国における骨粗鬆症治療（骨折）試験において、本剤投与群はプラセボ群に比べ子宮内膜厚のわずかな増加を示したとの報告がある。臨床的に意味のある子宮内膜増殖であるとまではされていないが、本剤治療中に子宮内膜の異常（原因不明の子宮・性器出血、子宮内膜増殖等）が認められた場合には症状に応じて詳しい検査を行うこと。

15.1.2 外国において、本剤と経口エストロゲン製剤を併用した閉経後女性で子宮内膜厚が増加したとの報告がある。

15.1.3 本剤投与により、対照群に比べ乳癌のリスクの上昇は認められていないが、本剤治療中に乳房に原因不明の異常が認められた場合には症状に応じて詳しい検査を行うこと。

15.1.4 外国で実施された冠動脈疾患がある又はそのリスクが高い閉経後女性を対象注)とした試験^[38]において、本剤投与群において脳卒中による死亡率が高かったとの報告がある。脳卒中による死亡率はプラセボ投与群で1.5/1000人/年に対して本剤投与群で2.2/1000人/年であった。

注) 本剤の承認された効能又は効果は閉経後骨粗鬆症である。

(2) 非臨床試験に基づく情報

15.2 非臨床試験に基づく情報

雌ラット及びマウスにおけるがん原性試験の結果、卵巣腫瘍の発生が認められたとの報告がある。これらの所見は卵胞機能及び性ホルモンバランスの不均衡に起因する変化である可能性が高いと考えられ、げっ歯類に特異的な変化であることが知られている^[39]。長期臨床試験において、卵巣機能が低下した閉経後女性における本剤の投与と腫瘍発生との間に明確な関係は示唆されていない。

Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」の項参照

(2) 安全性薬理試験

該当資料なし

(3) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

(4) がん原性試験

該当資料なし

(5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(6) 局所刺激性試験

該当資料なし

(7) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

有効成分：該当しない

2. 有効期間

3年

3. 包装状態での貯法

室温保存

4. 取扱い上の注意

設定されていない

5. 患者向け資材

患者向医薬品ガイド：有り

くすりのしおり：有り

その他の患者向け資材：ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「あゆみ」を服用される患者さんへ

「XⅢ.2.その他の関連資料」の項参照

6. 同一成分・同効薬

同一成分：エビスタ錠 60mg

同 効 薬：バゼドキシフェン酢酸塩、アレンドロン酸ナトリウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、エストリオール、イプリフラボン、アルファカルシドール、カルシトリオール、メナテトレノン 等

7. 国際誕生年月日

該当しない

8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

販売名	製造販売承認年月日	承認番号	薬価基準収載年月日	販売開始年月日
旧販売名 ラロキシフェン 塩酸塩錠 60mg 「SN」	2016年8月15日	22800AMX00640000	2016年12月9日	2016年12月9日
ラロキシフェン 塩酸塩錠 60mg 「あゆみ」	2017年6月20日 (代替新規承認)	22900AMX00546000	2018年12月14日	2018年12月14日

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。

13. 各種コード

販売名	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJ コード)	HOT (9 桁) 番号	レセプト電算処理 システム用コード
ラロキシフェン 塩酸塩錠 60mg 「あゆみ」	3999021F1120	3999021F1120	125206401	622520602

14. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

X I . 文献

1. 引用文献

1. Grese, TA. et al. : Proc Natl Acad Sci USA. 1997 ; 94 (25) : 14105-14110 (PMID: 9391160) [AYM160215]
2. Glasebrook, AL. et al. : Bone. 1995 ; 16 (Suppl. 1) : 99S [AYM160217]
3. Onoe, Y. et al. : J Bone Miner Res. 2000 ; 15 (3) : 541-549 (PMID : 10750569) [AYM160219]
4. Yang, NN. et al. : Endocrinology. 1996 ; 137 (5) : 2075-2084 (PMID : 8612550) [AYM160218]
5. Sato, M. et al. : J Pharmacol Exp Ther. 1995 ; 272 (3) : 1252-1259 (PMID : 7891341) [AYM170031]
6. Lees, CJ. et al. : Menopause. 2002 ; 9 (5) : 320-328 (PMID : 12218720) [AYM160245]
7. Sato, M. et al. : J Pharmacol Exp Ther. 1996 ; 279 (1) : 298-305 (PMID : 8859007) [AYM170033]
8. Kauffman, RF. et al. : J Pharmacol Exp Ther. 1997 ; 280 (1) : 146-153 (PMID : 8996192) [AYM160220]
9. Black, LJ. et al. : J Clin Invest. 1994 ; 93 (1) : 63-69 (PMID : 8282823) [AYM160221]
10. Bjarnason, NH. et al. : Atherosclerosis. 2001 ; 154 (1) : 97-102 (PMID : 11137087) [AYM160222]
11. SERM の薬理作用プロファイル、乳房 (エビスタ錠 60mg : 2004 年 1 月 29 日承認、申請資料概要ホ.1.2.2.4)
12. シオノケミカル (株) 社内資料 : 安定性試験
13. シオノケミカル (株) 社内資料 : 無包装状態の安定性試験
14. シオノケミカル (株) 社内資料 : 溶出比較による生物学的同等性試験
15. Morii, H. et al. : Osteoporosis International. 2003 ; 14 (10) : 793-800 (PMID : 12955333) [AYM160209]
16. Lufkin, EG. et al. : Rheum Dis Clin North Am. 2001 ; 27 (1) : 163-185 (PMID : 11285993) [AYM160210]
17. Delmas, PD. et al. : J Clin Endocrinol Metab. 2002 ; 87 (8) : 3609-3617 (PIMD : 12161484) [AYM160211]
18. Maricic, M. et al. : Arch Intern Med. 2002 ; 162 (10) : 1140-1143 (PMID : 12020184) [AYM160212]
19. Ettinger, B. et al. : JAMA. 1999 ; 282 (7) : 637-645 (PMID : 10517716) [AYM160213]
20. 海外試験成績、第Ⅲ相試験試験成績、骨粗鬆症治療 (骨折) 試験 (エビスタ錠 60mg : 2004 年 1 月 29 日承認、審査報告書)
21. Turner, CH. et al. : Endocrinology. 1994 ; 135 (5) : 2001-2005 (PMID : 7956922) [AYM170032]
22. モデリング動物を用いた試験 (エビスタ錠 60mg : 2004 年 1 月 29 日承認、申請資料概要ホ.1.1.1)
23. Frolik, CA. et al. : Bone. 1996 ; 18 (6) : 621-627 (PMID : 8806005) [AYM170034]
24. Cao, Y. et al. : J Bone Miner Res. 2002 ; 17 (12) : 2237-2246 (PMID : 12469918) [AYM170035]
25. ヒトにおける薬物動態 (エビスタ錠 60mg : 2004 年 1 月 29 日承認、審査報告書へ.1. (5))
26. 単回投与試験における薬物動態の比較 (エビスタ錠 60mg : 2004 年 1 月 29 日承認、申請資料概要ト.6.3.2)
27. 反復投与試験における薬物動態の比較 (エビスタ錠 60mg : 2004 年 1 月 29 日承認、申請資料概要ト.6.3.3)
28. シオノケミカル (株) 社内資料 : 生物学的同等性試験
29. 食事の影響 (エビスタ錠 60mg : 2004 年 1 月 29 日承認、申請資料概要へ.3.1.7)

30. コレスチラミン又は制酸剤との相互作用試験（エビスタ錠 60mg：2004年1月29日承認、申請資料概要へ.3.8.2）
31. アンピシリンとの相互作用試験（エビスタ錠 60mg：2004年1月29日承認、申請資料概要へ.3.8.1）
32. 絶対的バイオアベイラビリティ及び吸収率の評価（エビスタ錠 60mg：2004年1月29日承認、申請資料概要へ.3.1.3）
33. 日本人と外国人における血漿蛋白結合の評価（エビスタ錠 60mg：2004年1月29日承認、申請資料概要へ.3.4.1）
34. ¹⁴C-塩酸ラロキシフェンを用いた代謝の検討（エビスタ錠 60mg：2004年1月29日承認、申請資料概要へ.3.5.1）
35. ¹⁴C-塩酸ラロキシフェンを用いた排泄の検討（エビスタ錠 60mg：2004年1月29日承認、申請資料概要へ.3.6.1）
36. 腎機能障害患者における薬物動態（エビスタ錠 60mg：2004年1月29日承認、申請資料概要へ.3.7.2）
37. 肝硬変患者における薬物動態（エビスタ錠 60mg：2004年1月29日承認、申請資料概要へ.3.7.1）
38. Barrett, CE. et al. : N Engl J Med. 2006 ; 355 (2) : 125-137 (PMID : 16837676) [AYM170039]
39. Alison, RH. et al. : Toxicol Patho. 1994 ; 22 (2) : 179-186 (PMID : 7973365) [AYM170040]

2. その他の参考文献

該当資料なし

X II . 参考資料

1. 主な外国での発売状況
海外で発売されていない（2023年9月時点）
2. 海外における臨床支援情報
該当資料なし

ⅩⅢ. 備考

1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

(1) 粉碎

個別に照会すること

照会先

表紙「問い合わせ窓口」の項参照

(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

個別に照会すること

照会先

表紙「問い合わせ窓口」の項参照

2. その他の関連資料

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「あゆみ」を服用される患者さんへ

PTP表

ラロキシフェン
塩酸塩錠60mg「あゆみ」

SK4

SK4

1日1錠服用

PTP表

Raloxifene HCl Tab.
60mg「AYUMI」

骨粗しょう症薬 骨粗しょう症薬

ラロキシフェン
塩酸塩錠60mg

ラロキシフェン
塩酸塩錠60mg

1日1錠服用 1日1錠服用

ラロキシフェン塩酸塩は、骨に作用することで効果を発揮するお薬です。女性は、閉経を迎えると女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が低下し、骨の代謝バランスがくずれ、骨粗しょう症の状態になります。ラロキシフェン塩酸塩は、この状態を正常に近づけ、骨がこわれるのを防ぐ作用を持っています。

骨粗しょう症のお薬は、
継続して服用することによって
効果が得られます。

服用にあたって

- 1日1回1錠服用してください。
- 飲み忘れに気づいた場合には、すぐに1回分を飲んでください。1日に2度もしくは2回分を1度に飲まないように注意し、次回からは指示されたとおりに飲んでください。
- おやまって多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。
- 主治医の指示なしに、ご自身の判断で薬を飲むのをやめないでください。

**服用後に
次のような症状があらわれた場合は、
主治医にご相談ください。**

<p>片方のふくらはぎが赤く腫れたり、ふくらはぎを押すと痛む場合</p>	<p>急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感じた場合</p>
<p>急に視力が低下した場合</p>	<p>全身けん怠感、食欲不振、吐き気等があらわれた場合</p>

※手術後など、長期に体を動かさない状態になる場合は、3日前までに服用を休止する必要があるので、主治医にご相談ください。
※その他、何か変だと感じたときは、主治医または薬剤師にご相談ください。

施設名

あゆみ製薬株式会社
東京都中央区銀座4丁目12番15号
E00102
2018年12月現在(B-18C)



2023年9月
(A-23AYM)