

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2013 に準拠して作成

長時間作用型 ARB/持続性 Ca 拮抗薬配合剤
日本薬局方 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠**イルアミクス[®]配合錠LD「杏林」****イルアミクス[®]配合錠HD「杏林」**ILUAMIX[®] Combination Tablets “KYORIN”

剤形	フィルムコーティング錠
製剤の規制区分	劇薬、処方箋医薬品 ^{注)} 注) 注意－医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	イルアミクス配合錠 LD「杏林」： 1錠中、日局イルベサルタン 100mg 及びアムロジピンとして 5mg（日局アムロジピンベシル酸塩 6.93mg）含有 イルアミクス配合錠 HD「杏林」： 1錠中、日局イルベサルタン 100mg 及びアムロジピンとして 10mg（日局アムロジピンベシル酸塩 13.87mg）含有
一般名	和名：イルベサルタン(JAN)/アムロジピンベシル酸塩(JAN) 洋名：Irbesartan(JAN, INN)/Amlodipine Besilate(JAN)
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2018年2月15日 薬価基準収載年月日：2018年6月15日 発売年月日：2018年6月15日
開発・製造販売(輸入)・ 提携・販売会社名	製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社 販売元：杏林製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	キョーリンリメディオ株式会社 学術部 TEL：0120-960189 FAX：0120-189099 受付時間：8時～22時（日、祝日、その他当社の休業日を除く） 医療関係者向けホームページ https://www.med.kyorin-rmd.com/

本 IF は 2023 年 5 月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ <https://www.pmda.go.jp/>にてご確認下さい。

I F利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I F と略す）の位置付け並びに I F 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において I F 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において新たな I F 記載要領 2008 が策定された。

I F 記載要領 2008 では、I F を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-I F）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-I F が提供されることとなった。

最新版の e-I F は、(独) 医薬品医療機器総合機構のホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-I F を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-I F の情報を検討する組織を設置して、個々の I F が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、I F 記載要領の一部改訂を行い I F 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

2. I F とは

I F は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は I F の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された I F は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

【I F の様式】

- ①規格は A 4 判、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ② I F 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「I F 利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2 頁にまとめる。

【 I F の作成】

- ① I F は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I F に記載する項目及び配列は日病薬が策定した I F 記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとの I F の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「 I F 記載要領 2013」と略す）により作成された I F は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（ P D F ）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

【 I F の発行】

- ① 「 I F 記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「 I F 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には I F が改訂される。

3. I F の利用にあたって

「 I F 記載要領 2013」においては、 P D F ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の I F については、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、 I F の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や I F 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の M R 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、 I F の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、 I F が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、 I F の使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

I F を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。 I F は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、 I F があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013 年 4 月改訂)

目 次



I. 概要に関する項目	1	VII. 薬物動態に関する項目	22
1. 開発の経緯	1	1. 血中濃度の推移・測定法	22
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 薬物速度論的パラメータ	24
II. 名称に関する項目	2	3. 吸収	24
1. 販売名	2	4. 分布	24
2. 一般名	2	5. 代謝	25
3. 構造式又は示性式	2	6. 排泄	25
4. 分子式及び分子量	2	7. トランスポーターに関する情報	25
5. 化学名(命名法)	3	8. 透析等による除去率	25
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	3	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	26
7. CAS登録番号	3	1. 警告内容とその理由	26
III. 有効成分に関する項目	4	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)	26
1. 物理化学的性質	4	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	26
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	26
3. 有効成分の確認試験法	4	5. 慎重投与内容とその理由	26
4. 有効成分の定量法	5	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	27
IV. 製剤に関する項目	6	7. 相互作用	28
1. 剤形	6	8. 副作用	30
2. 製剤の組成	6	9. 高齢者への投与	32
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	7	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	33
4. 製剤の各種条件下における安定性	7	11. 小児等への投与	33
5. 調製法及び溶解後の安定性	9	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	34
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	9	13. 過量投与	34
7. 溶出性	10	14. 適用上の注意	34
8. 生物学的試験法	18	15. その他の注意	34
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	18	16. その他	34
10. 製剤中の有効成分の定量法	18	IX. 非臨床試験に関する項目	35
11. 力価	18	1. 薬理試験	35
12. 混入する可能性のある夾雑物	18	2. 毒性試験	35
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	18	X. 管理的事項に関する項目	36
14. その他	18	1. 規制区分	36
V. 治療に関する項目	19	2. 有効期間又は使用期限	36
1. 効能又は効果	19	3. 貯法・保存条件	36
2. 用法及び用量	19	4. 薬剤取扱い上の注意点	36
3. 臨床成績	19	5. 承認条件等	36
VI. 薬効薬理に関する項目	21	6. 包装	36
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	21	7. 容器の材質	36
2. 薬理作用	21	8. 同一成分・同効薬	37
		9. 国際誕生年月日	37
		10. 製造販売承認年月日及び承認番号	37
		11. 薬価基準収載年月日	37

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容.....	37
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容.....	37
14. 再審査期間.....	37
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報.....	37
16. 各種コード.....	37
17. 保険給付上の注意.....	38
XI. 文献	39
1. 引用文献.....	39
2. その他の参考文献.....	39
XII. 参考資料	40
1. 主な外国での発売状況.....	40
2. 海外における臨床支援情報.....	40
XIII. 備考	41
1. その他の関連資料.....	41

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯	本剤は、後発医薬品として薬食発 1121 第 2 号(平成 26 年 11 月 21 日)に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を行い承認申請し、2018 年 2 月に承認を取得、2018 年 6 月に発売に至った。
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1) 選択的 AT ₁ 受容体ブロッカー (ARB) イルベサルタンと Ca 拮抗薬アムロジピンベシル酸塩の配合剤である。 2) 重大な副作用として、血管浮腫、高カリウム血症、ショック、失神、意識消失、腎不全、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、低血糖、横紋筋融解症、無顆粒球症、白血球減少、血小板減少、房室ブロックが報告されている。 (本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。)

II. 名称に関する項目

<p>1. 販売名</p> <p>(1) 和名</p> <p>(2) 洋名</p> <p>(3) 名称の由来</p>	<p>イルアミクス[®]配合錠 LD「杏林」 イルアミクス[®]配合錠 HD「杏林」</p> <p>ILUAMIX[®] Combination Tablets LD “KYORIN” ILUAMIX[®] Combination Tablets HD “KYORIN”</p> <p>イルアミクス：配合剤の統一ブランド名 (日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会の登録商標)</p>
<p>2. 一般名</p> <p>(1) 和名 (命名法)</p> <p>(2) 洋名 (命名法)</p> <p>(3) ステム</p>	<p>イルベサルタン (JAN) アムロジピンベシル酸塩 (JAN)</p> <p>Irbesartan (JAN, INN) Amlodipine Besilate (JAN)</p> <p>アンジオテンシン II 受容体拮抗薬：-sartan カルシウムチャネルブロッカー、ニフェジピン誘導体：-dipine</p>
<p>3. 構造式又は示性式</p>	<p>[イルベサルタン]</p>  <p>[アムロジピンベシル酸塩]</p>  <p>及び鏡像異性体</p>
<p>4. 分子式及び分子量</p>	<p>[イルベサルタン] 分子式：C₂₅H₂₈N₆O 分子量：428.53</p> <p>[アムロジピンベシル酸塩] 分子式：C₂₀H₂₅ClN₂O₅・C₆H₆O₃S 分子量：567.05</p>

II. 名称に関する項目

5. 化学名 (命名法)	[イルベサルタン] 2-Butyl-3-{[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl} -1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one (IUPAC) [アムロジピンベシル酸塩] 3-Ethyl 5-methyl (4 <i>RS</i>)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl) -6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate monobenzenesulfonate (IUPAC)
6. 慣用名、別名、略号、 記号番号	特になし
7. CAS 登録番号	[イルベサルタン] 138402-11-6 (Irbesartan) [アムロジピンベシル酸塩] 111470-99-6 (Amlodipine Besilate) 88150-42-9 (Amlodipine)

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質	
(1) 外観・性状	<p>[イルベサルタン] 白色の結晶性の粉末である。結晶多形が認められる。</p> <p>[アムロジピンベシル酸塩] 白色～帯黄白色の結晶性の粉末である。</p>
(2) 溶解性	<p>[イルベサルタン] 酢酸(100)に溶けやすく、メタノールにやや溶けにくく、エタノール(99.5)に溶けにくく、水にほとんど溶けない。</p> <p>[アムロジピンベシル酸塩] メタノールに溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けにくく、水に溶けにくい。</p>
(3) 吸湿性	該当資料なし
(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点	[アムロジピンベシル酸塩] 約 198°C（分解）
(5) 酸塩基解離定数	該当資料なし
(6) 分配係数	該当資料なし
(7) その他の主な示性値	[アムロジピンベシル酸塩] メタノール溶液(1→100)は旋光性を示さない。
2. 有効成分の各種条件下における安定性	該当資料なし
3. 有効成分の確認試験法	<p>[イルベサルタン] 日本薬局方「イルベサルタン」の確認試験による。 (1) 紫外可視吸光度測定法 (2) 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）</p> <p>[アムロジピンベシル酸塩] 日本薬局方「アムロジピンベシル酸塩」の確認試験による。 (1) 紫外可視吸光度測定法 (2) 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法） (3) 沈殿反応</p>

Ⅲ. 有効成分に関する項目

4. 有効成分の定量法

[イルベサルタン]

日本薬局方「イルベサルタン」の定量法による。

電位差滴定法 (0.1mol/L 過塩素酸で滴定)

[アムロジピンベシル酸塩]

日本薬局方「アムロジピンベシル酸塩」の定量法による。

液体クロマトグラフィー

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、外観及び性状

販売名	イルアミクス配合錠 LD「杏林」	イルアミクス配合錠 HD「杏林」
剤形	フィルムコーティング錠	フィルムコーティング錠
色調	白色～帯黄白色	うすいだいだい色
外観		
本体表示	イルアミクス LD 杏林	イルアミクス HD 杏林
直径(mm)	8.1	8.1
厚さ(mm)	3.9	3.9
重量(mg)	180	180

(2) 製剤の物性

該当資料なし

(3) 識別コード

なし

(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等

該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量

イルアミクス配合錠 LD「杏林」：

1錠中、日局イルベサルタン 100mg 及びアムロジピンとして 5mg（日局アムロジピンベシル酸塩 6.93mg）含有

イルアミクス配合錠 HD「杏林」：

1錠中、日局イルベサルタン 100mg 及びアムロジピンとして 10mg（日局アムロジピンベシル酸塩 13.87mg）含有

(2) 添加物

イルアミクス配合錠 LD「杏林」：

D-マンニトール、結晶セルロース、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、軽質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ

イルアミクス配合錠 HD「杏林」：

D-マンニトール、結晶セルロース、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー、軽質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、

IV. 製剤に関する項目

(3) その他	酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、カルナウバロウ												
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	特になし												
4. 製剤の各種条件下における安定性 ^{1)~3)}	該当しない												
	<p>【加速試験】¹⁾</p> <p><保存条件> 40±1℃、75±5%RH</p> <p><試験検体> PTP 包装品：PTP 包装(ポリプロピレンフィルム、アルミニウム箔)、アルミニウム袋 (アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルム)</p> <p><試験項目及び規格></p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 974 719 1019">試験項目</th> <th data-bbox="719 974 1436 1019">規 格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1019 719 1120">性状</td> <td data-bbox="719 1019 1436 1120">LD：白色～帯黄白色のフィルムコーティング錠 HD：うすいだいだい色のフィルムコーティング錠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1120 719 1359">確認試験</td> <td data-bbox="719 1120 1436 1359">液体クロマトグラフィーにより試験を行うとき、試料溶液のイルベサルタン、アムロジピンのピーク及び標準溶液の主ピークの保持時間は等しい。また、それらのピークの吸収スペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1359 719 1503">製剤均一性</td> <td data-bbox="719 1359 1436 1503">含量均一性試験を行うとき、適合する。 〔イルベサルタン〕 判定値：15.0%以下 〔アムロジピンベシル酸塩〕 判定値：15.0%以下</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1503 719 1794">溶出性</td> <td data-bbox="719 1503 1436 1794">〔イルベサルタン〕 溶出試験第2液/900mL/パドル法/毎分50回転/30分間/70%以上 〔アムロジピンベシル酸塩〕 溶出試験第2液/900mL/パドル法/毎分50回転/30分間/75%以上</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1794 719 1886">定量法</td> <td data-bbox="719 1794 1436 1886">〔イルベサルタン〕 含量：95.0～105.0% 〔アムロジピンベシル酸塩〕 含量：95.0～105.0%</td> </tr> </tbody> </table>	試験項目	規 格	性状	LD：白色～帯黄白色のフィルムコーティング錠 HD：うすいだいだい色のフィルムコーティング錠	確認試験	液体クロマトグラフィーにより試験を行うとき、試料溶液のイルベサルタン、アムロジピンのピーク及び標準溶液の主ピークの保持時間は等しい。また、それらのピークの吸収スペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。	製剤均一性	含量均一性試験を行うとき、適合する。 〔イルベサルタン〕 判定値：15.0%以下 〔アムロジピンベシル酸塩〕 判定値：15.0%以下	溶出性	〔イルベサルタン〕 溶出試験第2液/900mL/パドル法/毎分50回転/30分間/70%以上 〔アムロジピンベシル酸塩〕 溶出試験第2液/900mL/パドル法/毎分50回転/30分間/75%以上	定量法	〔イルベサルタン〕 含量：95.0～105.0% 〔アムロジピンベシル酸塩〕 含量：95.0～105.0%
試験項目	規 格												
性状	LD：白色～帯黄白色のフィルムコーティング錠 HD：うすいだいだい色のフィルムコーティング錠												
確認試験	液体クロマトグラフィーにより試験を行うとき、試料溶液のイルベサルタン、アムロジピンのピーク及び標準溶液の主ピークの保持時間は等しい。また、それらのピークの吸収スペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。												
製剤均一性	含量均一性試験を行うとき、適合する。 〔イルベサルタン〕 判定値：15.0%以下 〔アムロジピンベシル酸塩〕 判定値：15.0%以下												
溶出性	〔イルベサルタン〕 溶出試験第2液/900mL/パドル法/毎分50回転/30分間/70%以上 〔アムロジピンベシル酸塩〕 溶出試験第2液/900mL/パドル法/毎分50回転/30分間/75%以上												
定量法	〔イルベサルタン〕 含量：95.0～105.0% 〔アムロジピンベシル酸塩〕 含量：95.0～105.0%												

IV. 製剤に関する項目

<試験結果>

【イルアミクス配合錠 LD「杏林」】

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
製剤均一性	適	/		適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量) イルベサルタン	99.8%	100.0%	99.8%	99.9%
定量(含量) アムロジピン ベシル酸塩	100.2%	100.4%	98.8%	99.0%

(1ロット n=3 の 3 ロットの平均値)

【イルアミクス配合錠 HD「杏林」】

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
製剤均一性	適	/		適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量) イルベサルタン	100.4%	100.7%	100.6%	100.1%
定量(含量) アムロジピン ベシル酸塩	99.3%	99.3%	99.5%	99.4%

(1ロット n=3 の 3 ロットの平均値)

【無包装状態での安定性】

【イルアミクス配合錠 LD「杏林」】²⁾

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
温度 [40℃、3 ヶ月、遮光・気密ガラス瓶]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 [75%RH、25℃、3 ヶ月、遮光・開放ガラス瓶]	変化なし	変化なし	変化なし	変化あり (規格内) [※]
光 [曝光量 120 万 lx・hr、25℃、60%RH、気密ガラス瓶(無色)]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

[規格] 性状、溶出性、含量の規格は加速試験の<試験項目及び規格>参照、硬度：参考値

※ 113.5N (開始時) → 81.3N(1 ヶ月)、79.2N(2 ヶ月)、87.8N(3 ヶ月)

IV. 製剤に関する項目

〔イルアミクス配合錠HD「杏林」〕³⁾

保存条件	結 果			
	性状	溶出性	含量	硬度
温度 [40℃、3 ヶ月、遮光・気密ガラス瓶]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 [75%RH、25℃、3 ヶ月、遮光・開放ガラス瓶]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
光 [曝光量 120 万 lx・hr、25℃、60%RH、気密ガラス瓶(無色)]	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

〔規格〕性状、溶出性、含量の規格は加速試験の<試験項目及び規格>参照、硬度：参考値

<参考>評価基準

分類	性状	溶出性	定量法(含量)	硬度
変化なし	外観の変化を、ほとんど認めない場合	規格内の場合	含量低下が3%未満の場合	硬度変化が30%未満の場合
変化あり(規格内)	わずかな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合		含量低下が3%以上で、規格値内の場合	硬度変化が30%以上で、硬度が2.0kgf以上の場合
変化あり(規格外)	形状変化や著しい色調変化等を認め、規格を逸脱している場合	規格外の場合	規格外の場合	硬度変化が30%以上で、硬度が2.0kgf未満の場合

本試験は、「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成11年8月20日」を参考に評価しました。本資料は本剤の安定性に関する資料であり、無包装で保存した本剤を使用した場合の有効性・安全性についての評価は実施しておりません。

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)

該当しない

IV. 製剤に関する項目

7. 溶出性⁴⁾

【溶出挙動における同等性】

〔イルアミクス配合錠 LD「杏林」〕

イルアミクス配合錠 HD「杏林」を標準製剤とし、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発 0229 第 10 号）」の C 水準に従い、標準製剤との溶出挙動の比較を行った。

〔イルベサルタン〕

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法（パドル法）

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	溶出試験第 1 液	50 回転/分
pH3.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50 回転/分
pH6.8	溶出試験第 2 液	50 回転/分
水	水	50 回転/分

(1) 平均溶出率

<判定基準>

○標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にある。

(pH1.2/50rpm)

○標準製剤が 15～30 分に平均 85%以上溶出する場合：

標準製剤の平均溶出率が約 60%及び 85%となる適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 50 以上である。

(pH6.8/50rpm)

○標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合：

規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±6%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 61 以上である。

(pH3.0/50rpm、水/50rpm)

IV. 製剤に関する項目

<結 果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)			判定
		イルアミクス 配合錠 LD「杏林」	標準製剤 (イルアミクス 配合錠 HD「杏林」)	差	
pH1.2/50rpm	15	91.9	85.7	+6.2	適合
pH3.0/50rpm	10	15.0	13.4	+1.6	適合
	360	28.0	27.4	+0.6	
pH6.8/50rpm	10	69.2	67.9	+1.3	適合
	15	86.0	82.1	+3.9	
水/50rpm	10	12.8	12.6	+0.2	適合
	360	22.9	22.8	+0.1	

(2) 個々の溶出率

<判定基準>

○標準製剤の平均溶出率が85%以上に達するとき、試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。

(pH1.2/50rpm、pH6.8/50rpm)

○標準製剤の平均溶出率が50%に達しないとき、試験製剤の平均溶出率±9%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±15%の範囲を超えるものがない。


(pH3.0/50rpm、水/50rpm)

<結 果>

溶出条件	最終比較 時点(分)	12 ベッセルの溶出率(%)		判定
		平均値	範囲 (最小値～最大値)	
pH1.2/50rpm	15	91.9	75.6～98.0	適合
pH3.0/50rpm	360	28.0	27.5～28.3	適合
pH6.8/50rpm	15	86.0	83.2～88.6	適合
水/50rpm	360	22.9	22.3～23.7	適合

イルアミクス配合錠 LD「杏林」のイルベサルタンに対する平均溶出率、個々の溶出率ともに、すべての溶出条件において溶出挙動の同等性の判定基準に適合することから、イルアミクス配合錠 LD「杏林」のイルベサルタンの溶出挙動は標準製剤と同等と判定された。

IV. 製剤に関する項目



[アムロジピンベシル酸塩]

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法(パドル法)

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	溶出試験第1液	50回転/分
pH4.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50回転/分
pH6.8	溶出試験第2液	50回転/分
水	水	50回転/分

(1) 平均溶出率

<判定基準>

○標準製剤が15分以内に平均85%以上溶出する場合：

試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出するか、又は15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にある。

(pH1.2/50rpm、pH4.0/50rpm、pH6.8/50rpm)

○標準製剤が30分以内に平均85%以上溶出しない場合：

規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が50%以上85%に達しないとき、標準製剤規定された試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±8%の範囲にあるか、又はf2関数の値が55以上である。

(水/50rpm)

IV. 製剤に関する項目

<結 果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)				判定
		イルアミクス 配合錠 LD 「杏林」	標準製剤 (イルアミクス 配合錠 HD「杏林」)	差	f2 関数 の値	
pH1.2/50rpm	15	91.9	86.3	+4.8	-	適合
pH4.0/50rpm	15	99.9	97.5	+2.4	-	適合
pH6.8/50rpm	15	93.1	92.0	+1.1	-	適合
水/50rpm	10	55.5	47.5	+8.0	57	適合
	360	92.9	83.1	+9.8		

(2) 個々の溶出率

<判定基準>

○標準製剤の平均溶出率が85%以上に達するとき、試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。

(pH1.2/50rpm、pH4.0/50rpm、pH6.8/50rpm)

○標準製剤の平均溶出率が50%以上に達し85%に達しないとき、試験製剤の平均溶出率±12%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±20%の範囲を超えるものがない。


(水/50rpm)

<結 果>

溶出条件	最終比較 時点(分)	12 ベッセルの溶出率(%)		判定
		平均値	範囲 (最小値～最大値)	
pH1.2/50rpm	15	91.9	74.3～100.3	適合
pH4.0/50rpm	15	99.9	95.7～102.2	適合
pH6.8/50rpm	15	93.1	89.8～96.9	適合
水/50rpm	360	92.9	91.1～96.6	適合

イルアミクス配合錠LD「杏林」のアムロジピンベシル酸塩に対する平均溶出率、個々の溶出率ともに、すべての溶出条件において溶出挙動の同等性の判定基準に適合することから、イルアミクス配合錠LD「杏林」のアムロジピンベシル酸塩の溶出挙動は標準製剤と同等と判定された。

IV. 製剤に関する項目



以上より、イリアミクス配合錠 LD「杏林」において、有効成分であるイルベサルタン及びアムロジピンベシル酸塩ともに溶出挙動が標準製剤と同等であることが確認できたため、イリアミクス配合錠 LD「杏林」は標準製剤と溶出挙動が同等と判定された。

【溶出挙動における類似性】

【イリアミクス配合錠 HD「杏林」】

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発 0229 第 10 号）に従い、標準製剤との溶出挙動の比較を行った。

【イルベサルタン】

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法（パドル法）

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	溶出試験第 1 液	50 回転/分
pH3.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50 回転/分
pH6.8	溶出試験第 2 液	50 回転/分
水	水	50 回転/分

<判定基準>

○標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：

試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

IV. 製剤に関する項目

(pH1.2/50rpm)

○標準製剤が 15～30 分に平均 85%以上溶出する場合：

標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近となる適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 15%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 42 以上である。

(pH6.8/50rpm)





○標準製剤が 30 分以内に平均 85%以上溶出しない場合：

規定された試験時間において、標準製剤の平均溶出率が 50%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 \pm 9%の範囲にあるか、又は f2 関数の値が 53 以上である。

(pH3.0/50rpm、水/50rpm)

<結 果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)			判定
		イルアミクス 配合錠 HD「杏林」	標準製剤 (配合錠)	差	
pH1.2/50rpm	15	85.7	90.2	-4.5	適合
pH3.0/50rpm	15	16.6	15.8	+0.8	適合
	360	27.4	29.9	-2.5	
pH6.8/50rpm	10	67.9	70.9	-3.0	適合
	15	82.1	84.2	-2.1	
水/50rpm	10	12.6	10.9	+1.7	適合
	360	22.8	19.7	+3.1	



IV. 製剤に関する項目

[アムロジピンベシル酸塩]

<試験方法>

試験法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法(パドル法)

試験液：以下の試験液 900mL

試験液の温度：37±0.5℃

試験液		回転数
pH1.2	溶出試験第1液	50回転/分
pH5.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50回転/分
pH6.8	溶出試験第2液	50回転/分
水	水	50回転/分

<判定基準>

○標準製剤が15分以内に平均85%以上溶出する場合：

試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出するか、又は15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

(pH1.2/50rpm、pH5.0/50rpm、pH6.8/50rpm)

○標準製剤が30分以内に平均85%以上溶出しない場合：


規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が85%以上となる
とき、標準製剤の平均溶出率が40%及び85%付近の適当な2時点にお
いて、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲に
あるか、又はf2関数の値は42以上である。

(水/50rpm)

<結 果>

溶出条件	判定 時点 (分)	12ベッセルの平均溶出率(%)				判定
		イルアミクス 配合錠HD「杏林」	標準製剤 (配合錠)	差	f2関数 の値	
pH1.2/50rpm	15	86.3	98.8	-12.5	-	適合
pH5.0/50rpm	15	98.2	97.5	+0.7	-	適合
pH6.8/50rpm	15	92.0	98.2	-6.2	-	適合
水/50rpm	5	28.4	38.2	-9.8	37	不適合
	45	66.6	84.5	-17.9		

IV. 製剤に関する項目



イルベサルタンにおいては、すべての溶出試験条件において同等性試験ガイドラインの判定基準に適合しており、両製剤の溶出挙動は類似していると判断した。

アムロジピンベシル酸塩においては、pH1.2/50rpm、pH5.0/50rpm及びpH6.8/50rpmにおいては同等性試験ガイドラインの判定基準に適合したが、水/50rpmでは適合しなかった。しかし、pH6.8において製剤間で平均溶出率に特異的な差が認められなかったため、引き続き健康成人志願者による生物学的同等性試験を実施した。

【公的溶出規格への適合性】

イルアミクス配合錠LD「杏林」及びイルアミクス配合錠HD「杏林」は、日本薬局方医薬品各条に定められたイルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

【イルアミクス配合錠LD「杏林」】

(1) イルベサルタン

試験条件：溶出試験第2液/900mL/パドル法/毎分50回転

溶出規格：30分間/70%以上

30分間の溶出率（3ロットの最小値～最大値）：93.9%～99.9%

(2) アムロジピンベシル酸塩

試験条件：溶出試験第2液/900mL/パドル法/毎分50回転

溶出規格：30分間/75%以上

30分間の溶出率（3ロットの最小値～最大値）：87.5%～98.6%

IV. 製剤に関する項目

	<p>[イルアミクス配合錠 HD「杏林」]</p> <p>(1) イルベサルタン</p> <p>試験条件：溶出試験第 2 液/900mL/パドル法/毎分 50 回転</p> <p>溶出規格：30 分間/70%以上</p> <p>30 分間の溶出率（3 ロットの最小値～最大値）：89.4%～94.8%</p> <p>(2) アムロジピンベシル酸塩</p> <p>試験条件：溶出試験第 2 液/900mL/パドル法/毎分 50 回転</p> <p>溶出規格：30 分間/75%以上</p> <p>30 分間の溶出率（3 ロットの最小値～最大値）：90.8%～98.6%</p>
8. 生物学的試験法	該当しない
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	<p>日本薬局方「イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠」の確認試験による。</p> <p>[イルベサルタン] 液体クロマトグラフィー</p> <p>[アムロジピンベシル酸塩] 液体クロマトグラフィー</p>
10. 製剤中の有効成分の定量法	<p>日本薬局方「イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠」の定量法による。</p> <p>[イルベサルタン] 液体クロマトグラフィー</p> <p>[アムロジピンベシル酸塩] 液体クロマトグラフィー</p>
11. 力価	該当しない
12. 混入する可能性のある夾雑物	該当資料なし
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	特になし
14. その他	特になし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果	高血圧症
	<p><効能・効果に関連する使用上の注意> 過度な血圧低下のおそれ等があり、本剤を高血圧治療の第一選択薬としないこと。</p>
2. 用法及び用量	<p>通常、成人には1日1回1錠（イルベサルタン/アムロジピンとして100mg/5mg 又は 100mg/10mg）を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。</p>
	<p><用法・用量に関連する使用上の注意></p> <ol style="list-style-type: none"> 以下のイルベサルタンとアムロジピンの用法・用量を踏まえ、患者毎に用量を決めること。 イルベサルタン 通常、成人にはイルベサルタンとして50～100mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は200mgまでとする。 アムロジピン ・高血圧症 通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。 原則として、イルベサルタン100mg及びアムロジピンとして5mgを併用している場合、あるいはいずれか一方を使用し血圧コントロールが不十分な場合に、100mg/5mgへの切り替えを検討すること。 原則として、イルベサルタン100mg及びアムロジピンとして5mgを併用若しくは100mg/5mgで血圧コントロールが不十分な場合に、100mg/10mgへの切り替えを検討すること。
3. 臨床成績	
(1) 臨床データパッケージ	該当資料なし
(2) 臨床効果	該当資料なし
(3) 臨床薬理試験	該当資料なし
(4) 探索的試験	該当資料なし

V. 治療に関する項目

(5) 検証的試験	
1) 無作為化並行用量 反応試験	該当資料なし
2) 比較試験	該当資料なし
3) 安全性試験	該当資料なし
4) 患者・病態別試験	該当資料なし
(6) 治療的使用	
1) 使用成績調査・特定 使用成績調査(特別 調査)・製造販売後 臨床試験(市販後臨 床試験)	該当資料なし
2) 承認条件として実 施予定の内容又は 実施した試験の概 要	該当しない

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬： ロサルタンカリウム、カンデサルタン シレキセチル、テルミサルタン、オルメサルタン メドキシミル、バルサルタン、アジルサルタン カルシウム拮抗剤： ニフェジピン、ベニジピン塩酸塩など
2. 薬理作用 (1) 作用部位・作用機序	
(2) 薬効を裏付ける試験成績	〔イルベサルタン〕 ⁵⁾ イルベサルタンはアンジオテンシンⅡ受容体のサブタイプ AT ₁ 受容体の拮抗薬。内因性昇圧物質のアンジオテンシンⅡに対して受容体レベルで競合的に拮抗することにより降圧作用を現す。 〔アムロジピンベシル酸塩〕 ⁶⁾ アムロジピンベシル酸塩はジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬としての作用を示すが、作用の発現が緩徐で持続的であるという特徴を有する。 ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬は膜電位依存性 L 型カルシウムチャネルに特異的に結合し、細胞内へのカルシウムの流入を減少させることにより、冠血管や末梢血管の平滑筋を弛緩させる。
(3) 作用発現時間・持続時間	該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

VII. 薬物動態に関する項目、1. 血中濃度の推移・測定法(3)臨床試験で確認された血中濃度の項を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度⁷⁾

【生物学的同等性試験】

〔イルアミクス配合錠 LD「杏林」〕

イルアミクス配合錠 LD「杏林」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成 24 年 2 月 29 日付薬食審査発 0229 第 10 号)に基づき、イルアミクス配合錠 HD「杏林」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。

〔イルアミクス配合錠 HD「杏林」〕

イルアミクス配合錠 HD「杏林」は、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン (平成 24 年 2 月 29 日付 薬食審査発 0229 第 10 号)」に従い、健康成人男子を対象に生物学的同等性試験を実施した。


1) 血漿中イルベサルタン濃度

イルアミクス配合錠 HD「杏林」と標準製剤をクロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (イルベサルタン 100mg、アムロジピンとして 10mg 含有) 健康成人男子に絶食単回経口投与してイルベサルタンの血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

	評価パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→48} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
イルアミクス配合錠 HD「杏林」	5840.06 ±2760.66	1587.42 ±671.78	1.12±0.74	12.34±8.27
標準製剤 (配合錠)	6223.30 ±2191.80	1488.77 ±662.13	1.58±0.96	12.68±6.32

(Mean±S. D., n=24)

VII. 薬物動態に関する項目




2) 血漿中アムロジピン濃度

イルアミクス配合錠 HD「杏林」と標準製剤をクロスオーバー法によりそれぞれ1錠（イルベサルタン 100mg、アムロジピンとして 10mg 含有）健康成人男子に絶食単回経口投与してアムロジピンの血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

	評価パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0→120} (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
イルアミクス配合錠 HD「杏林」	215.83 ±56.29	5.01±1.07	6.29±1.04	39.14±7.84
標準製剤 (配合錠)	225.72 ±63.82	5.27±1.40	6.21±1.10	38.10±7.22

(Mean±S. D., n=24)



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

VII. 薬物動態に関する項目

(4) 中毒域	該当資料なし
(5) 食事・併用薬の影響	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、7. 相互作用の項を参照
(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因	該当資料なし
2. 薬物速度論的パラメータ	
(1) 解析方法	該当資料なし
(2) 吸収速度定数	該当資料なし
(3) バイオアベイラビリティ	該当資料なし
(4) 消失速度定数	該当資料なし
(5) クリアランス	該当資料なし
(6) 分布容積	該当資料なし
(7) 血漿蛋白結合率	該当資料なし
3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	
(1) 血液-脳関門通過性	該当資料なし
(2) 血液-胎盤関門通過性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(1)の項を参照
(3) 乳汁への移行性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(2)の項を参照

VII. 薬物動態に関する項目

(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への移行性	該当資料なし
5. 代謝	
(1) 代謝部位及び代謝経路	該当資料なし
(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種	アムロジピンの代謝には主として薬物代謝酵素 CYP3A4 が関与していると考えられている。
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	該当資料なし
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	該当資料なし
6. 排泄	
(1) 排泄部位及び経路	該当資料なし
(2) 排泄率	該当資料なし
(3) 排泄速度	該当資料なし
7. トランスポーターに関する情報	該当資料なし
8. 透析等による除去率	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、13. 過量投与の項を参照

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由	該当しない
2. 禁忌内容とその理由 (原則禁忌を含む)	<p>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本剤の成分又はジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 妊婦又は妊娠している可能性のある女性（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照） 3. アリスキレンを投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）[非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。]（「重要な基本的注意」の項参照）
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	V. 治療に関する項目、1. 効能又は効果<効能・効果に関連する使用上の注意>の項を参照
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	V. 治療に関する項目、2. 用法及び用量<用法・用量に関連する使用上の注意>の項を参照
5. 慎重投与内容とその理由	<p>慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者（「重要な基本的注意」の項参照） (2) 高カリウム血症の患者（「重要な基本的注意」の項参照） (3) 重篤な腎機能障害のある患者 [過度の降圧により腎機能を悪化させるおそれがある。] (4) 肝機能障害のある患者、特に胆汁性肝硬変及び胆汁うっ滞のある患者 [イルベサルタンは主に胆汁中に排泄されるため、これらの患者では血中濃度が上昇するおそれがある。アムロジピンは主として肝臓で代謝されるため、肝機能障害のある患者では、血中濃度半減期の延長及び血中濃度－時間曲線下面積(AUC)が増大することがある。アムロジピン高用量(10mg)において副作用の発現頻度が高くなる可能性があるため、増量時には慎重に投与すること。（「副作用」の項参照）] (5) 脳血管障害のある患者 [過度の降圧が脳血流不全を引き起こし、病態を悪化させるおそれがある。] (6) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

重要な基本的注意

- (1) 本剤はイルベサルタンとアムロジピンの配合剤であり、イルベサルタンとアムロジピン双方の副作用が発現するおそれがあるため、適切に本剤の使用を検討すること。
- (2) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、イルベサルタンによる腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
- (3) 高カリウム血症の患者においては、イルベサルタンにより高カリウム血症を増悪させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。
- (4) アリスキレンを併用する場合、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFR が 60mL/min/1.73m² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。
- (5) 本剤の投与によって、一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがあるので、そのような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、特に次の患者では患者の状態を十分に観察すること。
 - 1) 血液透析中の患者
 - 2) 利尿降圧剤投与中の患者
 - 3) 厳重な減塩療法中の患者
- (6) イルベサルタンを含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中に重篤な肝機能障害があらわれたとの報告がある。肝機能検査を実施するなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- (7) 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- (8) 手術前 24 時間は投与しないことが望ましい。
- (9) アムロジピンは血中濃度半減期が長く投与中止後も緩徐な降圧効果が認められるので、本剤投与中止後に他の降圧剤を使用するときは、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

7. 相互作用

アムロジピンの代謝には主として薬物代謝酵素 CYP3A4 が関与していると考えられている。

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

【併用注意】（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン、トリアムテレン等 カリウム補給剤 塩化カリウム	血清カリウム値が上昇することがあるので注意すること。	機序：イルベサルタンのアルドステロン分泌抑制によりカリウム貯留作用が増強する可能性がある。 危険因子：腎機能障害のある患者
アリスキレン	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。 なお、eGFR が 60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
アンジオテンシン変換酵素阻害剤	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。	併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) COX-2 選択的阻害剤	イルベサルタンの降圧作用が減弱するおそれがある。	血管拡張作用を有するプロスタグランジンの合成阻害により、イルベサルタンの降圧作用を減弱させる可能性がある。

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

	腎機能が低下している患者では、さらに腎機能が悪化するおそれがある。	プロスタグランジンの合成阻害により、腎血流量が低下するためと考えられる。
リチウム	イルベサルタンによるリチウム中毒が報告されているので、血中リチウム濃度に注意すること。	リチウムの再吸収はナトリウムと競合するため、イルベサルタンのナトリウム排泄作用により、リチウムの再吸収が促進されると考えられる。
降圧作用を有する薬剤	相互に作用を増強するおそれがある。慎重に観察を行うなど注意して使用する。	相互に作用を増強するおそれがある。
CYP3A4 阻害剤 エリスロマイシン、ジルチアゼム、リトナビル、イトラコナゾール等	エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により、アムロジピンの血中濃度が上昇したとの報告がある。	アムロジピンの代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。
CYP3A4 誘導剤 リファンピシン等	アムロジピンの血中濃度が低下するおそれがある。	アムロジピンの代謝が促進される可能性が考えられる。
グレープフルーツジュース	アムロジピンの降圧作用が増強されるおそれがある。同時服用をしないように注意すること。	グレープフルーツに含まれる成分がアムロジピンの代謝を阻害し、アムロジピンの血中濃度が上昇する可能性が考えられる。
シンバスタチン	アムロジピンとシンバスタチン 80mg (国内未承認の高用量) との併用により、シンバスタチンの AUC が 77% 上昇したとの報告がある。	機序不明。
タクロリムス	アムロジピンとの併用によりタクロリムスの血中濃度が上昇し、腎障害等の	アムロジピンとタクロリムスは、主として CYP3A4 により代謝されるため、併

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

<p>タクロリムスの副作用が発現するおそれがある。併用時にはタクロリムスの血中濃度をモニターし、必要に応じてタクロリムスの用量を調整すること。</p>	<p>用によりタクロリムスの代謝が阻害される可能性が考えられる。</p>
---	--------------------------------------

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と初期症状

重大な副作用（頻度不明）

- 1) **血管浮腫**：顔面、口唇、咽頭、舌等の腫脹を症状とする血管浮腫があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) **高カリウム血症**：重篤な高カリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 3) **ショック、失神、意識消失**：ショック、血圧低下に伴う失神、意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
特に、血液透析中、嚴重な減塩療法中、利尿降圧剤投与中の患者では患者の状態を十分に観察すること。
- 4) **腎不全**：腎不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 5) **劇症肝炎、肝機能障害、黄疸**：劇症肝炎、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 6) **低血糖**：低血糖があらわれることがある（糖尿病治療中の患者であらわれやすい）ので、観察を十分に行い、脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 7) **横紋筋融解症**：筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合には直ちに投与を中止し、

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

- 8) **無顆粒球症、白血球減少、血小板減少**：無顆粒球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 9) **房室ブロック**：房室ブロック（初期症状：徐脈、めまい等）があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(3) その他の副作用

その他の副作用

次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

分類	副作用（頻度不明）
過敏症 ^{注1)}	発疹、瘙痒、蕁麻疹、光線過敏症、多形紅斑、血管炎、血管浮腫
肝臓	肝機能障害、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、ALP 上昇、ビリルビン上昇、 γ -GTP 上昇、LDH 上昇、黄疸、腹水
筋・骨格系	関節痛、筋痙攣、背部痛、筋肉痛、筋力低下、筋緊張亢進
血液	貧血、紫斑、白血球増加、赤血球減少、ヘマトクリット減少、ヘモグロビン減少、白血球減少、好酸球増加、血小板減少
循環器	浮腫 ^{注2)} 、動悸、ほてり（熱感、顔面潮紅等）、失神、頻脈、起立性低血圧、心房細動、胸痛、期外収縮、血圧低下、徐脈、洞房又は房室ブロック、洞停止
消化器	逆流性食道炎、下痢・軟便、口内炎、心窩部痛、便秘、胃腸炎、悪心、嘔吐、胸やけ、胃不快感、口渇、消化不良、排便回数増加、膵炎、腹痛、腹部膨満
腎臓	尿管結石、頻尿・夜間頻尿、クレアチニン上昇、BUN 上昇、尿中蛋白陽性、尿沈渣異常、尿潜血陽性、排尿障害
精神神経系	めまい・ふらつき、頭痛・頭重、眠気、しびれ、末梢神経障害、もうろう感、不眠、振戦、気分動揺、錐体外路症状
代謝異常	CK(CPK) 上昇、尿酸上昇、尿中ブドウ糖陽性、糖尿病、コレステロール上昇、血中カリウム減少、血中カリウム上昇、高血糖

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="486 257 694 504">その他</td> <td data-bbox="694 257 1428 504">脳梗塞、異常感覚、倦怠感、CRP 上昇、咳嗽、体重増加、脱毛、脱力感、勃起障害、鼻出血、鼻炎、霧視、味覚異常、発熱、総蛋白減少、耳鳴、疲労、視力異常、呼吸困難、多汗、（連用により）歯肉肥厚^{注1}、性機能異常、女性化乳房、体重減少、疼痛、皮膚変色</td> </tr> </table> <p data-bbox="486 515 1428 560">注1）このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。</p> <p data-bbox="486 560 1428 660">注2）アムロジピン製剤を増量して10mgを投与した場合に、高い頻度で認められたとの報告がある。</p>	その他	脳梗塞、異常感覚、倦怠感、CRP 上昇、咳嗽、体重増加、脱毛、脱力感、勃起障害、鼻出血、鼻炎、霧視、味覚異常、発熱、総蛋白減少、耳鳴、疲労、視力異常、呼吸困難、多汗、（連用により）歯肉肥厚 ^{注1} 、性機能異常、女性化乳房、体重減少、疼痛、皮膚変色
その他	脳梗塞、異常感覚、倦怠感、CRP 上昇、咳嗽、体重増加、脱毛、脱力感、勃起障害、鼻出血、鼻炎、霧視、味覚異常、発熱、総蛋白減少、耳鳴、疲労、視力異常、呼吸困難、多汗、（連用により）歯肉肥厚 ^{注1} 、性機能異常、女性化乳房、体重減少、疼痛、皮膚変色		
(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧	該当資料なし		
(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度	該当資料なし		
(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法	<p data-bbox="494 1142 1428 1276">(1) 禁忌（次の患者には投与しないこと） 本剤の成分又はジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p data-bbox="494 1288 1428 1467">(2) その他の副作用 このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。 過敏症：発疹、痒痒、蕁麻疹、光線過敏症、多形紅斑、血管炎、血管浮腫</p>		
9. 高齢者への投与	<p data-bbox="494 1534 1428 1668">(1) 高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされているので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。[脳梗塞等が起こるおそれがある。]</p> <p data-bbox="494 1680 1428 1814">(2) 他社が実施した国内臨床試験では65歳未満の非高齢者と65歳以上の高齢者において、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤の効果及び安全性に差はみられなかった。</p> <p data-bbox="494 1825 1428 1960">(3) アムロジピンは、高齢者での体内動態試験で血中濃度が高く、血中濃度半減期が長くなる傾向が認められているので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。</p>		

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。また、投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。[妊娠中期及び末期にアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤又はアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の奇形、肺の低形成等があらわれたとの報告がある。アムロジピンは動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが認められている⁸⁾。]
- (2) 妊娠する可能性のある女性に投与する場合には、本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。
- 1) 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。
 - 2) 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。また、投与中も必要に応じ説明すること。
 - ・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
 - ・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
 - ・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。[妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響（腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等）が認められた例が報告されている^{9)、10)}。]
- (3) 授乳中の女性への投与を避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。[イルベサルタンでは動物実験（ラット）において乳汁中への移行が認められている。また、動物実験（ラット出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験）の50mg/kg/日以上で哺育期間において出生児の体重増加抑制が認められている。アムロジピンではヒト母乳中へ移行することが報告されている¹¹⁾。]

11. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。（使用経験がない。）

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

12. 臨床検査結果に及ぼす影響	該当資料なし
13. 過量投与	<p>症状：イルベサルタン の主な徴候、症状は、著しい 血圧低下、頻脈と考えられる。 アムロジピンは、過度の末梢 血管拡張により、ショックを 含む著しい血圧低下と反射性 頻脈を起こすことがある。</p> <p>処置：通常、次のような 処置を行う。</p> <p>(1) 心・呼吸機能のモニター を行い、頻回に血圧を測定す る。著しい血圧低下が認めら れた場合は、四肢の挙上、輸 液の投与等、心血管系に対す る処置を行う。症状が改善し ない場合は、循環血液量及び 排尿量に注意しながら昇圧剤 の投与を考慮する。</p> <p>(2) 催吐、活性炭投与又は 胃洗浄：アムロジピン服用直 後に活性炭を投与した場合、 アムロジピンの AUC は 99% 減少し、服用 2 時間後では 49%減少したことから、アム ロジピン過量投与時の吸収抑 制処置として活性炭投与が有 効であると報告されている¹²⁾。</p> <p>注意：イルベサルタン及び アムロジピンは蛋白結合率 が高いため、血液透析による 除去は有効ではない。</p>
14. 適用上の注意	<p>薬剤交付時：PTP 包装の 薬剤は PTP シートから取り 出して服用するよう指導す ること。</p> <p>[PTP シートの誤飲により、 硬い鋭角部が食道粘膜へ刺 入し、更には穿孔を起こし て縦隔洞炎等の重篤な合併 症を併発することが報告さ れている。]</p>
15. その他の注意	<p>因果関係は明らかでない が、アムロジピンによる治 療中に心筋梗塞や不整脈 (心室性頻拍を含む) がみ られたとの報告がある。</p>
16. その他	特になし

Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験	
(1) 薬効薬理試験（「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照）	
(2) 副次的薬理試験	該当資料なし
(3) 安全性薬理試験	該当資料なし
(4) その他の薬理試験	該当資料なし
2. 毒性試験	
(1) 単回投与毒性試験	該当資料なし
(2) 反復投与毒性試験	該当資料なし
(3) 生殖発生毒性試験	該当資料なし
(4) その他の特殊毒性	該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分	製 剤	イルアミクス配合錠 LD「杏林」	劇薬、処方箋医薬品 ^{注)}
		イルアミクス配合錠 HD「杏林」	劇薬、処方箋医薬品 ^{注)}
	有効成分	イルベサルタン	該当しない
		アムロジピンベシル酸塩	毒薬
注) 注意－医師等の処方箋により使用すること			
2. 有効期間又は使用期限	使用期限：3年（安定性試験結果に基づく ¹⁾ ）		
3. 貯法・保存条件	気密容器、室温保存		
4. 薬剤取扱い上の注意点			
(1) 薬局での取り扱い上の留意点について	【取扱い上の注意】 使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること。		
(2) 薬剤交付時の取り扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、14. 適用上の注意の項を参照 くすりのしおり：有り		
(3) 調剤時の留意点について	特になし		
5. 承認条件等	該当しない		
6. 包装	イルアミクス配合錠 LD「杏林」	PTP：100錠、140錠、500錠	
	イルアミクス配合錠 HD「杏林」	PTP：100錠、140錠、500錠	
7. 容器の材質	〔PTP包装品〕		
	P T P包装：ポリプロピレンフィルム及びアルミニウム箔 ピロー包装：アルミニウム・ポリエチレンラミネートフィルム 箱：紙		
〔バラ包装品〕			
容器：ポリエチレン			
キャップ：ポリプロピレン			
箱：紙			

X. 管理的事項に関する項目

8. 同一成分・同効薬	同一成分薬：アイミクス配合錠 LD、アイミクス配合錠 HD 同 効 薬：バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合錠 カンデサルタン シレキセチル/アムロジピンベシル酸塩配合錠 テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合錠 アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合錠														
9. 国際誕生年月日	2012年9月28日														
10. 製造販売承認年月日 及び承認番号	<table border="1" data-bbox="480 638 1433 884"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 638 798 683">販売名</th> <th data-bbox="798 638 1117 683">製造販売承認年月日</th> <th data-bbox="1117 638 1433 683">承認番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 683 798 784">イルアミクス 配合錠 LD「杏林」</td> <td data-bbox="798 683 1117 784">2018年2月15日</td> <td data-bbox="1117 683 1433 784">23000AMX00258000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 784 798 884">イルアミクス 配合錠 HD「杏林」</td> <td data-bbox="798 784 1117 884">2018年2月15日</td> <td data-bbox="1117 784 1433 884">23000AMX00257000</td> </tr> </tbody> </table>			販売名	製造販売承認年月日	承認番号	イルアミクス 配合錠 LD「杏林」	2018年2月15日	23000AMX00258000	イルアミクス 配合錠 HD「杏林」	2018年2月15日	23000AMX00257000			
販売名	製造販売承認年月日	承認番号													
イルアミクス 配合錠 LD「杏林」	2018年2月15日	23000AMX00258000													
イルアミクス 配合錠 HD「杏林」	2018年2月15日	23000AMX00257000													
11. 薬価基準収載年月日	2018年6月15日														
12. 効能又は効果追加、 用法及び用量変更追 加等の年月日及びそ の内容	該当しない														
13. 再審査結果、再評価 結果公表年月日及び その内容	該当しない														
14. 再審査期間	該当しない														
15. 投薬期間制限医薬品 に関する情報	本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。														
16. 各種コード	<table border="1" data-bbox="480 1680 1433 2027"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 1680 718 1825">販売名</th> <th data-bbox="718 1680 957 1825">HOT(9桁)番号</th> <th data-bbox="957 1680 1197 1825">厚生労働省薬価 基準収載医薬品 コード</th> <th data-bbox="1197 1680 1433 1825">レセプト 電算コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 1825 718 1926">イルアミクス 配合錠 LD「杏林」</td> <td data-bbox="718 1825 957 1926">126315201</td> <td data-bbox="957 1825 1197 1926">2149118F1011</td> <td data-bbox="1197 1825 1433 1926">622631501</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1926 718 2027">イルアミクス 配合錠 HD「杏林」</td> <td data-bbox="718 1926 957 2027">126316901</td> <td data-bbox="957 1926 1197 2027">2149118F2018</td> <td data-bbox="1197 1926 1433 2027">622631601</td> </tr> </tbody> </table>			販売名	HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価 基準収載医薬品 コード	レセプト 電算コード	イルアミクス 配合錠 LD「杏林」	126315201	2149118F1011	622631501	イルアミクス 配合錠 HD「杏林」	126316901	2149118F2018	622631601
販売名	HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価 基準収載医薬品 コード	レセプト 電算コード												
イルアミクス 配合錠 LD「杏林」	126315201	2149118F1011	622631501												
イルアミクス 配合錠 HD「杏林」	126316901	2149118F2018	622631601												

X. 管理的事項に関する項目

17. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

XI. 文献

1. 引用文献	<ol style="list-style-type: none">1) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： イルアミクス配合錠 LD「杏林」・HD「杏林」の安定性試験に関する資料2) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： イルアミクス配合錠 LD「杏林」の無包装状態での安定性に関する資料3) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： イルアミクス配合錠 HD「杏林」の無包装状態での安定性に関する資料4) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： イルアミクス配合錠 LD「杏林」・HD「杏林」の溶出性に関する資料5) 第十七改正日本薬局方解説書, C-681 (廣川書店 2016)6) 第十七改正日本薬局方解説書, C-284 (廣川書店 2016)7) キョーリンリメディオ株式会社社内資料： イルアミクス配合錠 LD「杏林」・HD「杏林」の生物学的同等性試験に関する資料8) 堀本政夫ほか：応用薬理, 42(2) : 167, 19919) 阿部真也 ほか：周産期医学 47:1353, 201710) 齊藤大祐 ほか：鹿児島産科婦人科学会雑誌 29:49, 202111) Naito T. et al. : J. Hum. Lact., 31(2) : 301, 201512) Laine K. et al. : Br. J. Clin. Pharmacol., 43 : 29, 1997
2. その他の参考文献	該当資料なし

XII. 参考資料

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. 主な外国での発売状況 | 該当しない |
| 2. 海外における臨床支援情報 | 該当資料なし |

XII. 備考

1. その他の関連資料

該当資料なし