


医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

日本薬局方 イフェンプロジル酒石酸塩錠

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg/20mg「トローワ」

IFENPRODIL TARTRATE TABLETS 10 mg “TOWA” /TABLETS 20 mg “TOWA”

製 品 名	イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トローワ」	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トローワ」
剤 形	フィルムコーティング錠	
製 剤 の 規 制 区 分	該当しない	
規 格 ・ 含 量	1錠中 日局 イフェンプロジ ル酒石酸塩 10mg 含有	1錠中 日局 イフェンプロジ ル酒石酸塩 20mg 含有
一 般 名	和 名：イフェンプロジル酒石酸塩 (JAN) 洋 名：Ifenprodil Tartrate (JAN)	
製 造 販 売 承 認 年 月 日	2013年 7月 16日	
薬 価 基 準 収 載 年 月 日	2013年 12月 13日	
発 売 年 月 日	1984年6月2日	1990年7月13日
開 発 ・ 製 造 販 売 (輸 入) ・ 提 携 ・ 販 売 会 社 名	製造販売元：東和薬品株式会社	
医 薬 情 報 担 当 者 の 連 絡 先	電話番号： FAX：	
問 い 合 わ せ 窓 口	東和薬品株式会社 学術部 DIセンター(24時間受付対応)  0120-108-932 TEL 06-6900-9108 FAX 06-6908-5797 http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff	

本IFは2014年3月改訂(第13版、日本薬局方改正に伴う改訂)の添付文書の記載に基づき作成した。
最新の添付文書情報は医薬品医療機器情報提供ホームページ

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>にてご確認ください。

IF 利用の手引きの概要 — 日本病院薬剤師会 —

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書(以下、添付文書と略す)がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬と略す)学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」(以下、IF と略す)の位置付け並びに IF 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において IF 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において IF 記載要領 2008 が策定された。

IF 記載要領 2008 では、IF を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること(e-IF)が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-IF が提供されることとなった。

最新版の e-IF は、(独)医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IF を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-IF の情報を検討する組織を設置して、個々の IF が添付文書を保管する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF 記載要領の一部改訂を行い IF 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

2. IF とは

IF は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された IF は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

[IFの様式]

- ①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体(図表は除く)で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤字・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

[IFの作成]

- ①IFは原則として製剤の投与経路別(内用剤、注射剤、外用剤)に作成される。
- ②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとのIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」(以下、「IF記載要領 2013」と略す)により作成されたIFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体(PDF)から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IFの発行]

- ①「IF記載要領 2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については、「IF記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果(臨床再評価)が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。

3. IFの利用にあたって

「IF記載要領 2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013年4月)

目 次

I. 概要に関する項目	1	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	23
1. 開発の経緯	1	1. 警告内容とその理由	23
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)	23
II. 名称に関する項目	2	3. 効能・効果に関連する使用上の注意とその理由	23
1. 販売名	2	4. 用法・用量に関連する使用上の注意とその理由	23
2. 一般名	2	5. 慎重投与内容とその理由	23
3. 構造式又は示性式	2	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	23
4. 分子式及び分子量	2	7. 相互作用	23
5. 化学名(命名法)	3	8. 副作用	24
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	3	9. 高齢者への投与	24
7. CAS登録番号	3	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	24
III. 有効成分に関する項目	4	11. 小児等への投与	24
1. 物理化学的性質	4	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	25
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	13. 過量投与	25
3. 有効成分の確認試験法	5	14. 適用上の注意	25
4. 有効成分の定量法	5	15. その他の注意	25
IV. 製剤に関する項目	6	16. その他	25
1. 剤形	6	IX. 非臨床試験に関する項目	26
2. 製剤の組成	6	1. 薬理試験	26
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	7	2. 毒性試験	26
4. 製剤の各種条件下における安定性	8	X. 管理的事項に関する項目	27
5. 調製法及び溶解後の安定性	11	1. 規制区分	27
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	11	2. 有効期間又は使用期限	27
7. 溶出性	12	3. 貯法・保存条件	27
8. 生物学的試験法	15	4. 薬剤取扱い上の注意点	27
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	15	5. 承認条件等	27
10. 製剤中の有効成分の定量法	15	6. 包装	27
11. 力価	15	7. 容器の材質	28
12. 混入する可能性のある夾雑物	15	8. 同一成分・同効薬	28
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	15	9. 国際誕生年月日	28
14. その他	15	10. 製造販売承認年月日及び承認番号	28
V. 治療に関する項目	16	11. 薬価基準収載年月日	28
1. 効能・効果	16	12. 効能・効果追加、用法・用量変更追加等の年月日及びその内容	28
2. 用法・用量	16	13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	29
3. 臨床成績	16	14. 再審査期間	29
VI. 薬効薬理に関する項目	18	15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	29
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	18	16. 各種コード	29
2. 薬理作用	18	17. 保険給付上の注意	29
VII. 薬物動態に関する項目	19	XI. 文 献	30
1. 血中濃度の推移・測定法	19	1. 引用文献	30
2. 薬物速度論的パラメータ	21	2. その他の参考文献	30
3. 吸収	21	XII. 参考資料	30
4. 分布	21	1. 主な外国での発売状況	30
5. 代謝	22	2. 海外における臨床支援情報	30
6. 排泄	22	XIII. 備 考	31
7. トランスポーターに関する情報	22	その他の関連資料	31
8. 透析等による除去率	22		

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

イフェンプロジル酒石酸塩錠はイフェンプロジル酒石酸塩を有効成分とする製剤で、本邦では1979年に上市されている。東和薬品株式会社が後発医薬品として、イブロノール錠及びイブロノール錠20の開発を企画し、薬発第698号(昭和55年5月30日)に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を実施し、1984年2月、1990年1月にそれぞれ承認を取得し、1984年6月、1990年7月に発売した。

その後、医療事故防止のため、2004年7月にイブロノール錠10mg及びイブロノール錠20mgとそれぞれ販売名の変更を行った。更に、2013年12月にイフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」及びイフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」とそれぞれ販売名の変更を行い、現在に至る。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

臨床的特性

有用性：イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」及びイフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」は、脳梗塞後遺症、脳出血後遺症に伴うめまいの改善に対して、通常成人には、イブロノール錠10mgは1回2錠(イフェンプロジル酒石酸塩として20mg)、イブロノール錠20mgは1回1錠(イフェンプロジル酒石酸塩として20mg)を1日3回毎食後経口投与することにより、有用性が認められている。

安全性：本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

副作用として、口渇、悪心・嘔吐、食欲不振、胸やけ、下痢、便秘、頭痛、めまい、発疹、皮膚そう痒感、動悸、AST(GOT)上昇・ALT(GPT)上昇等が報告されている。〔Ⅷ. 8. (3) その他の副作用の項を参照〕

Ⅱ. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トーワ」

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」

(2) 洋名

IFENPRODIL TARTRATE TABLETS 10 mg “TOWA”

IFENPRODIL TARTRATE TABLETS 20 mg “TOWA”

(3) 名称の由来

一般名＋剤形＋規格(含量)＋「トーワ」

〔「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」(平成 17 年 9 月 22 日 薬食審査発第 0922001 号)に基づく〕

2. 一般名

(1) 和名(命名法)

イフェンプロジル酒石酸塩 (JAN)


(2) 洋名(命名法)

Ifenprodil Tartrate (JAN)

(3) ステム

-dil : 血管拡張剤

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式 : (C₂₁H₂₇NO₂)₂ · C₄H₆O₆

分子量 : 800.98

5. 化学名(命名法)

(1*RS*,2*SR*)-4-[2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl] phenol hemi-(2*R*,3*R*)-tartrate
(IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

別名：酒石酸イフェンプロジル

7. CAS登録番号

23210-58-4

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色の結晶性の粉末で、においはない。

(2) 溶解性

溶 媒	1g を溶かすのに要する溶媒量		溶 解 性
酢酸(100)	10mL 未満	10mL 未満	溶けやすい
エタノール(95)	10mL 以上	30mL 未満	やや溶けやすい
水	100mL 以上	1000mL 未満	溶けにくい
メタノール	100mL 以上	1000mL 未満	溶けにくい
ジエチルエーテル	10000mL 以上		ほとんど溶けない

(3) 吸 湿 性

該当資料なし

(4) 融点(分解点)・沸点・凝固点

融点：約 148°C(分解)

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

旋光度： $[\alpha]_D^{20}$ ：+11～+15° [脱水物に換算したもの 1g, エタノール(95), 20mL, 100mm]

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法

日局「イフェンプロジル酒石酸塩」の確認試験による







4. 有効成分の定量法

日局「イフェンプロジル酒石酸塩」の定量法による

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、外観及び性状

製品名	イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」			イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」			
剤形の区別	フィルムコーティング錠						
性状	白色のフィルムコーティング錠			白色～微黄白色の フィルムコーティング錠			
識別 コード	本体	表：Tw、裏：IB			表：Tw、裏：IB 20		
	包装	Tw.IB			Tw.IB ₂₀		
外形	表 	裏 	側面 	表 	裏 	側面 	
錠径(mm)	6.1			7.1			
厚さ(mm)	2.8			3.2			
質量(mg)	90			136			

(2) 製剤の物性

製品名	イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」
硬度	6.9kg 重	8.3kg 重

(3) 識別コード

(1) 剤形の区別、外観及び性状の項を参照

(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等

該当しない

2. 製剤の組成

(1) 有効成分(活性成分)の含量

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」

1錠中 日局 イフェンプロジル酒石酸塩 10mg を含有する。

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」

1錠中 日局 イフェンプロジル酒石酸塩 20mg を含有する。

(2) 添 加 物

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」

使用目的	添 加 物
賦形剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン
結合剤	ヒドロキシプロピルセルロース
滑沢剤	ステアリン酸 Mg、タルク
コーティング剤	ヒプロメロース、マクロゴール 6000
着色剤	酸化チタン

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」

使用目的	添 加 物
賦形剤	乳糖水和物、結晶セルロース
結合剤	ヒドロキシプロピルセルロース
滑沢剤	ステアリン酸 Mg
コーティング剤	ヒプロメロース、マクロゴール 6000、タルク、酸化チタン

(3) その他

該当資料なし

3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性

(1) 加速試験

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」¹⁾

包装形態：PTP 包装しポリエチレン袋に入れ、缶に入れた製品

試験条件：40℃、75%RH、3ロット(n=3)

試験項目	開始時	6 箇月
性状	白色の胃溶性フィルムコーティング錠	同左
確認試験	適合	同左
崩壊時間(分)	8.8~10.8	9.4~11.0
含量(%)	99.0~101.4	99.0~100.4

包装形態：ポリエチレン袋に入れ、缶に入れた製品

試験条件：40℃、75%RH、3ロット(n=3)

試験項目	開始時	6 箇月
性状	白色の胃溶性フィルムコーティング錠	同左
確認試験	適合	同左
崩壊時間(分)	8.8~10.8	9.1~10.3
含量(%)	99.0~101.4	98.8~101.2

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」²⁾

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：40℃、75%RH、3ロット(n=3)

試験項目	開始時	6 箇月
性状	白色のフィルムコーティング錠	同左
確認試験	適合	同左
崩壊時間(分)	18.0~19.3	18.8~19.3
含量(%)	97.7~100.6	97.5~100.3

包装形態：ポリエチレン袋に入れた製品

試験条件：40℃、75%RH、3ロット(n=3)

試験項目	開始時	6 箇月
性状	白色のフィルムコーティング錠	同左
確認試験	適合	同左
崩壊時間(分)	18.0~19.3	18.6~19.7
含量(%)	97.7~100.6	98.0~99.4

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度 75%、6 箇月)の結果、イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」及びイフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」は通常の市場流通下においてそれぞれ 3 年間安定であることが推測された。

(2) 長期保存試験

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」³⁾

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：25℃、60%RH、2 ロット(n=1)

試験項目	開始時	5年6箇月
性状	白色のフィルムコーティング錠	同左
確認試験	適合	同左
溶出率(%)	89~101	93~102
含量(%)	99.4~100.7	101.2~101.3

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：25℃、60%RH、1 ロット(n=1)

試験項目	開始時	6年
性状	白色のフィルムコーティング錠	やや黄みがかっていたが、規格内の変化であった
確認試験	適合	同左
溶出率(%)	71~100*	95~100
含量(%)	101.9	98.7

*：12錠中10錠以上の個々の溶出率が規定する値であり、適合した。

包装形態：ポリエチレン瓶に入れた製品(乾燥剤入り)

試験条件：25℃、60%RH、1 ロット(n=1)

試験項目	開始時	6年
性状	白色のフィルムコーティング錠	同左
溶出率(%)	71~100*	64~101*
含量(%)	101.9	97.1

*：12錠中10錠以上の個々の溶出率が規定する値であり、適合した。

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」⁴⁾

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：25℃、60%RH、2 ロット(n=1)

試験項目	開始時	5年6箇月
性状	白色~微黄白色のフィルムコーティング錠	同左
溶出率(%)	81~99	86~99
含量(%)	99.5~102.2	100.3~101.8

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：25℃、60%RH、1ロット(n=1)

試験項目	開始時	6年
性状	白色～微黄白色の フィルムコーティング錠	同左
溶出率(%)	92～100	100～101
含量(%)	102.1	98.7

包装形態：ポリエチレン瓶に入れた製品(乾燥剤入り)

試験条件：25℃、60%RH、1ロット(n=1)

試験項目	開始時	5年6箇月
性状	白色～微黄白色の フィルムコーティング錠	同左
溶出率(%)	98～103	99～102
含量(%)	102.0	98.0

最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、相対湿度 60%、5年6箇月及び6年)の結果、イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」及びイフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」は通常の市場流通下においてそれぞれ5年間安定であることが確認された。

(3) 無包装状態における安定性

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」⁵⁾

試験項目	外観	含量	硬度	溶出性
温度 (40℃、3 箇月)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 (25℃、75%RH、3 箇月)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
光 (60 万 lx・hr)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

注) 評価は「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成 11 年 8 月 20 日」の評価基準による。

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」⁶⁾

試験項目	外観	含量	硬度	溶出性
温度 (40℃、3 箇月)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
湿度 (25℃、75%RH、3 箇月)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし
光 (60 万 lx・hr)	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

注) 評価は「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成 11 年 8 月 20 日」の評価基準による。

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化(物理化学的变化)

該当しない

7. 溶出性

(1) 規格及び試験方法 ⁷⁾⁸⁾

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」及びイフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」は、日本薬局方医薬品規格第3部に定められたイフェンプロジル酒石酸塩錠の溶出規格にそれぞれ適合していることが確認されている。

方 法：日局溶出試験法(パドル法)

試験液：水 900mL

回転数：75rpm

測定法：液体クロマトグラフィー

規 格：

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」；30分間の溶出率が80%以上のときは適合とする。

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」；90分間の溶出率が75%以上のときは適合とする。

〔出典：日本薬局方外医薬品規格第3部〕





(2) 品質再評価

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」⁹⁾

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」の溶出試験

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」につき、標準製剤を用いて、品質再評価(第25次)で指定された下記4種の試験液を用いて溶出試験を行った。

名称	販売名	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」		
	有効成分名	イフェンプロジル酒石酸塩		
剤形		錠剤	含量	10mg
溶出試験条件	回転数	50rpm		
	界面活性剤	なし		
	試験液	① pH1.2 : 日本薬局方崩壊試験の第1液 ② pH4.0 : 酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液(0.05mol/L) ③ pH6.8 : 日本薬局方試薬・試液のリン酸塩緩衝液(1→2) ④ 水 : 日本薬局方精製水		




後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い、自社製剤と標準製剤の4種の試験液における溶出挙動の同等性を判定した結果、自社製剤と標準製剤は同等であると判定された。

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」¹⁰⁾


イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」の溶出試験

イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」につき、標準製剤を用いて、品質再評価(第25次)で指定された下記4種の試験液を用いて溶出試験を行った。


名称	販売名	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」		
	有効成分名	イフェンプロジル酒石酸塩		
剤形	錠剤	含量	20mg	
溶出試験条件	回転数	50rpm		
	界面活性剤	なし		
	試験液	① pH1.2 : 日本薬局方崩壊試験の第1液 ② pH4.0 : 酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液(0.05mol/L) ③ pH6.8 : 日本薬局方試薬・試液のリン酸塩緩衝液(1→2) ④ 水 : 日本薬局方精製水		




pH1.2	0分	5分	10分	15分	30分	45分	60分
自社製剤	0	16.6	27.5	38.1	82.1	100.7	100.9
標準製剤	0	5.6	15.3	26.3	85.8	97.0	99.3



pH4.0	0分	5分	10分	15分	30分	45分	60分	90分	120分
自社製剤	0	12.9	20.8	28.0	47.5	63.9	79.6	99.9	101.9
標準製剤	0	4.8	12.3	21.1	45.0	66.3	84.0	94.3	100.7



pH6.8	0分	5分	10分	15分	30分	45分	60分	90分	120分
自社製剤	0	11.5	19.2	26.4	46.9	66.8	83.1	97.1	96.7
標準製剤	0	4.6	12.3	23.7	51.4	78.0	85.5	84.6	83.5



水	0分	5分	10分	15分	30分	45分	60分	90分	120分
自社製剤	0	11.7	19.4	26.4	46.3	64.9	81.2	100.7	101.4
標準製剤	0	4.7	11.7	17.7	36.0	53.3	72.5	91.2	91.5

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い、自社製剤と標準製剤の4種の試験液における溶出挙動の同等性を判定した結果、自社製剤と標準製剤は同等であると判定された。

8. 生物学的試験法

該当しない

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

日局「イフェンプロジル酒石酸塩錠」の確認試験による

10. 製剤中の有効成分の定量法

日局「イフェンプロジル酒石酸塩錠」の定量法による

11. 力価

該当しない

12. 混入する可能性のある夾雑物

Benzylpiperidine, 4'-benzyloxy-2-(4-benzylpiperidino)propiofenone

13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

該当しない

14. その他

該当しない

V. 治療に関する項目

1. 効能・効果

脳梗塞後遺症、脳出血後遺症に伴うめまいの改善

2. 用法・用量

・イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トーワ」

通常成人には、1回2錠（イフェンプロジル酒石酸塩として 20 mg）を1日3回毎食後経口投与する。

・イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」

通常成人には、1回1錠（イフェンプロジル酒石酸塩として 20 mg）を1日3回毎食後経口投与する。

【用法・用量に関連する使用上の注意】

本剤の投与期間は、臨床効果及び副作用の程度を考慮しながら慎重に決定するが、投与 12 週で効果が認められない場合には投与を中止すること。

3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床効果

該当資料なし

(3) 臨床薬理試験

該当資料なし

(4) 探索的試験

該当資料なし

(5) 検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

該当資料なし

3) 安全性試験

該当資料なし

4) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当しない

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

ピペリジノアルカノール誘導体

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序

血管平滑筋弛緩作用と α_1 受容体遮断による脳血管拡張作用や血小板凝集抑制作用により奏功すると考えられている。また、ミトコンドリアの呼吸賦活作用などによる脳代謝改善作用も示唆されている。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間


(3) 臨床試験で確認された血中濃度の項を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度

生物学的同等性試験

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トーワ」¹¹⁾

イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トーワ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ2錠(イフェンプロジル酒石酸塩として 20 mg)健康成人男子(n=10)に絶食単回経口投与して血清中イフェンプロジル酒石酸塩(未変化体及び抱合体)濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された(昭和55年5月30日 薬審第718号に基づく)。



薬物動態パラメータ


	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₇ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」 (錠剤、20mg)	239.1±34.2	98.2±10.8	1.2±0.3	1.7±0.5
標準製剤 (錠剤、20mg)	234.5±40.9	91.3±10.3	1.4±0.2	1.6±0.3

(Mean±S.D., n=10)

血清中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」¹²⁾

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg 「トーワ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(イフェンプロジル酒石酸塩として 20 mg)健康成人男子(n=14)に絶食単回経口投与して血漿中イフェンプロジル酒石酸塩(未変化体及び抱合体)濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された(昭和55年5月30日 薬審第718号に基づく)。



薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₇ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 (錠剤、20mg)	72.45 ± 22.61	24.81 ± 8.24	1.86 ± 0.57	1.36 ± 0.29
標準製剤 (錠剤、20mg)	69.22 ± 20.77	25.22 ± 9.43	1.75 ± 0.61	1.35 ± 0.24

(Mean ± S.D., n=14)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒域

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響

該当資料なし

(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4) 消失速度定数

該当資料なし

(5) クリアランス

該当資料なし

(6) 分布容積

該当資料なし

(7) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

3. 吸 収

該当資料なし

4. 分 布

(1) 血液－脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液－胎盤関門通過性

該当資料なし

(3) 乳汁への移行性

該当資料なし

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

5. 代 謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

(2) 代謝に関与する酵素(CYP450 等)の分子種

該当資料なし

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6. 排 泄

(1) 排泄部位及び経路

該当資料なし

(2) 排泄率

該当資料なし

(3) 排泄速度

該当資料なし

7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

8. 透析等による除去率

該当資料なし

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当しない

2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

頭蓋内出血発作後、止血が完成していないと考えられる患者

3. 効能・効果に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

4. 用法・用量に関連する使用上の注意とその理由

【用法・用量に関連する使用上の注意】

本剤の投与期間は、臨床効果及び副作用の程度を考慮しながら慎重に決定するが、投与 12 週で効果が認められない場合には投与を中止すること。

5. 慎重投与内容とその理由

慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1) 脳梗塞発作直後の患者 [脳内盗血現象を起こすおそれがある。]
- 2) 低血圧のある患者 [血圧低下を増強するおそれがある。]
- 3) 心悸亢進のある患者 [心機能を亢進させるおそれがある。]

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

該当しない

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
出血傾向をきたすと考えられる薬剤	出血傾向が増強されるおそれがある。	本剤の血小板粘着能・凝集能抑制作用による。
ドロキシドパ	ドロキシドパの作用を減弱する可能性がある。	本剤の α_1 受容体遮断作用による。

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と初期症状

該当しない

(3) その他の副作用

	頻度不明
消化器	口渇、悪心・嘔吐、食欲不振、胸やけ、下痢、便秘、口内炎、腹痛
精神神経系	頭痛、めまい、不眠、ねむけ
過敏症	発疹、皮膚そう痒感
循環器	動悸、立ちくらみ、頻脈、顔面潮紅、のぼせ感
肝臓	AST (GOT) ・ ALT (GPT) 上昇
血液	貧血
その他	顔面浮腫、上・下肢のしびれ感

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

該当しない

9. 高齢者への投与

高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、減量するなど注意すること。

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

11. 小児等への投与

該当しない

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当しない

13. 過量投与

該当しない

14. 適用上の注意

適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

15. その他の注意

該当しない

16. その他

該当しない

Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

該当資料なし

(2) 副次的薬理試験

該当資料なし

(3) 安全性薬理試験

該当資料なし

(4) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製剤：該当しない

有効成分：劇薬

劇薬：1個中イフェンプロジルとして20mg以下を含有する内用剤は除かれる。

2. 有効期間又は使用期限

使用期限：5年(外箱、ラベルに記載)

3. 貯法・保存条件

貯法：室温保存

4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取り扱い上の留意点について

該当資料なし

(2) 薬剤交付時の取扱いについて

患者向け医薬品ガイド：無

くすりのしおり：有

その他の患者向け資材：有

VIII. 14. 適用上の注意の項を参照

(3) 調剤時の留意点について

該当資料なし

5. 承認条件等

該当しない

6. 包装

製品名	包装形態	内容量(重量、容量又は個数等)
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」	PTP包装	100錠、1000錠
	バラ包装	1000錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	PTP包装	100錠、1000錠
	バラ包装	1000錠

7. 容器の材質

製品名	包装形態	材質
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」	PTP 包装	PTP : ポリ塩化ビニル、アルミ箔
	バラ包装	瓶、蓋(乾燥剤入り) : ポリエチレン
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」	PTP 包装	PTP : ポリ塩化ビニル、アルミ箔
	バラ包装	瓶、蓋(乾燥剤入り) : ポリエチレン

8. 同一成分・同効薬

同一成分 : セロクラール錠 10mg、セロクラール錠 20mg、セロクラール細粒 4%

同効薬 : ニセルゴリン、イブジラスト

9. 国際誕生年月日

1978 年 5 月 1 日

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製品名	製造販売承認年月日	承認番号	備考
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」	1984 年 2 月 7 日	(59AM)160	
	2004 年 2 月 24 日	21600AMZ00289000	販売名変更による
	2013 年 7 月 16 日	22500AMX01084000	販売名変更による
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」	1990 年 1 月 18 日	(02AM)0032	
	2004 年 2 月 24 日	21600AMZ00290000	販売名変更による
	2013 年 7 月 16 日	22500AMX01085000	販売名変更による

11. 薬価基準収載年月日

製品名	薬価基準収載年月日	備考
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg 「トーワ」	1984 年 6 月 2 日	
	2004 年 7 月 9 日	販売名変更による
	2013 年 12 月 13 日	販売名変更による
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」	1990 年 7 月 13 日	
	2004 年 7 月 9 日	販売名変更による
	2013 年 12 月 13 日	販売名変更による

12. 効能・効果追加、用法・用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

再審査結果：該当しない

薬効再評価結果公示年月日：1999年9月14日

薬効再評価結果：薬事法第14条第2項各号(承認拒否事由)のいずれにも該当しないとの結果を得た。

品質再評価結果公示年月日：2008年3月21日

品質再評価結果内容：7頁 IV. 2. 製剤の組成の項に示す処方に変更を行うことにより、公的溶出試験に適合することが確認され、薬事法第14条第2項各号(承認拒否事由)のいずれにも該当しないとの結果を得た。

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は、投薬(あるいは投与)期間に関する制限は定められていない。

ただし、V. 2. 用法・用量の項に注意喚起の記載がある。

16. 各種コード

製品名	HOT 番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト電算コード
イフェンプロジル酒石酸 塩錠 10mg 「トーワ」	103517903	2190005F1012 (統一名)	622729000 (統一名)
		2190005F1306 (個別)	620351703 (個別)
イフェンプロジル酒石酸 塩錠 20mg 「トーワ」	103524706	2190005F2019 (統一名)	622729100 (統一名)
		2190005F2205 (個別)	620352406 (個別)

17. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

X I . 文 献

1. 引用文献

- 1) 東和薬品株式会社 社内資料：加速試験(錠 10mg)
- 2) 東和薬品株式会社 社内資料：加速試験(錠 20mg)
- 3) 東和薬品株式会社 社内資料：長期保存試験(錠 10mg)
- 4) 東和薬品株式会社 社内資料：長期保存試験(錠 20mg)
- 5) 東和薬品株式会社 社内資料：無包装状態における安定性試験(錠 10mg)
- 6) 東和薬品株式会社 社内資料：無包装状態における安定性試験(錠 20mg)
- 7) 東和薬品株式会社 社内資料：品質再評価；溶出試験(錠 10mg)
- 8) 東和薬品株式会社 社内資料：品質再評価；溶出試験(錠 20mg)
- 9) 東和薬品株式会社 社内資料：品質再評価；溶出試験(錠 10mg)
- 10) 東和薬品株式会社 社内資料：品質再評価；溶出試験(錠 20mg)
- 11) 東和薬品株式会社社内資料：生物学的同等性試験；血清中イフェンプロジル酒石酸塩
〔未変化体及び抱合体〕濃度(錠 10mg)
- 12) 東和薬品株式会社社内資料：生物学的同等性試験；血漿中イフェンプロジル酒石酸塩
〔未変化体及び抱合体〕濃度(錠 20mg)

2. その他の参考文献

該当資料なし

X II . 参 考 資 料

1. 主な外国での発売状況

該当資料なし

2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

ⅩⅢ. 備 考

その他の関連資料

東和薬品株式会社 製品情報ホームページ

<https://med.towayakuhin.co.jp/medical/product/index.php>



製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号