日本標準商品分類番号:87216

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

片頭痛治療薬/5 - HT_{1B/1D} 受容体作動薬 ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」 Zolmitriptan OD

剤 形	素錠			
製剤の規制区分	劇薬,処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)			
規格・含量	1 錠中ゾルミトリプタン 2.5mg を含有する			
一 般 名	和名:ゾルミトリプタン 洋名:Zolmitriptan			
製 造 販 売 承 認 年 月 日 薬価基準収載·発売年月日	承認年月日 : 2015 年 2 月 16 日 薬価基準収載: 2015 年 6 月 19 日 発売年月日 : 2015 年 6 月 19 日			
開発·製造販売(輸入)· 提携・・売会社名	製造販売元:日医工株式会社			
医薬情報担当者の連絡先				
問い合わせ窓口	日医工株式会社 お客様サポートセンター TEL: 0120-517-215 FAX: 076-442-8948 医療関係者向けホームページ https://www.nichiiko.co.jp/			

本 I F は 2 0 1 9 年 6 月 改訂 (第 2 版) の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、医薬品医療機器総合機構ホームページ https://www.pmda.go.jp/にてご確認下さい。

IF利用の手引きの概要 —日本病院薬剤師会—

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書(以下,添付文書と略す)がある。 医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際に は、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会(以下,日病薬と略す)学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」(以下,IFと略す)の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後,医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて,平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会においてIF記載要領2008が策定された。

IF記載要領2008では、IFを紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF等の電磁的データとして提供すること(e·IF)が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版のe·IFが提供されることとなった。

最新版のe-IFは、(独)医薬品医療機器総合機構のホームページ(https://www.pmda.go.jp/)から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IFを掲載する医薬品情報提供ホームページが公式サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせてe-IFの情報を検討する組織を設置して、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF記載要領の一部改訂を行いIF記載要領2013として公表する運びとなった。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師 自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から 提供されたIFは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという 認識を持つことを前提としている。

[IFの様式]

- ①規格はA4版,横書きとし、原則として9ポイント以上の字体(図表は除く)で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

[IFの作成]

- ①IFは原則として製剤の投与経路別(内用剤、注射剤、外用剤)に作成される。
- ②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとのIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療 従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領2013」(以下、「IF記載要領2013」と略す)により作成されたIFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体(PDF)から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IFの発行]

- ①「IF記載要領2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については、「IF記載要領2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂,再審査結果又は再評価結果(臨床再評価)が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。

3. IFの利用にあたって

「IF記載要領2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。

また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該 医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービ ス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医 療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」 に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013年4月改訂)

目 次

Ⅰ. 相	既要に関する項目1	VI.	臩	፟፟፟፟፟፟፟	12
1.	開発の経緯1		1.	薬理学的に関連ある化合物又は化合物群.	12
2.	製品の治療学的・製剤学的特性1	:	2.	薬理作用	12
Ⅱ. 4	呂称に関する項目2	VII.	薬	冬物動態に関する項目	13
1.	販売名2		1.	血中濃度の推移・測定法	13
2.	一般名2	:	2.	薬物速度論的パラメータ	15
3.	構造式又は示性式2	;	3.	吸収	15
4.	分子式及び分子量2		4 .	分布	15
5.	化学名(命名法)2	!	5.	代謝	16
6.	慣用名,別名,略号,記号番号2	(6.	排泄	16
7.	CAS 登録番号2		7.	トランスポーターに関する情報	16
Ⅲ. 1	有効成分に関する項目3	;	8.	透析等による除去率	16
1.	物理化学的性質3	WII.	萝	そ全性(使用上の注意等)に関する項目 …	17
2.	有効成分の各種条件下における安定性3		1.	警告内容とその理由	17
3.	有効成分の確認試験法3	:	2.	禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む).	17
4.	有効成分の定量法3	;	3.	効能又は効果に関連する使用上の注意とそ	: の
IV. \$	製剤に関する項目4			理由	17
1.	剤形4		4 .	用法及び用量に関連する使用上の注意とそ	: の
2.	製剤の組成4			理由	17
3.	懸濁剤,乳剤の分散性に対する注意4		5.	慎重投与内容とその理由	17
4.	製剤の各種条件下における安定性5	(6.	重要な基本的注意とその理由及び処置方法	է 18
5.	調製法及び溶解後の安定性5		7.	相互作用	18
6.	他剤との配合変化(物理化学的変化) 5	;	8.	副作用	20
7.	溶出性6	,	9.	高齢者への投与	21
8.	生物学的試験法7	1	0.	妊婦,産婦,授乳婦等への投与	21
9.	製剤中の有効成分の確認試験法7	1	1.	小児等への投与	21
10.	製剤中の有効成分の定量法7	1	2.	臨床検査結果に及ぼす影響	21
11.	力価7	1	3.	過量投与	21
12.	混入する可能性のある夾雑物7	1	4.	適用上の注意	21
13.	注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関す	1	5.	その他の注意	22
	る情報7	1	6.	その他	22
14.	その他7	IX.	非	≡臨床試験に関する項目	·· 2 3
٧. ۶	台療に関する項目8		1.	薬理試験	23
1.	効能又は効果8	:	2.	毒性試験	23
2.	用法及び用量8	X.	僧	理的事項に関する項目	24
3.	臨床成績 11		1.	規制区分	24

2.	有効期間又は使用期限24
3.	貯法・保存条件24
4.	薬剤取扱い上の注意点24
5.	承認条件等24
6.	包装24
7.	容器の材質24
8.	同一成分・同効薬24
9.	国際誕生年月日24
10.	製造販売承認年月日及び承認番号24
11.	薬価基準収載年月日24
12.	効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等
	の年月日及びその内容24
13.	再審査結果,再評価結果公表年月日及びその
	内容24
14.	再審査期間24
15.	投薬期間制限医薬品に関する情報25
16.	各種コード25
17.	保険給付上の注意25
XI.	文献26
1.	引用文献26
2.	その他の参考文献26
XΙ.	参考資料26
1.	主な外国での発売状況26
2.	海外における臨床支援情報26
XШ.	備考27
付表 1	—1 ······30
付表 1	—2 ······31
付表 1	_3 ·····32

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

本剤はゾルミトリプタンを有効成分とする片頭痛治療薬/5-HT_{IB/ID} 受容体作動薬である。

「ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」」は、日医工株式会社が後発医薬品として開発を企画し、規格及び試験方法を設定、安定性試験、生物学的同等性試験を実施し、2015 年 2 月 16 日に承認を取得、2015 年 6 月 19 日に上市した。(薬食発第 0331015 号(平成 17 年 3 月 31 日)に基づき承認申請)

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1)本剤はゾルミトリプタンを有効成分とする片頭痛治療薬/5-HT_{1B/1D}受容体作動薬である。
- (2) 香料としてオレンジフレーバーを使用している。
- (3) PTP シートはピッチコントロールを行い、1 錠ごとに成分名、含量及び「片頭痛治療薬」 を表示した。
- (4) 重大な副作用(頻度不明) として、アナフィラキシーショック、アナフィラキシー、不整脈、狭心症あるいは心筋梗塞を含む虚血性心疾患様症状、頻脈(WPW 症候群における)、薬剤の使用過多による頭痛、てんかん様発作が報告されている。

Ⅱ. 名称に関する項目

- 1. 販売名
- (1) 和名

ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」

(2) 洋名

Zolmitriptan OD

(3) 名称の由来

一般名より

- 2. 一般名
- (1)和名(命名法)

ゾルミトリプタン (JAN)

(2) 洋名(命名法)

Zolmitriptan (JAN)

(3) ステム

セロトニン(5-HT1)受容体作動薬/スマトリプタン誘導体:-triptan

3. 構造式又は示性式

$$\begin{array}{c|c} O \\ \hline \\ O \\ \hline \\ H \\ \end{array}$$

4. 分子式及び分子量

分子式: C₁₆H₂₁N₃O₂

分子量:287.36

5. 化学名(命名法)

(S)-4- $({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1}H-indol-5-yl}methyl)-2-oxazolidinone (IUPAC)$

6. 慣用名, 別名, 略号, 記号番号

特になし

7. CAS 登録番号

139264-17-8

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色の結晶性の粉末である。

(2)溶解性

本品はメタノール又は N-メチル-2-ピロリジノンに溶けやすく,エタノール (99.5) 又は 2-プロパノールにやや溶けやすく,水に極めて溶けにくい。

(3)吸湿性

該当資料なし

(4)融点(分解点),沸点,凝固点

融点:136~139℃(乾燥後)

(5)酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法

(1)紫外可視吸光度測定法

本品のメタノール溶液につき吸収スペクトルを測定するとき,波長 283~287nm に吸収の極大を示す。

(2) 赤外吸収スペクトル測定法

臭化カリウム錠剤法により試験を行い、本品のスペクトルと本品の参照スペクトル又はゾルミトリプタン標準物質のスペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

4. 有効成分の定量法

液体クロマトグラフィー

検出器:紫外吸光光度計

移動相:リン酸二水素アンモニウム,水,アンモニア,アセトニトリル混液

Ⅳ. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別, 外観及び性状

販売名	色調 剤形	質量(mg)	形 状 直径(mm)	厚さ(mm)	本体コード 包装コード
ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg 「日医工」	白色の素錠 (わずかにオレンジ 様のにおい)	<u>n</u> 221	2.5		本体: n 221 包装: n 221
		100	6.5	2.4	

(2)製剤の物性

(「IV-4. 製剤の各種条件下における安定性」の項参照)

(3) 識別コード

(「IV-1.(1)剤形の区別,外観及び性状」の項参照)

(4) pH, 浸透圧比, 粘度, 比重, 無菌の旨及び安定な pH 域等 該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分(活性成分)の含量

ゾルミトリプタン OD 錠 2.5 mg「日医工」: 1錠中ゾルミトリプタン 2.5 mg を含有

(2)添加物

結晶セルロース, D - マンニトール, 軽質無水ケイ酸, 合成ケイ酸アルミニウム, ヒドロキシプロピルスターチ, クロスポビドン, ヒドロキシプロピルセルロース, アスパルテーム (L-フェニルアラニン化合物), ステアリン酸マグネシウム, 香料, 抽出トコフェロール

(3) その他

該当記載事項なし

3. 懸濁剤, 乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性1)

本品につき加速試験(40°C、相対湿度 75%、6 ヵ月)を行った結果、ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

◇ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」 加速試験 [最終包装形態 (PTP 包装)]

測定項目	則定項目 ロット		保存期間			
<規格>	番号	開始時	1ヵ月	3ヵ月	6 カ月	
性状 <わずかにオレンジ様のにおいの ある白色の素錠>	ZD01 ZD02 ZD03	適合	同左	同左	同左	
確認試験 (紫外可視吸光度測定法)	ZD01 ZD02 ZD03	適合	_	_	適合	
純度試験(HPLC) < ※ 1>	ZD01 ZD02 ZD03	適合	同左	同左	同左	
製剤均一性試験(含量均一性) <15.0%以下>	ZD01 ZD02 ZD03	$1.3 \sim 1.9$ $1.1 \sim 1.7$ $1.5 \sim 1.9$		_	$1.6\sim2.3$ $2.0\sim3.4$ $1.2\sim1.9$	
崩壊試験(秒) <60 秒以内>	ZD01 ZD02 ZD03	$12 \sim 16$ $12 \sim 15$ $11 \sim 16$	_	_	10~13 10~14 10~15	
溶出性(%) <15 分,85%以上>	ZD01 ZD02 ZD03	$93.2 \sim 100.9$ $95.3 \sim 99.1$ $95.7 \sim 101.0$	$95.4 \sim 103.0$ $96.0 \sim 102.1$ $96.9 \sim 101.8$	$91.9 \sim 99.5$ $92.0 \sim 99.0$ $92.6 \sim 98.0$	$95.2 \sim 102.2$ $93.5 \sim 99.7$ $95.2 \sim 100.6$	
含量 (%) ^{**2} <95.0~105.0%>	ZD01 ZD02 ZD03	$100.7 \sim 101.0$ $100.6 \sim 101.6$ $101.5 \sim 102.4$	$99.4 \sim 101.2$ $99.6 \sim 101.4$ $100.0 \sim 101.7$	$99.5 \sim 101.5$ $100.2 \sim 100.5$ $101.3 \sim 102.2$	$98.6 \sim 100.2$ $98.5 \sim 99.5$ $98.8 \sim 99.6$	

※1:RRT 約 0.4 の類縁物質: 0.6%以下,左記以外の個々の類縁物質: 0.2%以下,総類縁物質: 1.0%以下

※2:表示量に対する含有率 (%)

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)

該当しない

7. 溶出性2)

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について (平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発第 0229 第 10 号)

試験条件

装置:日本薬局方 溶出試験法 パドル法


回転数及び試験液:50rpm (pH1.2, pH5.0, pH6.8, 水)

「判定]

- ・pH1.2 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
- ・pH5.0 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
- ・pH6.8 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
- ・水(50rpm)では、標準製剤及び本品はともに15分以内に平均85%以上溶出した。
- ・50rpm の全ての試験液において 30 分以内に標準製剤,本品ともに 85%以上溶出したことより,100rpm での溶出試験は省略した。

以上,本品の溶出挙動を標準製剤と比較した結果,全ての溶出試験液において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

(溶出曲線)



(n=12)

8. 生物学的試験法

該当資料なし

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

紫外可視吸光度測定法

本品を粉末としメタノールを加えてよく振り混ぜて遠心分離する。上澄液の吸収スペクトルを測定するとき、波長 283~287 nm に吸収の極大を示す。

10. 製剤中の有効成分の定量法

液体クロマトグラフィー

検出器:紫外吸光光度計

移動相:リン酸二水素アンモニウム,水、アンモニア、アセトニトリル混液

11. 力価

該当しない

12. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

該当しない

14. その他

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

片頭痛

<効能・効果に関連する使用上の注意>

- (1)本剤は、国際頭痛学会による片頭痛診断基準(「参考」の項参照)により、「前兆のない片頭痛」あるいは「前兆のある片頭痛」と診断が確定された場合にのみ使用すること。特に次のような患者は、クモ膜下出血等の脳血管障害や他の原因による頭痛の可能性があるので、本剤投与前に問診、診察、検査を十分に行い、頭痛の原因を確認してから投与すること。
 - 1) 今までに片頭痛と診断が確定したことのない患者
 - 2) 片頭痛と診断されたことはあるが、片頭痛に通常みられる症状や経過とは異なった頭痛及び随伴症状のある患者
- (2) 家族性片麻痺性片頭痛,孤発性片麻痺性片頭痛,脳底型片頭痛あるいは眼筋麻痺性片頭痛の患者には投与しないこと。

2. 用法及び用量

通常,成人にはゾルミトリプタンとして1回2.5mgを片頭痛の頭痛発現時に経口投与する。なお,効果が不十分な場合には,追加投与をすることができるが,前回の投与から2時間以上あけること。

また, 2.5mg の経口投与で効果が不十分であった場合には, 次回片頭痛発現時から 5mg を経口投与することができる。

ただし、1日の総投与量を10mg以内とすること。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

- (1) 本剤は片頭痛の頭痛発現時に限り使用し、予防的に使用しないこと。
- (2) 本剤投与により全く効果が認められない場合は、その発作に対して追加投与をしないこと。このような場合は、再検査の上、頭痛の原因を確認すること。

【参考】

国際頭痛学会による片頭痛の分類 注

- 1.1 前兆のない片頭痛
- 1.2 前兆のある片頭痛
 - 1.2.1 典型的前兆に片頭痛を伴うもの
 - 1.2.2 典型的前兆に非片頭痛様の頭痛を伴うもの
 - 1.2.3 典型的前兆のみで頭痛を伴わないもの
 - 1.2.4 家族性片麻痺性片頭痛
 - 1.2.5 孤発性片麻痺性片頭痛
 - 1.2.6 脳底型片頭痛
- 1.3 小児周期性症候群 (片頭痛に移行することが多いもの)
 - 1.3.1 周期性嘔吐症
 - 1.3.2 腹部片頭痛
 - 1.3.3 小児良性発作性めまい
- 1.4 網膜片頭痛
- 1.5 片頭痛の合併症
 - 1.5.1 慢性片頭痛
 - 1.5.2 片頭痛発作重積
 - 1.5.3 遷延性前兆で脳梗塞を伴わないもの
 - 1.5.4 片頭痛性脳梗塞
 - 1.5.5 片頭痛により誘発される痙攣
- 1.6 片頭痛の疑い
 - 1.6.1 前兆のない片頭痛の疑い
 - 1.6.2 前兆のある片頭痛の疑い
 - 1.6.5 慢性片頭痛の疑い

国際頭痛学会による片頭痛診断基準 注)

- 1.1 前兆のない片頭痛
 - A. B~Dを満たす頭痛発作が5回以上ある
 - B. 頭痛の持続時間は4~72時間(未治療もしくは治療が無効の場合)
 - C. 頭痛は以下の特徴の少なくとも2項目を満たす
 - 1. 片側性
 - 2. 拍動性
 - 3. 中等度~重度の頭痛
 - 4. 日常的な動作(歩行や階段昇降などの)により頭痛が増悪する,あるいは頭痛のために日常的な動作を避ける
 - D. 頭痛発作中に少なくとも以下の1項目を満たす
 - 1. 悪心または嘔吐(あるいはその両方)
 - 2. 光過敏および音過敏
 - E. その他の疾患によらない

1.2 前兆のある片頭痛

- A. Bを満たす頭痛が2回以上ある
- B. 片頭痛の前兆がサブフォーム1.2.1~1.2.6のいずれかの診断基準項目BおよびCを 満たす
- 1.2.1 典型的前兆に片頭痛を伴うもの
 - A. B~Dを満たす頭痛が2回以上ある
 - B. 少なくとも以下の1項目を満たす前兆があるが、運動麻痺(脱力)は伴わない
 - 1. 陽性徴候 (例えばきらきらした光・点・線) および・または陰性徴候 (視覚消失) を含む完全可逆性の視覚症状
 - 2. 陽性徴候(チクチク感)および・または陰性徴候(感覚鈍麻)を含む完全可逆性の感覚症状
 - 3. 完全可逆性の失語性言語障害
 - C. 少なくとも以下の2項目を満たす
 - 1. 同名性の視覚症状または片側性の感覚症状(あるいはその両方)
 - 2. 少なくとも1つの前兆は5分以上かけて徐々に進展するかおよび・または 異なる複数の前兆が引き続き5分以上かけて進展する
 - 3. それぞれの前兆の持続時間は5分以上60分以内
 - D. 1.1「前兆のない片頭痛」の診断基準B~Dを満たす頭痛が、前兆の出現中も しくは前兆後60分以内に生じる
 - E. その他の疾患によらない
- 1.2.2 典型的前兆に非片頭痛様の頭痛を伴うもの

下記を除き1.2.1と同じ

- D. 1.1「前兆のない片頭痛」の $B\sim D$ を満たさない頭痛が、前兆の出現中もしくは前兆後60分以内に生じる
- C. その他の疾患によらない
- 1.2.3~1.2.6の診断基準については省略した
- 注) 国際頭痛分類 第2版 (ICHD-Ⅱ): 日本頭痛学会 (新国際分類普及委員会)・厚生労働 科学研究 (慢性頭痛の診療ガイドラインに関する研究班) 共訳より抜粋

3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床効果

該当資料なし

(3) 臨床薬理試験

該当資料なし

(4) 探索的試験

該当資料なし

- (5) 検証的試験
 - 1)無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

該当資料なし

3)安全性試験

該当資料なし

4) 患者・病態別試験

該当資料なし

- (6)治療的使用
 - 1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験) 該当資料なし
 - 2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要 該当しない

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群

トリプタン化合物

2. 薬理作用

(1)作用部位・作用機序3)

5-HT が片頭痛の病態発生の主要なメディエーターであると考えられている。

ゾルミトリプタンなどの 5-HT₁ 受容体作動薬は, 5-HT_{1B}及び 5-HT_{1D} 受容体と高い親和性を示し、他の 5-HT₁ 受容体サブタイプには親和性が低い。

作用機序として, 5-HT_{1B/1D} 受容体を介した脳血管収縮作用及び炎症誘発性神経ペプチドの 遊離抑制作用が考えられている。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

(3)作用発現時間・持続時間

該当資料なし

Ⅷ. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1)治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間


(「臨床試験で確認された血中濃度」の項参照)

(3) 臨床試験で確認された血中濃度4)

<ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」: 水なし服用>

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について (平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発第 0229 第 10 号)

ゾルミトリプタン OD 錠 2.5 mg「日医工」及び標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠(ゾルミトリプタンとして 2.5 mg),健康成人男性に絶食単回経口投与(水なし服用)して血漿中ゾルミトリプタン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、C max)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $log(0.80) \sim log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。



「薬物速度論的パラメータ:水なし」

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUCt (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t1/2 (hr)
ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg 「日医工」	23.4±8.25	3.60±1.42	3.2±1.6	3.25±1.06
標準製剤 (口腔内速溶錠,2.5mg)	24.7±9.57	3.83±1.65	3.0±1.4	3.15±0.907


(1 錠投与, Mean±S.D., n=20)

血漿中濃度並びに AUC, Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

<ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」: 水あり服用>

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について (平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発第 0229 第 10 号)

ゾルミトリプタン OD 錠 2.5 mg「日医工」及び標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠(ゾルミトリプタンとして 2.5 mg),健康成人男性に絶食単回経口投与(水あり服用)して血漿中ゾルミトリプタン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $log(0.80) \sim log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。



「薬物速度論的パラメータ:水あり]

	判定パラ	ラメータ	参考パラ	ラメータ
	AUCt (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t1/2 (hr)
ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」	22.6±7.58	3.93±1.21	1.5±1.1	2.89±0.901
標準製剤 (口腔内速溶錠, 2.5mg)	20.7±5.82	3.53±0.929	1.8±1.2	2.90±0.859

(1 錠投与, Mean±S.D., n=40)

血漿中濃度並びに AUC, Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒域

該当資料なし

(5)食事・併用薬の影響

(「WII-7. 相互作用」の項参照)

- (6) 母集団 (ポピュレーション) 解析により判明した薬物体内動態変動要因 該当資料なし
- 2. 薬物速度論的パラメータ
- (1)解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4)消失速度定数

該当資料なし

(5) クリアランス

該当資料なし

(6)分布容積

該当資料なし

(7) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

3. 吸収

該当資料なし

- 4. 分布
- (1) 血液-脳関門通過性

該当資料なし

(2)血液-胎盤関門通過性

(「Ⅶ - 10. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与」の項参照)

(3) 乳汁への移行性

(「Ⅷ-10. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与」の項参照)

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

5. 代謝

(1)代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450等) の分子種

本剤は、主として肝代謝酵素 CYP1A2 により活性代謝物に代謝され、A 型モノアミン酸化酵素 (MAO) により不活性代謝物に代謝される。

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4)代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

- 6. 排泄
- (1) 排泄部位及び経路

該当資料なし

(2)排泄率

該当資料なし

(3) 排泄速度

該当資料なし

7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

8. 透析等による除去率

該当資料なし

Ⅲ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当記載事項なし

2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

- (1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2) 心筋梗塞の既往歴のある患者,虚血性心疾患又はその症状・兆候のある患者,異型狭心症(冠動脈攣縮)のある患者[不整脈,狭心症,心筋梗塞を含む重篤な虚血性心疾患様症状があらわれることがある。]
- (3) 脳血管障害や一過性脳虚血性発作の既往のある患者 [脳血管障害や一過性脳虚血性発作があらわれることがある。]
- (4) 末梢血管障害を有する患者 [症状を悪化させる可能性が考えられる。]
- (5) コントロールされていない高血圧症の患者「一過性の血圧上昇を引きおこすことがある。]
- (6) エルゴタミン, エルゴタミン誘導体含有製剤, あるいは他の 5-HT_{1B/1D} 受容体作動薬を 投与中の患者(「相互作用」の項参照)
- (7) モノアミン酸化酵素阻害剤(MAO阻害剤)を投与中,あるいは投与中止2週間以内の 患者(「相互作用」の項参照)

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

(「V. 治療に関する項目」を参照)

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

(「V. 治療に関する項目」を参照)

5. 慎重投与内容とその理由

【慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)】

- (1) 虚血性心疾患の可能性のある患者(例えば,虚血性心疾患を疑わせる重篤な不整脈のある患者,閉経後の女性,40歳以上の男性,冠動脈疾患の危険因子を有する患者)[不整脈,狭心症,心筋梗塞を含む重篤な虚血性心疾患様症状があらわれるおそれがある。]
- (2) ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群(WPW 症候群)又は他の心臓副伝導路と関連した不整脈のある患者(「副作用」の項参照)
- (3) 中等度又は重度肝機能障害患者 [血中濃度が上昇するおそれがある。特に重度肝機能障害患者では,1日の総投与量を5mg以内とするなど慎重に投与すること。]
- (4) 脳血管障害の可能性のある患者 [脳血管障害があらわれるおそれがある。]
- (5) てんかんあるいは痙攣を起こしやすい器質的脳疾患のある患者 [類薬 (スマトリプタン) でてんかん様発作が発現したとの報告がある。]
- (6) コントロールされている高血圧症患者 [類薬 (スマトリプタン) で一過性の血圧上昇や 末梢血管抵抗の上昇が少数の患者でみられたとの報告がある。]

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

- (1) 本剤投与後、胸痛、胸部圧迫感等の一過性の症状(強度で咽喉頭部に及ぶ場合がある)があらわれることがある。このような症状が虚血性心疾患によると思われる場合には、以後の投与を中止し、虚血性心疾患の有無を調べるための適切な検査を行うこと。
- (2)心血管系の疾患が認められない患者においても、重篤な心疾患が極めてまれに発生することがある。このような場合は以後の投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- (3)本剤を含むトリプタン系薬剤により、頭痛が悪化することがあるので、頭痛の改善を認めない場合には、「薬剤の使用過多による頭痛」⁵⁾の可能性を考慮し、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。
- (4) 片頭痛あるいは本剤投与により眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないよう十分注意すること。
- (5)本剤は口腔内で速やかに崩壊することから唾液のみ(水なし)でも服用可能であるが、口腔粘膜から吸収されることはないため、水なしで服用した場合は唾液で飲み込むこと。

7. 相互作用

本剤は、主として肝代謝酵素 CYP1A2 により活性代謝物に代謝され、A 型モノアミン酸化酵素 (MAO) により不活性代謝物に代謝される。

(1) 併用禁忌とその理由

併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状·措置方法	機序・危険因子
エルゴタミン エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェ イン・イソプロピルアンチピリン (クリアミン) エルゴタミン誘導体含有製剤 ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩	血圧の上昇又は血管攣縮が増強されるおそれがある。本剤投与後にエルゴタミンあるいはエルゴタミン誘導体含有製剤を投与する場合、もしくはその逆の場合は、それ	5-HT _{1B/ID} 受容体作動薬 との薬理的相加作用によ り,相互に作用(血管収縮 作用)を増強させる。
(ジヒデルゴット) エルゴメトリンマレイン酸塩 (エルゴメトリンF) メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 (メテルギン)	ぞれ24時間以内に投与しないこと。	
5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬 スマトリプタンコハク酸塩 (イミグラン) エレトリプタン臭化水素酸塩 (レルパックス) リザトリプタン安息香酸塩 (マクサルト) ナラトリプタン塩酸塩 (アマージ)	血圧の上昇又は血管攣縮が増強されるおそれがある。本剤投与後に他の5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬を投与する場合,もしくはその逆の場合は,それぞれ24時間以内に投与しないこと。	

		100 10 00 00 00
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序·危険因子
MAO 阻害剤	本剤及び活性代謝物の消失 半減期 (t1/2) が延長し, 血中 濃度 - 時間曲線下面積 (AUC) が増加するおそれが あるので, MAO 阻害剤を投 与中あるいは投与中止2週間 以内の患者には本剤を投与 しないこと。	本剤の代謝が阻害され, 本剤の作用が増強される

(2)併用注意とその理由

併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状·措置方法	機序·危険因子
CYP1A2阻害剤	本剤及び活性代謝物の消失	本剤の主要代謝酵素であ
シメチジン,	半減期 (t1/2) が延長し, 血	るCYP1A2を阻害するた
フルボキサミンマレイン酸塩,	中濃度一時間曲線下面積	め、作用が増強される可
キノロン系抗菌剤	(AUC) が増加するので、本	能性が考えられる。
(シプロフロキサシン塩酸塩水和物	剤の1日の総投与量を5mg以	
等)等	内とするなど慎重に投与す	
	ること。	
選択的セロトニン再取り込み阻害剤	セロトニン症候群(不安、焦	セロトニンの再取り込み
フルボキサミンマレイン酸塩,	燥,興奮,頻脈,発熱,反射	を阻害し、セロトニン濃
パロキセチン塩酸塩水和物等	亢進,協調運動障害,下痢等)	度を上昇させる。 5-
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込	があらわれることがある。	HT _{1B/1D} 受容体作動薬と
み阻害剤		の併用により、セロトニ
ミルナシプラン塩酸塩,		ン作用が増強する可能性
デュロキセチン塩酸塩		が考えられる。

8. 副作用

(1)副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

- **(2) 重大な副作用と初期症状**(頻度不明)
 - 1) **アナフィラキシーショック**, **アナフィラキシー**: アナフィラキシーショック, アナフィラキシーがまれにあらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。
 - 2) **不整脈,狭心症**あるいは**心筋梗塞**を含む**虚血性心疾患様症状**:不整脈,狭心症あるいは 心筋梗塞を含む虚血性心疾患様症状をおこすことがまれにあるので,観察を十分に行 い,異常が認められた場合には,投与を中止し適切な処置を行うこと。
 - 3) **頻脈(WPW 症候群における)**: WPW 症候群の典型的症状である重篤な発作性頻脈が, ゾルミトリプタンを投与した WPW 症候群の既往のある患者 1 例で認められている。
 - 4) **薬剤の使用過多による頭痛**:薬剤の使用過多による頭痛があらわれることがあるので、 異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。
 - 5) **てんかん様発作**:類薬(スマトリプタン)でてんかん様発作をおこすことがまれにあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。

(3) その他の副作用

	_		頻度不明		
過	敏	症注1)	蕁麻疹,血管浮腫等の過敏症状		
循	環	器	動悸,高血圧,頻脈,消化管の虚血又は梗塞 ^{注2)} (腸管虚血,腸管梗塞,脾梗塞等)		
消	化	器	悪心,口內乾燥,嘔吐,腹痛,下痢,嚥下困難		
精神	申神紀	E系	傾眠, めまい, 知覚減退, 知覚過敏, 異常感覚, 頭痛		
泌	尿	器	頻尿,多尿,尿意切迫		
筋・	骨格	孫	筋脱力,筋肉痛		
そ	の	他	無力症,熱感,重圧感 ^{注3)} ,絞扼感 ^{注3)} ,疼痛 ^{注3)} ,圧迫感 ^{注3)} ,けん怠感,疲労		

<u>注1</u>):このような場合には投与を中止すること。

注2):血性下痢又は腹痛を呈することがある。

注3): これらの症状は通常一過性であるが、ときに激しい場合があり、胸部、咽喉頭部を含む 身体各部でおこる可能性がある(「重要な基本的注意」の項参照)。また、痛みは頭痛、

筋肉痛, 関節痛, 背部痛, 頚部痛等を含む。

(4)項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5) 基礎疾患, 合併症, 重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

(6)薬物アレルギーに対する注意及び試験法

- 1)禁忌:本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと。
- 2) **重大な副作用**: アナフィラキシーショック, アナフィラキシーがまれにあらわれること があるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し適切な処置を 行うこと。
- 3) **その他の副作用**:過敏症(蕁麻疹,血管浮腫等の過敏症状)が発現した場合には投与を 中止すること

9. 高齢者への投与

高齢者と非高齢者の血漿中濃度は類似している。しかし、臨床使用における高齢者に対する安全性は確立していない(使用経験が少ない)。

10. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。 [妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]
- (2) 授乳中の婦人には本剤投与中は、授乳を避けさせること。 [動物実験(ラット)で経口投与後に乳汁中への移行が認められている。]

11. 小児等への投与

低出生体重児,新生児,乳児,幼児又は小児に対する安全性は確立していない(12歳未満の小児等においては使用経験がなく,12歳以上の小児においては使用経験が少ない)。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当記載事項なし

13. 過量投与

外国で、健康人にゾルミトリプタン 50mg を単回経口投与した際、鎮静(傾眠・無力症)が認められた。

処置:本剤の消失半減期は約3時間であり、少なくとも15時間、あるいは症状・徴候が持続する限り患者をモニターすること。本剤に特異的な解毒薬はないので、重症中毒の場合、気道の確保・維持、適度の酸素負荷・換気、循環器系のモニタリング・対症療法を含む集中治療が望ましい。なお、血液透析・腹膜透析の効果は不明である。

14. 適用上の注意

薬剤交付時

- (1) PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。 (PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)
- (2) 本剤は吸湿性を有するため、使用直前に PTP シートから取り出すこと。

15. その他の注意

該当記載事項なし

16. その他

【取扱い上の注意】

本剤は、口腔内崩壊錠のため自動分包機を使用する場合は欠けることがあるので、カセットの位置及び錠剤投入量などに配慮すること。

IX. 非臨床試験に関する項目

- 1. 薬理試験
- (1) 薬効薬理試験(「VI. 薬効薬理に関する項目」参照)
- (2) 副次的薬理試験

該当資料なし

(3)安全性薬理試験

該当資料なし

(4) その他の薬理試験

該当資料なし

- 2. 毒性試験
- (1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製剤	ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」	劇薬, 処方箋医薬品 (注意 - 医師等の処方 箋により使用すること)
有効成分	ゾルミトリプタン	劇薬

2. 有効期間又は使用期限

外箱等に表示の使用期限内に使用すること。 (3年:安定性試験結果に基づく)

3. 貯法・保存条件

気密容器で室温保存

- 4. 薬剤取扱い上の注意点
- (1)薬局での取り扱い上の留意点について

(「規制区分」, 「貯法・保存条件」の項参照)

(2)薬剤交付時の取扱いについて(患者等に留意すべき必須事項等)

くすりのしおり:有

(「Ⅶ-14. 適用上の注意」の項参照)

(3)調剤時の留意点について

(「WII-16. その他」の項参照)

5. 承認条件等

該当しない

6. 包装

PTP: 12 錠 (6 錠×2; PTP)

7. 容器の材質

PTP: ポリ塩化ビニルフィルム,アルミニウム箔

8. 同一成分・同効薬

同一成分: ゾーミッグ RM 錠 2.5mg

9. 国際誕生年月日

不明

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製造承認年月日:2015年2月16日 承認番号:22700AMX00537000

11. 薬価基準収載年月日

2015年6月19日

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

13. 再審査結果, 再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は、投薬期間に関する制限は定められていない。

16. 各種コード

販売名	薬価基準収載	レセプト	HOT(9 桁)
	医薬品コード	電算コード	コード
ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」	2160004F2074	622436401	124364201

17. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

XI. 文献

1. 引用文献

- 1) 日医工株式会社 社内資料 (安定性試験)
- 2) 日医工株式会社 社内資料(溶出試験)
- 3) グッドマン・ギルマン 薬理書・第12版 -薬物治療の基礎と臨床-[上巻], 430 (2013)
- 4) 日医工株式会社 社内資料(生物学的同等性試験)
- 5) International Headache Society 2018 : Cephalalgia. 2018 ; 38 : 1-211

2. その他の参考文献

なし

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

なし

2. 海外における臨床支援情報

なし

XII. 備考

1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

本項の情報に関する注意

本項には承認を受けていない品質に関する情報が含まれる。

試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。

医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、加工等の可否を示すものではない。

(1) 粉砕

粉砕物の安定性試験

ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」

粉砕物の安定性を 30°C・75%RH, 60 万 Lx・hr 及び室内散光下の保存条件で検討した結果, 30°C・75%RH 及び室内散光下の保存条件において、性状は開始時白色の粉末であり、2 週後 わずかに黄色味を帯びた粉末であり、純度及び含量は規格内であった。60 万 Lx・hr の保存条件において、30 万 Lx・hr 照射後わずかに黄色味を帯びた粉末であり、純度及び含量は規格内であった。

検体作成:試験製剤を乳鉢で粉砕した。 試験実施期間:2014/11/20~2014/12/24

● 粉砕物 30°C・75%RH [遮光・開放]

(最小值~最大值)

試験項目	ロット	保存期間		
<規格>	番号	開始時	2 週	1ヵ月
性状	40011	白色の粉末	わずかに黄色味を	わずかに黄色味を
1生4人	40011	日色の初木	帯びた	帯びた
純度試験(HPLC)	40011	適合	適合	適合
<%1> n=1	40011	週白	週台	週白
含量 (%) **2 n=3	40011	$96.8{\sim}98.5$	96.1~97.1	$96.6 \sim 97.7$
<95.0~105.0%>	40011	30.0 30.0	30.1 - 37.1	30.0 - 31.1
(参考値)乾燥減量(%)	40011	2.4	3.6	3.9

%1: ①RRT0.4 物質;0.6%以下,②個々の類縁物質;0.2%以下,③総類縁物質;1.0%以下

※2:表示量に対する含有率(%)

● 粉砕物 成り行き温湿度(18~27℃・12~46%RH)・60 万 Lx·hr

[光源(D65光源(1000Lx))・開放]

(最小值~最大值)

試験項目	ロット	総曝光量		
<規格>	番号	開始時	30万 Lx·hr	60 万 Lx·hr
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	40011	力 4 の似土	わずかに黄色味を	わずかに黄色味を
性状	40011	白色の粉末	帯びた	帯びた
純度試験(HPLC)	40011	適合	適合	適合
<%1> n=1	40011	週台	週句	週白
含量 (%) ^{※2} n=3	40011	96.8~98.5	98.6~98.8	99.2~99.8
<95.0~105.0%>	40011	90.0~90.0	90.0 90.0	99.2/~99.6
(参考値)乾燥減量(%)	40011	2.4	2.5	2.2

%1: ①RRT0.4 物質; 0.6%以下,②個々の類縁物質; 0.2%以下,③総類縁物質; 1.0%以下

※2:表示量に対する含有率(%)

● 粉砕物 成り行き温湿度(18~22℃・27~54%RH)・曝光[室内散光・開放]

(最小值~最大值)

試験項目	ロット	保存期間		
<規格>	番号	開始時	2 週	1ヵ月
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	40011	卢	わずかに黄色味を	わずかに黄色味を
性状	40011	白色の粉末	帯びた	帯びた
純度試験(HPLC)	40011	適合	適合	適合
<%1> n=1	40011	順口		
含量 (%) **2 n=3	40011	00.000 5	00.7-00.0	00 7 - 100 9
<95.0~105.0%>	40011	$96.8 \sim 98.5$	$98.7 \sim 99.3$	$98.7 \sim 100.3$
(参考値)乾燥減量(%)	40011	2.4	2.4	2.1

%1: ①RRT0.4 物質; 0.6%以下,②個々の類縁物質; 0.2%以下,③総類縁物質; 1.0%以下

※2:表示量に対する含有率(%)

(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」

1) 試験方法

「崩壊懸濁試験〕

ディスペンサーのピストン部を抜き取り、検体1個をディスペンサー内に入れてピストンを戻し、約55℃の温湯20mLを吸い取った。ディスペンサーに蓋をして5分間放置後、ディスペンサーを手で15往復横転し、崩壊懸濁の状況を観察した。充分な崩壊が認められない場合は、更に5分間放置後、同様の操作を行い、崩壊懸濁の状況を観察した。

上記の操作で充分な崩壊懸濁が認められない場合は、検体1個を分包し、上から乳棒で数回軽く叩いて検体を破壊し、同様の操作を行い、崩壊懸濁の状況を観察した。

「通過性試験]

懸濁液の入ったディスペンサーを経管チューブに接続し、約 $2\sim3$ mL/秒の速度で注入した。チューブは体内挿入端から約 3分の 2 を水平にし、注入端をその約 30cm 上の高さに固定した。懸濁液を注入後に適量の常水を注入してチューブ内を濯ぐとき、チューブ内に残存物が認められなければ通過性に問題なしとした。8Fr.のチューブを通過した場合、18Fr.ガストロボタンフィーディングチューブに注入し、通過性を観察することとした。薬剤注入後、適量の水を注入してガストロボタン内を洗うこととした。

2) 試験結果

	崩壊懸濁試験	通過性試験
ゾルミトリプタン OD 錠 2.5mg「日医工」	5分以内に崩壊・懸濁した。	8Fr.チューブを通過した。

備考:18Fr.ガストロボタンフィーディングチューブを通過した。

本試験は、「内服薬 経管投与ハンドブック((株)じほう)」に準じて実施しました。

2. その他の関連資料

なし

付表 1 — 1

薬食発第 0331015 号(平成 17 年 3 月 31 日)に基づく承認申請時に添付する資料

別表1及び別表2-(1)医療用医薬品より改変

	添付資	料の内容	新有効成分含有製 剤(先発医薬品)	その他の医薬品 (後発医薬品)	剤形追加に係る医薬品(後発医薬品)
	[又は発見の]及び外国に	1 起源又は発見の経 緯	0	×	0
	る使用状況 関する資料	2 外国における使用 状況	0	×	0
		3 特性及び他の医薬 品との比較検討等	0	×	0
	方法並びに規 び試験方法等	1 構造決定及び物理 化学的性質等	0	×	×
に関	する資料	2 製造方法	0	Δ	0
		3 規格及び試験方法	0	0	0
ハ安定	性に関する資	1 長期保存試験	0	×	Δ
料	_	2 苛酷試験	0	×	Δ
		3 加速試験	0	0	0
二 薬理質料		1 効力を裏付ける試験	0	×	×
		2 副次的薬理・安全 性薬理	0	×	×
	-	3 その他の薬理	Δ	×	×
ホ 吸収	,分布,代	1 吸収	0	×	×
	排泄に関する	2 分布	0	×	×
資料	-	3 代謝	0	×	×
	-	4 排泄	0	×	×
	-	5 生物学的同等性	×	0	0
	-	6 その他の薬物動態	Δ	×	×
へ急性	毒性,亜急性	1 単回投与毒性	0	×	×
	,慢性毒性,	2 反復投与毒性	0	×	×
催奇	形性その他の	3 遺伝毒性	0	×	×
毒性	!	4 がん原性	Δ	×	×
		5 生殖発生毒性	0	×	×
		6 局所刺激性	Δ	×	×
		7 その他の毒性	Δ	×	×
	試験の成績に る資料	臨床試験成績	0	×	×

○:添付, X:添付不要, △:個々の医薬品により判断される

付表 1 — 2

医薬発第 481 号(平成 11 年 4 月 8 日)に基づく承認申請時に添付する資料

別表1及び別表2-(1)医療用医薬品より改変

添付資	資料の内容	新有効成分含有製 剤(先発医薬品)	その他の医薬品 (後発医薬品)	剤形追加に係る医薬品(後発医薬品)
イ 起源又は発見の 経緯及び外国に		0	×	0
おける使用状況 等に関する資料	2 外国における使用 状況	0	×	0
	3 特性及び他の医薬 品との比較検討等	0	×	0
口 物理的化学的性質	I 111/200/C	\circ	×	×
並びに規格及び試験方法等に関する		0	×	×
資料	3 規格及び試験方法	0	0	0
ハ 安定性に関する資	1 長期保存試験	0	×	Δ
料	2 苛酷試験	0	×	Δ
	3 加速試験	0	0	0
二 急性毒性,亜急	1 単回投与毒性	0	×	×
性毒性,慢性毒	2 反復投与毒性	0	X	×
性,催奇形性そ	3 生殖発生毒性	0	×	X
の他の毒性に関	4 変異原性	0	×	×
する資料	5 がん原性	Δ	×	X
	6 局所刺激性	\triangle	×	×
	7 その他の毒性	Δ	×	×
ホ 薬理作用に関する 資料	1 効力を裏付ける 試験	0	×	×
	2 一般薬理	0	×	×
へ 吸収, 分布, 代謝,	1 吸収	0	×	×
排泄に関する資	2 分布	0	×	×
料	3 代謝	0	×	X
	4 排泄	0	×	×
	5 生物学的同等性	×	0	0
ト 臨床試験の成績に 関する資料	臨床試験成績	0	×	×

○:添付, ×:添付不要, △:個々の医薬品により判断される

付表 1 — 3

薬発第698号(昭和55年5月30日)に基づく承認申請時に添付する資料

別表1及び別表2-(1)医療用医薬品より改変

添付資料の内容			新有効成分含有製 剤(先発医薬品)	その他の医薬品 (後発医薬品)	剤形追加に係る医薬品(後発医薬品)	
イ	起源又は発見の 経緯及び外国に	1 起源又は 緯	発見の経	0	×	0
	おける使用状況 等に関する資料	2 外国にお 状況	ける使用	0	×	0
		3 特性及び付品との比較		0	×	0
口	物理的化学的性	1 構造決定		0	×	×
	質並びに規格及び試験方法等に	2 物理的化等	学的性質	0	×	×
	関する資料	3 規格及び試	験方法	0	0	0
ハ	安定性に関する	1 長期保存試	験	0	×	×
	資料	2 苛酷試験		0	×	×
		3 加速試験		×	0	0
_	性毒性,慢性毒 性,催奇形性そ の他の毒性に関 する資料	1 急性毒性		0	×	×
		2 亜急性毒性	•	0	×	×
		3 慢性毒性		0	×	×
		4 生殖に及ぼ	す影響	0	×	×
		5 依存性		Δ	×	×
		6 抗原性		\triangle	×	×
		7 変異原性		Δ	×	×
		8 がん原性		Δ	×	×
		9 局所刺激		Δ	×	×
ホ	る資料	1 効力を裏付 試験	·ける	0	×	×
		2 一般薬理		0	×	×
^	吸収,分布,代謝,	1 吸収		0	×	×
	排泄に関する資	2 分布		0	×	×
		3 代謝		0	×	×
		4 排泄		0	×	×
		5 生物学的同	等性	×	0	0
۲	臨床試験の試験 成績に関する資 料	臨床試験の試	験成績	0	×	0

○:添付, ×:添付不要, △:個々の医薬品により判断される