日本標準商品分類番号 876132

# 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の I F記載要領 2018 (2019 年更新版) に準拠して作成

# 経口用セフェム系抗生物質製剤 日本薬局方 セファクロルカプセル

# セファクロルカプセル250mg「SN」 Cefaclor Capsules 250mg [SN]

剤 形	硬力プセル剤
製剤の規制区分	処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)
規格・含量	1カプセル中 (日局)セファクロル…250mg(力価)
一 般 名	和名:セファクロル (JAN) 洋名: Cefaclor (JAN、INN)
製造販売承認年月日 薬 価 基 準 収 載 ・ 販 売 開 始 年 月 日	製造販売承認年月日:2014年2月12日(販売名変更による) 薬価基準収載年月日:2014年6月20日(販売名変更による) 販売開始年月日:1990年7月
製造販売(輸入)· 提携·販売会社名	製造販売元:シオノケミカル株式会社 販売元:あゆみ製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	シオノケミカル株式会社 学術情報本部 TEL: 03-5202-0213 FAX: 03-5202-0230 医療関係者向けホームページ: https://www.shiono.co.jp/shiono_db/choice.php

本 IF は 2023 年 12 月改訂の電子添文の記載に基づき改訂した。 最新の情報は、独立行政法人 医薬児医療機器総合機構の医薬児情報検索

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

# 医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 - 日本病院薬剤師会-

(2020年4月改訂)

#### 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書(以下、添付文書)がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者(以下、MR)等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム(以下、IFと略す)が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬)学術第2小委員会がIFの位置付け、IF記載様式、IF記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がIF記載要領の改訂を行ってきた。

IF 記載要領 2008 以降、IF は PDF 等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加した IF が速やかに提供されることとなった。最新版の IF は、医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)の医療用医薬品情報検索のページ (https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/) にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品の IF の情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のIF が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせ、IF記載要領 2018 が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

#### 2. IF とは

IF は「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IF に記載する項目配列は日病薬が策定した IF 記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された IF は、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

IFの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

#### 3. IF の利用にあたって

電子媒体の IF は、PMDA の医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って IF を作成・提供するが、IF の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や IF 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の MR 等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IF の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IF が改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により

薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を PMDAの医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V.5.臨床成績」や「XII.参考資料」、「XIII.備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

#### 4. 利用に際しての留意点

IFを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IFは日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には薬機法の広告規則や医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らがIFの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IFを活用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

# 目次

ī		概	要に関する項目	1
•	1.		開発の経緯	
	2.		製品の治療学的特性	
	3.		製品の製剤学的特性	
	4.		適正使用に関して周知すべき特性	
	5.		承認条件及び流通・使用上の制限事項	
	6.		RMPの概要	
Π	-	名	称に関する項目	
_	1.	_	販売名	
	2.		一般名	
	3.		構造式又は示性式	
	4.		分子式及び分子量	
	5.		化学名(命名法)又は本質	
	6.		慣用名、別名、略号、記号番号	
Ш		有	効成分に関する項目	
	1.		物理化学的性質	
	2.		有効成分の各種条件下における安定性	
	3.		有効成分の確認試験法、定量法	
IV		製	利に関する項目	
	1.		剤形	
	2.		製剤の組成	
	3.		添付溶解液の組成及び容量	
	4.		力価	
	5.		混入する可能性のある夾雑物	
	6.		製剤の各種条件下における安定性	5
	7.		調製法及び溶解後の安定性	5
	8.		他剤との配合変化(物理化学的変化)	5
	9.		溶出性	5
	10	).	容器・包装	6
	11		別途提供される資材類	6
	12	2.	その他	6
V		治	療に関する項目	7
	1.		効能又は効果	7
	2.		効能又は効果に関連する注意	7
	3.		用法及び用量	
	4.		用法及び用量に関連する注意	7
	5.		臨床成績	
VI		薬	効薬理に関する項目	
	1.		薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	9
	2.		薬理作用	
VII	•	薬	物動態に関する項目1	
	1.		血中濃度の推移1	
	2.		薬物速度論的パラメータ1	
	3.		母集団(ポピュレーション)解析1	
	4.		吸収1	1
	5.		分布1	1
	6.		代謝1	
	7.		排泄1	
	8.		トランスポーターに関する情報1	
	9.		透析等による除去率1	
	10		特定の背景を有する患者1	
	11		その他1	2

VIII	. 安	全性(使用上の注意等)に関する項目	13
	1.	警告内容とその理由	13
	2.	禁忌内容とその理由	13
	3.	効能又は効果に関連する注意とその理由	13
	4.	用法及び用量に関連する注意とその理由.	13
	5.	重要な基本的注意とその理由	13
	6.	特定の背景を有する患者に関する注意	13
	7.	相互作用	14
	8.	副作用	
	9.	臨床検査結果に及ぼす影響	15
	10.	過量投与	
	11.	適用上の注意	
	12.		
IX	. 非	臨床試験に関する項目	
	1.	薬理試験	
	2.	毒性試験	
Х		理的事項に関する項目	
	1.	規制区分	
	2.	有効期間	
	3.	包装状態での貯法	
	4.	取扱い上の注意	
	5.	患者向け資材	
	6.	同一成分・同効薬	
	7.	国際誕生年月日	
	8.	製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基	
	_	収載年月日、販売開始年月日	
	9.	効能又は効果追加、用法及び用量変更追加	-
	10	の年月日及びその内容	
	10.	再審査結果、再評価結果公表年月日及びそ	
		内容	
	11.	再審查期間	
	12. 13.	投薬期間制限に関する情報	
		各種コード	
v	14. I.	文献	
Λ	1.	引用文献	
	1. 2.	その他の参考文献	
	∠. Ⅱ.	参考資料	_
Δ.	1.	主な外国での発売状況	21
	2.	海外における臨床支援情報	
x		備考	
-1	1.	調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うに	
		たっての参考情報	
	2.	その他の関連資料	

# I. 概要に関する項目

#### 1. 開発の経緯

セファクロルは経口用セフェム系抗生物質であり、本邦では昭和 57 年 1 月に上市されている。 ザルツクラールカプセル 250 は、シオノケミカル株式会社が後発医薬品として薬発第 698 号(昭和 55 年 5 月 30 日)に基づき、規格及び試験方法を設定、安定性試験、生物学的同等性試験を実施し、 平成 2 年 3 月に承認を取得、平成 2 年 7 月に発売に至った。

その後、医療事故防止のため、ザルツクラールカプセル 250 の名称をセファクロルカプセル 250mg 「SN」とする代替新規申請を行い、平成 26 年 2 月に承認を得て、平成 26 年 6 月に発売し現在に至っている。

### 2. 製品の治療学的特性

- (1) 細菌の細胞壁合成を阻害することにより抗菌作用を発揮し、作用は殺菌的である。セファレキシンより低濃度・短時間で殺菌に至らしめる[1][2]。
- (2) 重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、急性腎障害、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、偽膜性大腸炎、中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、間質性肺炎、PIE 症候群、肝機能障害、黄疸、溶血性貧血が報告されている。(「VIII.-8.(1) 重大な副作用と初期症状」の項(P.14)参照)

#### 3. 製品の製剤学的特性

該当資料なし

#### 4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、	有無
最適使用推進ガイドライン等	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
RMP	無
追加のリスク最小化活動として	無
作成されている資材	<del>////</del>
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

#### 5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

(1) 承認条件

該当しない

(2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

#### 6. RMPの概要

該当しない

# Ⅱ. 名称に関する項目

# 1. 販売名

(1) 和名

セファクロルカプセル 250mg「SN」

(2) 洋名

Cefaclor Capsules 250mg [SN]

(3) 名称の由来

「有効成分名」+「剤形」+「規格」+「屋号」より命名した。

# 2. 一般名

(1) 和名(命名法)

セファクロル (JAN)

(2) 洋名(命名法)

Cefaclor (JAN, INN)

(3) ステム

セファロスポリン系抗生物質:cef-

# 3. 構造式又は示性式

# 4. 分子式及び分子量

分子式: C<sub>15</sub>H<sub>14</sub>ClN<sub>3</sub>O<sub>4</sub>S

分子量:367.81

# 5. 化学名(命名法)又は本質

(6R,7R)-7-[(2R)-2-Amino-2-phenylacetylamino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (IUPAC)

# 6. 慣用名、別名、略号、記号番号

略号: CCL

# Ⅲ. 有効成分に関する項目

# 1. 物理化学的性質

(1) 外観·性状

白色~黄白色の結晶性の粉末である。

(2) 溶解性

水又はメタノールに溶けにくく、N,Nジメチルホルムアミド又はエタノール(99.5)にほとんど溶けない。

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点 (分解点)、沸点、凝固点

該当資料なし

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

旋光度  $\left[\alpha\right]_{D}^{20}:+105\sim+120^{\circ}$  (脱水物に換算したもの 0.1g、水、25mL、100mm) 比吸光度  $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ (264nm): 約 245 [本品の水溶液( $1\rightarrow50000$ )] [3]

#### 2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

# 3. 有効成分の確認試験法、定量法

確認試験法:

日本薬局方「セファクロル」の確認試験法による

- (1) 紫外可視吸光度測定法
- (2) 赤外吸収スペクトル測定法(臭化カリウム錠剤法)
- (3) 核磁気共鳴スペクトル測定法
- (4) 炎色反応試験 (2)

#### 定量法:

日本薬局方「セファクロル」の定量法による 液体クロマトグラフィー

# Ⅳ. 製剤に関する項目

# 1. 剤形

(1) 剤形の区別

硬カプセル剤

(2) 製剤の外観及び性状

色・剤形	蓋部青色不透明、胴体部白色不透明の硬カプセル剤で、内容物は白色〜黄白色の粒を				
	含む粉末で、わずかに特異さ	なにおいを有し	、味はわずか	に苦い。	
	側面			断面	
外形	SLT 097 250 118	)			
サイズ	2 号カプセル				
	全長 重		<b>基</b>	蓋部	
規格			里	胴体部	
/兄/谷	17.9mm	259	ma	6.3mm	
	17.711111	358mg		6.1mm	

# (3) 識別コード

表示部位:錠剤、PTPシート

表示内容: SLT 250

(4) 製剤の物性

該当資料なし

(5) その他

該当しない

# 2. 製剤の組成

(1) 有効成分 (活性成分) の含量及び添加剤

有効成分 (1 カプセル中)	(日局)セファクロル…250mg(力価)
添加剤	セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ラウリル硫酸ナトリウム、青色 1号、酸化チタン、ゼラチン

# (2) 電解質等の濃度

該当資料なし

(3) 熱量

該当資料なし

# 3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

# 4. 力価

該当しない

#### 5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

# 6. 製剤の各種条件下における安定性

#### 長期保存試験 [4]

長期保存試験(温度  $7.0\sim27.8$ °C、相対湿度  $27.0\sim100.0$ %、2 年間)の結果、セファクロルカプセル 250 mg [SN] は通常の市場流通下において 2 年間安定であることが確認された。

試験条件:  $7.0\sim27.8$ °C、 $27.0\sim100.0$ %RH

試験製剤:アルミパックした PTP 包装

試験項目	規格 <sup>注 1)</sup>	開始時	6ヵ月	12 ヵ月	18ヵ月	24 ヵ月
性状	頭部青色不透明、胴体部白色不透明の硬カプセル剤で、内容物は白色~黄白色の粒を含む粉末で、わずかに特異なにおいを有する	適合	適合	適合	適合	適合
定量試験 (力価)(%) <sup>注2)</sup>	90~120	99.5	102.4	98.4	96.1	95.0

注1) 承認時の規格

注2)2 ロット各1回測定の平均値

その他の試験項目(水分、溶出試験)についても規格内であった。

# 7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

# 8. 他剤との配合変化(物理化学的変化)

該当資料なし

#### 9. 溶出性

# (1) 溶出挙動における類似性(品質再評価) [5]

「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成 9 年 12 月 22 日 医薬審第 487 号)に基づき実施

試験方法:日本薬局方 一般試験法 溶出試験法 パドル法

試験条件

試験液量:900mL 温 度:37.0±0.5℃


試 験 液:pH1.2、pH4.0、pH6.8、水

回 転 数:50rpm (pH1.2、pH4.0、pH6.8、水)

試験結果:「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(平成9年12月22日 医薬審第487

号)」に基づき判定した結果、全ての条件において判定基準に適合した。

# <溶出曲線>



 $(Mean \pm S.D., n=6)$ 

# (2) 公的溶出規格への適合性 [6]

セファクロルカプセル 250mg「SN」は、日本薬局方医薬品各条に定められたセファクロルカプセルの溶出規格に適合していることが確認されている。

# 10. 容器•包装

(1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報 該当しない

(2) 包装

100 カプセル [10 カプセル (PTP) ×10]

(3) 予備容量

該当しない

(4) 容器の材質

PTP: ポリ塩化ビニル、アルミニウム

ピロー:ポリエチレン、アルミニウム

バンド:ポリエチレン

個装箱:紙

# 11. 別途提供される資材類

該当資料なし

# 12. その他

該当しない

# V. 治療に関する項目

#### 1. 効能又は効果

〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌

〈適応症〉

- 〇表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症
- ○外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎
- 〇咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染
- 〇膀胱炎、腎盂腎炎
- 〇麦粒腫
- 〇中耳炎
- 〇歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
- 〇猩紅熱

# 2. 効能又は効果に関連する注意

5. 効能又は効果に関連する注意

〈咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、中耳炎〉

「抗微生物薬適正使用の手引き」「「Tを参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

#### 3. 用法及び用量

(1) 用法及び用量の解説

通常、成人及び体重 20kg 以上の小児にはセファクロルとして 1 日 750mg(力価)を 3 回に分割して経口投与する。重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には 1 日 1500mg(力価)を 3 回に分割して経口投与する。

なお、年齢、体重、症状等に応じ適宜増減する。

(2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

<副作用等による減量・中止規定>「Ⅷ.-8. 副作用」の項参照

4. 用法及び用量に関連する注意

設定されていない

#### 5. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床薬理試験

該当資料なし

(3) 用量反応探索試験

#### (4) 検証的試験

1) 有効性検証試験

有効性及び安全性に関する試験

# 二重盲検比較試験

セファレキシンを対照薬とし、細菌性気管支炎 [8]、急性単純性膀胱炎 [9]、複雑性尿路感染症 [10]、 急性皮膚感染症 [11]、歯科・口腔外科領域感染症 [12]を対象とした 5 種の二重盲検比較試験、及び セファレキシン複粒を対照薬とし、急性単純性膀胱炎 [13]を対象とした二重盲検比較試験において、 セファクロルの有用性が確認された。

#### 2) 安全性試験

該当資料なし

(5) 患者・病態別試験

該当資料なし

- (6) 治療的使用
- 1) 使用成績調査(一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査)、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容

該当資料なし

- 2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要 該当しない
- (7) その他

# VI. 薬効薬理に関する項目

### 1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群

セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物、セフジニル、セフジトレン ピボキシル、セフテラム ピボキシル等セフェム系抗生物質(経口)

注意:関連のある化合物の効能・効果等は、最新の電子添文を参照すること。

# 2. 薬理作用

#### (1) 作用部位・作用機序

細菌の細胞壁合成を阻害することにより抗菌作用を発揮し、作用は殺菌的である。セファレキシンより低濃度・短時間で殺菌に至らしめる  $^{[1][2]}$ 。

# (2) 薬効を裏付ける試験成績

# 抗菌作用

試験管内で好気性グラム陽性菌のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、グラム陰性菌の大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌に対して抗菌力を示す。リケッチア属、クラミジア属、マイコプラズマ属、ウイルス、真菌及び原虫には増殖阻止効果を示さない。細菌の産生する不活化酵素セファロスポリナーゼに対して、試験管内で安定性を示す[1][2][14]。

#### (3) 作用発現時間·持続時間

# Ⅲ. 薬物動態に関する項目

#### 1. 血中濃度の推移

(1) 治療上有効な血中濃度 該当資料なし

# (2) 臨床試験で確認された血中濃度

#### 1) 単回投与

健康成人に、250mg(力価)、500mg(力価)を空腹時単回経口投与したときの薬物動態パラメータを表 1 に示す  $^{[15]}$ 。

表1)薬物動態パラメータ

投与量 [mg(力価)]	n	Cmax ( µ g/mL)	AUC <sub>0-6</sub> (μg·hr/mL)	t <sub>1/2</sub> (min)
250	14	7.42	8.9	27
500	14	13.04	18.7	31

(測定法: bioassay) (mean)

# 2) 生物学的同等性試験

「医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料の取扱等について」(昭和 55 年 5 月 30 日 薬審第 718 号)における「生物学的同等性に関する試験基準」に基づき実施セファクロルカプセル 250 mg 「SN」とケフラールカプセル 250 mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 カプセル(セファクロルとして 250 mg (力価))健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について、統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された [16]。




図1) セファクロルカプセル250mg (力価) を単回投与したときの 血漿中未変化体濃度推移

表2) セファクロルカプセル250mg (力価) を単回投与したときの 薬物動態パラメータ

	判定パラ	メータ	参考パラメータ	
	AUC <sub>0-24</sub> (μg (力価)・ hr/mL)	Cmax (μg (力価) /mL)	tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
セファクロルカプ セル250mg「SN」 (カプセル剤、 250mg (力価))	9.9±0.3	7.9±0.3	0.7±0.1	1.3±0.1
ケフラールカプセ ル250mg (カプセル剤、 250mg (力価))	9.6±0.4	8.2±0.4	0.7±0.0	1.2±0.0

 $(Mean \pm S.E., n=10)$ 

血漿中濃度並びにAUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

#### (3) 中毒域

該当資料なし

(4) 食事・併用薬の影響

該当資料なし

# 2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) 消失速度定数

該当資料なし

(4) クリアランス

該当資料なし

(5) 分布容積

該当資料なし

(6) その他

該当資料なし

#### 3. 母集団 (ポピュレーション) 解析

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) パラメータ変動要因

該当資料なし

# 4. 吸収

該当資料なし

# 5. 分布

(1) 血液一脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液一胎盤関門通過性

「Ⅷ.-6. (5) 妊婦」の項参照

(3) 乳汁への移行性

「Ⅷ.-6. (6) 授乳婦」の項参照

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

扁桃・上顎洞粘膜  $^{[17]}$ 、肺組織  $^{[18]}$ 、口腔組織  $^{[19]}$  (歯肉、嚢胞壁、顎骨)、乳汁中  $^{[20]}$ に移行が認められた。[9.6 参照]

(6) 血漿蛋白結合率

限外ろ過法にて測定された血漿蛋白結合率は23.1%であった[21]。

#### 6. 代謝

#### (1) 代謝部位及び代謝経路

ラット、マウス、ウサギ、イヌに経口投与後、大部分が未変化体のまま尿中に排泄され、主要代謝物は尿中に認められなかった[21]。

(2) 代謝に関与する酵素 (CYP等) の分子種、寄与率

該当資料なし

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

該当資料なし

# 7. 排泄

健康成人に 250mg(力価) (n=14)、500mg(力価) (n=14) 空腹時単回経口投与後 6 時間以内の 尿中回収率はいずれも 70%以上であった [15]。

# 8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

#### 9. 透析等による除去率

該当資料なし

# 10. 特定の背景を有する患者

#### 腎機能障害患者

500mg (力価) 空腹時単回経口投与時、腎機能障害患者では健康成人に比べ半減期の延長が認められた。また、Cmax も高値を示した [22] (外国人データ)。[9.2.1 参照]

表3)薬物動態パラメータ

対象	n	Ccr (mL/min/1.73m <sup>2</sup> )	Cmax (µg/mL)	tmax (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
健康成人	5	$\geq 107 \text{ (mean)}$	$12.4 \pm 1.3^{\pm 1}$	` ′	0.8±0.1 <sup>注1</sup>
		37.7	20.5	2	1.5
腎機能 障害患者	2	16	18.0	4	透析時: 2.1±0.1 <sup>注1</sup>
無尿患者	4	0.0	19.7±3.3注1	0.5~4	非透析時: 2.8±0.8 <sup>注1</sup>

注1: mean ± S.E.

(測定法: bioassay)

# 11. その他

# Ⅲ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由

設定されていない

# 2. 禁忌内容とその理由

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者「9.1.1 参照]

3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

「V.-2. 効能又は効果に関連する注意」の項参照

4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

設定されていない

#### 5. 重要な基本的注意とその理由

- 8. 重要な基本的注意
- 8.1ショックがあらわれるおそれがあるので、十分な問診を行うこと。[11.1.1 参照]
- 8.2 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。
- 8.3 急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行うなど 観察を十分に行うこと。[11.1.2 参照]
- 6. 特定の背景を有する患者に関する注意
  - (1) 合併症・既往歴等のある患者
    - 9. 特定の背景を有する患者に関する注意
    - 9.1 合併症・既往歴等のある患者
    - 9.1.1 セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者(ただし、本剤に対し過敏症の既 往歴のある患者には投与しないこと)

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しない。[2.参照]

- 9.1.2ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
- 9.1.3 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体質を有する患者
- 9.1.4 経口摂取の不良な患者又は非経口栄養の患者、全身状態の悪い患者 観察を十分に行うこと。ビタミン K 欠乏症状があらわれることがある。
- (2) 腎機能障害患者
  - 9.2 腎機能障害患者
  - 9.2.1 高度の腎障害のある患者

投与量を減らすか、投与間隔をあけて使用すること。血中濃度が持続する。[16.6.1 参照]

(3) 肝機能障害患者

設定されていない

(4) 生殖能を有する者

設定されていない

#### (5) 妊婦

# 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### (6) 授乳婦

#### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行することが報告されている。[16.3.1 参照]

#### (7) 小児等

設定されていない

#### (8) 高齢者

#### 9.8 高齢者

次の点に注意し、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

- ・生理機能が低下していることが多く副作用が発現しやすい。
- ・ビタミンK欠乏による出血傾向があらわれることがある。

#### 7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

設定されていない

(2) 併用注意とその理由

設定されていない

#### 8. 副作用

#### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### (1) 重大な副作用と初期症状

#### 11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー (いずれも 0.1%未満)

ショック、アナフィラキシー(呼吸困難、喘鳴、全身潮紅、浮腫等)を起こすことがある。 [8.1 参照]

11.1.2 急性腎障害 (頻度不明)

急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがある。[8.3 参照]

- 11.1.3 汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少(いずれも頻度不明)
- 11.1.4 偽膜性大腸炎(0.1%未満)

偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には、直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1.5 中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群) (いずれも頻度不明)

# 11.1.6 間質性肺炎、PIE 症候群(いずれも頻度不明)

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎、PIE 症候群等があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### 11.1.7 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

AST、ALT、Al-Pの著しい上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

# 11.1.8 溶血性貧血

# (2) その他の副作用

#### 11 2 その他の副作用

11.2 その他の副作用							
	0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明				
過敏症	発疹	蕁麻疹、紅斑、そう痒、	リンパ腺腫脹、関節痛				
		発熱等					
血液		顆粒球減少、貧血(赤血					
		球減少、ヘモグロビン減					
		少、ヘマトクリット減					
		少)、血小板減少、好酸球					
		増多等					
肝臓	AST 上昇、ALT 上昇	Al-P 上昇	黄疸				
腎臓		BUN 上昇、血清クレアチ					
		ニン上昇					
消化器	悪心、下痢、腹痛	嘔吐、胃不快感、胸やけ、					
		食欲不振等					
菌交代症			口内炎、カンジダ症				
ビタミン			ビタミン K 欠乏症状(低				
欠乏症			プロトロンビン血症、出				
			血傾向等)、ビタミン B				
			群欠乏症状(舌炎、口内				
			炎、食欲不振、神経炎等)				
その他		頭痛、めまい等					

# 9. 臨床検査結果に及ぼす影響

#### 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

- 12.1 テステープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。
- 12.2 直接クームス試験陽性を呈することがあるので注意すること。

#### 10. 過量投与

設定されていない

# 11. 適用上の注意

# 14. 適用上の注意

# 14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

# 12. その他の注意

(1) 臨床使用に基づく情報

設定されていない

(2) 非臨床試験に基づく情報

設定されていない

# 区. 非臨床試験に関する項目

# 1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」の項参照

(2) 安全性薬理試験

該当資料なし

(3) その他の薬理試験

該当資料なし

# 2. 毒性試験

(1) **単回投与毒性試験** 該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

(4) がん原性試験

該当資料なし

(5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(6) 局所刺激性試験

該当資料なし

(7) その他の特殊毒性

# X. 管理的事項に関する項目

# 1. 規制区分

製 剤:処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

有効成分:該当しない

# 2. 有効期間

2年

# 3. 包装状態での貯法

室温保存

# 4. 取扱い上の注意

# 20. 取扱い上の注意

アルミピロー開封後は遮光して保存すること。

# 5. 患者向け資材

患者向医薬品ガイド:無し くすりのしおり:有り

#### 6. 同一成分・同効薬

同一成分:ケフラールカプセル 250mg、ケフラール細粒小児用 100mg、L-ケフラール顆粒

同 効 薬:セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物、セフジニル、セフジトレン ピボキシル、セフテ

ラム ピボキシル等セフェム系抗生物質(経口)

# 7. 国際誕生年月日

該当しない

# 8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

販売名	製造販売承認	承認番号	薬価基準収載	販売開始
	年月日		年月日	年月日
旧販売名				
ザルツクラール	1990年3月9日	20200EMZ00068000	1990年7月13日	1990年7月
カプセル 250				
販売名変更				
セファクロルカプ	2014年2月12日	22600AMX00224000	2014年6月20日	2014年6月20日
セル 250mg「SN」				

# 9. **効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容** 該当しない

# 10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

# 11. 再審査期間

該当しない

# 12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬(あるいは投与)期間に関する制限は定められていない。

# 13. 各種コード

販売名	厚生労働省薬価基準	個別医薬品コード	HOT (9 桁)	レセプト電算処理
	収載医薬品コード	(YJ コード)	番号	システム用コード
セファクロル				
カプセル 250mg	6132005M1253	6132005M1253	110891004	621089103
$\lceil \mathrm{SN}  floor$				

# 14. 保険給付上の注意

本剤は基礎的医薬品に該当する。

# XI. 文献

#### 1. 引用文献

- 1. 吉田正 他: Chemotherapy. 1979; 27 (S-7): 71-97
- 2. 加藤博 他: Chemotherapy. 1979; 27 (S-7): 150-157
- 3. 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店
- 4. シオノケミカル (株) 社内資料:安定性試験(長期保存試験)
- 5. シオノケミカル (株) 社内資料:溶出試験(品質再評価)
- 6. シオノケミカル (株) 社内資料: 溶出試験(公的)
- 7. 厚生労働省健康局結核感染症課編:抗微生物薬適正使用の手引き
- 8. 松本慶蔵 他: Chemotherapy. 1981; 29 (6): 653-697
- 9. 石神襄次 他: Chemotherapy. 1981; 29 (3): 250-266
- 10. 守殿貞夫 他: Jpn. J. Antibiot. 1985; 38 (10): 2735-2769 (PMID: 3908727)
- 11. 荒田次郎 他: Chemotherapy. 1981; 29 (3): 267-279
- 12. 堀井正雄 他: Jpn. J. Antibiot. 1984; 37 (1): 152-175 (PMID: 6374193)
- 13. 石神襄次 他:基礎と臨床 1987;21(2):933-955
- 14. 五島瑳智子 他: Chemotherapy. 1979; 27 (S-7): 1-13
- 15. 神木照雄 他: Chemotherapy. 1979; 27 (S-7): 158-173
- 16. シオノケミカル (株) 社内資料: 生物学的同等性試験
- 17. 岩沢武彦: Chemotherapy. 1979; 27 (S-7): 682-696
- 18. 今泉宗久 他: Jpn. J. Antibiot. 1986; 39 (10): 2754-2760 (PMID: 3806958)
- 19. 難波良司 他:歯科薬物療法 1983;2(2):79-93
- 20. 高瀬善次郎 他: Chemotherapy. 1979; 27 (S-7): 666-672
- 21. 吉田正 他: Chemotherapy. 1979; 27 (S-7): 105-115
- 22. Agarwal, B. N. et al.: Postgrad. Med. J. 1979; 55 (S-4): 12-16 (PMID: 548939)

# 2. その他の参考文献

# X II. 参考資料

1. **主な外国での発売状況** 海外で発売されていない(2023年12月時点)

2. 海外における臨床支援情報 該当資料なし

# XⅢ. 備考

- 1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報
  - (1) 粉砕

該当資料なし

(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性 該当資料なし

# 2. その他の関連資料