

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2018 (2019年更新版) に準拠して作成

精神神経用剤

プロクロルペラジンメシル酸塩注射液

ノバミン[®]筋注5mg

Novamin[®] Intramuscular Injection

剤 形	注射液
製剤の規制区分	処方箋医薬品 ^{注1)} 注 1) 注意—医師等の処方箋により使用すること
規 格・含 量	1 管 (1mL) 中、プロクロルペラジンメシル酸塩 7.57mg (プロクロルペラジンとして 5 mg に相当)
一 般 名	和名 : プロクロルペラジンメシル酸塩 (JAN) 洋名 : Prochlorperazine Mesilate (JAN)
製造販売承認年月日・ 薬価基準収載・ 販売開始年月日	製造販売承認年月日 : 2006年8月17日 (販売名変更による) 薬価基準収載年月日 : 2006年12月8日 (販売名変更による) 販 売 開 始 年 月 日 : 1959年3月
製造販売(輸入)・ 提携・販売会社名	製造販売元 : 共和薬品工業株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	共和薬品工業株式会社 お問い合わせ窓口 TEL.0120-041189(フリーダイヤル) FAX.06-6121-2858 医療関係者向けホームページ https://www.kyowayakuhin.co.jp/amel-di/

本 IF は 2023 年 10 月改訂の電子添文の記載に基づき改訂した。

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 ー日本病院薬剤師会ー

(2020年4月改訂)

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書(以下、添付文書)がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者(以下、MR)等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム(以下、I Fと略す)が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬)学術第2小委員会がI Fの位置付け、I F記載様式、I F記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がI F記載要領の改訂を行ってきた。

I F記載要領2008以降、I FはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したI Fが速やかに提供されることとなった。最新版のI Fは、医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)の医療用医薬品情報検索のページ(<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>)にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のI Fの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のI Fが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせ、「I F記載要領2018」が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

2. I Fとは

I Fは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

I Fに記載する項目配列は日病薬が策定したI F記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等はI Fの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたI Fは、利用者自らが評価・判断・臨床適用とともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

I Fの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

3. I Fの利用にあたって

電子媒体のI Fは、PMDAの医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従ってI Fを作成・提供するが、I Fの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やI F作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、I Fの利用性を高める必要がある。また、隨時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、I Fが改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、I Fの使用にあたっては、最新の添付文書をPMDAの医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V.5.臨床成績」や「XII.参考資料」、「XIII.備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

I Fを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。I Fは日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の広告規則や販売情報提供活動ガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行なうことは差し支えないとされており、MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らがI Fの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならぬ。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、I Fを利用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

目 次

I. 概要に関する項目	1	3. 用法及び用量	10
1. 開発の経緯	1	4. 用法及び用量に関する注意	10
2. 製品の治療学的特性	1	5. 臨床成績	10
3. 製品の製剤学的特性	1		
4. 適正使用に関する周知すべき特性	1		
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項	1		
6. RMPの概要	2		
II. 名称に関する項目	3		
1. 販売名	3		
2. 一般名	3		
3. 構造式又は示性式	3		
4. 分子式及び分子量	3		
5. 化学名(命名法)又は本質	3		
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	3		
III. 有効成分に関する項目	4		
1. 物理化学的性質	4		
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4		
3. 有効成分の確認試験法、定量法	5		
IV. 製剤に関する項目	6		
1. 剤形	6		
2. 製剤の組成	6		
3. 添付溶解液の組成及び容量	7		
4. 力価	7		
5. 混入する可能性のある夾雑物	7		
6. 製剤の各種条件下における安定性	7		
7. 調製法及び溶解後の安定性	7		
8. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	8		
9. 溶出性	8		
10. 容器・包装	8		
11. 別途提供される資材類	8		
12. その他	9		
V. 治療に関する項目	10		
1. 効能又は効果	10		
2. 効能又は効果に関する注意	10		
VI. 薬効薬理に関する項目	12		
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	12		
2. 薬理作用	12		
VII. 薬物動態に関する項目	14		
1. 血中濃度の推移	14		
2. 薬物速度論的パラメータ	15		
3. 母集団(ポピュレーション)解析	15		
4. 吸収	16		
5. 分布	16		
6. 代謝	16		
7. 排泄	17		
8. トランスポーターに関する情報	17		
9. 透析等による除去率	17		
10. 特定の背景を有する患者	17		
11. その他	17		
VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	18		
1. 警告内容とその理由	18		
2. 禁忌内容とその理由	18		
3. 効能又は効果に関する注意とその理由	18		
4. 用法及び用量に関する注意とその理由	18		
5. 重要な基本的注意とその理由	18		
6. 特定の背景を有する患者に関する注意	19		
7. 相互作用	21		
8. 副作用	23		
9. 臨床検査結果に及ぼす影響	27		
10. 過量投与	27		
11. 適用上の注意	28		
12. 他の注意	28		

IX. 非臨床試験に関する項目	29
1. 薬理試験	29
2. 毒性試験	29
X. 管理的事項に関する項目	31
1. 規制区分	31
2. 有効期間	31
3. 包装状態での貯法	31
4. 取扱い上の注意	31
5. 患者向け資材	31
6. 同一成分・同効薬	31
7. 国際誕生年月日	31
8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日	32
9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	32
10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	32
11. 再審査期間	32
12. 投薬期間制限に関する情報	32
13. 各種コード	32
14. 保険給付上の注意	32
X I. 文献	33
1. 引用文献	33
2. その他の参考文献	34
X II. 参考資料	35
1. 主な外国での発売状況	35
2. 海外における臨床支援情報	35
X III. 備考	36
1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報	36
2. その他の関連資料	36

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

1953年クロルプロマジンが精神神経用剤として臨床に用いられるようになって以来、主としてフェノチアジンの2位の置換基と10位の側鎖の構造変換の研究が進められた。本薬は1957年フランスのローヌ・プーラン社(現サノフィ)によって合成され、臨床的に研究されて実用に供されるようになった。

我が国では1958年に製造承認を受けて1959年に発売を開始した。

なお、「ノバミン注」は、医療事故防止対策の一環として、「ノバミン筋注5mg」への販売名変更のための代替新規承認申請を行い、2006年8月17日に承認された。

2016年12月、塩野義製薬株式会社から共和薬品工業株式会社に販売を移管した。

2018年4月、塩野義製薬株式会社から共和薬品工業株式会社に製造販売承認が承継された。

2. 製品の治療学的特性

- (1) 本剤はフェノチアジン系の抗精神病薬でドパミン受容体遮断作用を有し、延髄最後野にある化学受容体引き金帯(chemoreceptor trigger zone : CTZ)に存在するドパミン受容体を遮断することによって制吐作用を示す。(「VI.2.(1)作用部位・作用機序」の項参照)
- (2) 重大な副作用 : Syndrome malin(悪性症候群)、突然死、再生不良性貧血、無顆粒球症、白血球減少、麻痺性イレウス、遅発性ジスキネジア、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)、眼障害、SLE様症状、肺塞栓症、深部静脈血栓症が報告されている。(「VIII.8.副作用」の項参照)

3. 製品の製剤学的特性

該当資料なし

4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、最適使用推進ガイドライン等	有無
RMP	無
追加のリスク最小化活動として作成されている資材	無
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

(1) 承認条件

該当しない

(2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

6. RMPの概要

該当しない

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

ノバミン[®]筋注 5mg

(2) 洋名

Novamin[®] Intramuscular Injection

(3) 名称の由来

nova (新) + amine (語尾調整)

2. 一般名

(1) 和名(命名法)

プロクロルペラジンメシル酸塩(JAN) [局外規]


(2) 洋名(命名法)

Prochlorperazine Mesilate (JAN)

(3) ステム(s t e m)

不明

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式 : $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{ClN}_3\text{S} \cdot 2\text{CH}_3\text{O}_3\text{S}$

分子量 : 566.15

5. 化学名(命名法)又は本質

2-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine dimesilate (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

特になし

III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色～微黄白色の結晶性の粉末で、においはない。

(2) 溶解性

表III-1 溶解性¹⁾

(測定温度 20 ± 5°C)

溶 媒	溶質 1 g を溶かすに要する溶媒量*		日本薬局方による溶解性の用語
水	1 mL 未満		極めて溶けやすい
酢酸(100)	1 mL 未満		極めて溶けやすい
メタノール	30 mL 以上	100 mL 未満	やや溶けにくい
無水酢酸	30 mL 以上	100 mL 未満	やや溶けにくい
エタノール(99.5)	100 mL 以上	1000 mL 未満	溶けにくい
クロロホルム	100 mL 以上	1000 mL 未満	溶けにくい
ジエチルエーテル	10000 mL 以上		ほとんど溶けない

* : 日局 18 通則 30 による

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点(分解点)、沸点、凝固点

融点 : 約 242°C (分解)

(5) 酸塩基解離定数

pKa₁ : 約 3.73²⁾

pKa₂ : 約 8.1²⁾

(6) 分配係数

77625 [1-オクタノール/水]

(7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下における安定性

温度・湿度に対しては安定であるが、光によって徐々に分解変色(黄色)する。

3. 有効成分の確認試験法、定量法

有効成分の確認試験法：局外規「メシル酸プロクロルペラジン」の確認試験による
有効成分の定量法：局外規「メシル酸プロクロルペラジン」の定量法による

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別

注射剤

(2) 製剤の外観及び性状

表IV-1 製剤の外観及び性状

販売名	ノバミン筋注 5mg
性状・剤形	無色～ほとんど無色透明の液である。(注射剤)
pH	5.0～6.0
浸透圧比[生理食塩液に対する比]	約 1

(3) 識別コード

該当しない

(4) 製剤の物性

該当資料なし

(5) その他

該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分(活性成分)の含量及び添加剤

表IV-2 有効成分(活性成分)の含量及び添加剤

販売名	ノバミン筋注 5mg
有効成分	1管(1mL)中、プロクロルペラジンメシル酸塩 7.57mg (プロクロルペラジンとして 5mg)を含有する。
添加剤	アスコルビン酸 1mg 乾燥亜硫酸ナトリウム 2mg 塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム水和物、炭酸水素ナトリウム、注射用水

(2) 電解質等の濃度

製剤としては 1 管(1 mL) 中 Na0.365 mg (0.016 mEq) を含有する。

(3) 熱量

該当資料なし

3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

4. 力価

本剤は力価表示に該当しない。

5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

6. 製剤の各種条件下における安定性

表IV-3 製剤の安定性(長期保存試験)

保存条件	保存形態	保存期間	試験結果
室温、遮光	未開封	48 カ月	含量、外観、pH に変化を認めず。

規格値：含量 93～107%、pH5.0～6.0

表IV-4 製剤の安定性(苛酷試験－曝露試験)

試験項目	保存期間		
	試験開始時	10 万 lx・hr (100 時間)	20 万 lx・hr (200 時間)
外観	無色透明	淡黄色透明	淡黄色透明
pH	5.7	5.1	4.7
含量* (%)	100.5	83.5	72.0

規格値：含量 93～107%、pH5.0～6.0

* : 表示含量に対する含量(%)、測定法；紫外可視吸光度測定法

7. 調製法及び溶解後の安定性


該当しない

8. 他剤との配合変化(物理化学的変化)

(1) pH 変動試験³⁾

試験試料の pH 5.4 (規格 pH 域 : 5.0 ~ 6.0)

1/10 mol/L HCl 3.05 mL 添加時の最終 pH は 1.6、1/10 mol/L NaOH の消費量 0.13 mL で白濁、変化点 pH は 6.97 を示す。



図IV-1 pH 変動スケール

(2) 配合変化

表IV-5 配合変化³⁾

販売名 (容量)	配合剤名	配合量	配合変化
ノバミン筋注 5 mg (5mg、1mL)	ヒルナミン筋注 25 mg*	25mg 1mL	室温 1 時間 外観変化なし

* : 中枢神経抑制作用及び抗コリン作用を有する薬剤のため、本剤の使用上の注意に相互作用の記載がある。

9. 溶出性

該当資料なし

10. 容器・包装

(1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報

該当しない

(2) 包装

1mL [アンプル 50 管]

(3) 予備容量

該当しない

(4) 容器の材質

アンプル：ガラス

11. 別途提供される資材類

該当しない

12.その他

該当しない

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

術前・術後等の悪心・嘔吐

2. 効能又は効果に関連する注意

5. 効能又は効果に関連する注意

筋肉内注射はやむを得ない場合にのみ必要最小限を行い、経口投与が可能な場合には速やかに経口投与に切り換えること。

3. 用法及び用量

(1) 用法及び用量の解説

プロクロルペラジンとして、通常成人 1 日 1 回 5mg を筋肉内注射する。
なお、年齢、症状により、適宜増減する。

(2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

該当資料なし

4. 用法及び用量に関連する注意

設定されていない

5. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床薬理試験

該当資料なし

(3) 用量反応探索試験

該当資料なし

(4) 検証的試験

1) 有効性検証試験

該当資料なし

2) 安全性試験

該当資料なし

(5) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査(一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査)、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容
該当しない

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要
該当しない

(7) その他

該当資料なし

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群

フェノチアジン系化合物、ブチロフェノン系化合物、ゾテピン等

注意：関連のある化合物の効能又は効果等は、最新の電子添文を参照すること。

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序⁴⁾

抗精神病作用：脳内のドバミン、アドレナリン及びセロトニン神経系のシナプス後受容体を遮断することによって、抗精神病作用を示すと考えられている。

制吐作用：本剤は延髄の化学受容体引き金帯(chemoreceptor trigger zone : CTZ)に存在するドバミン受容体を遮断することによって制吐作用を示す。

鎮静作用：脳内ノルアドレナリン受容体遮断作用によるとされている。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

1) 薬理作用⁴⁾

表VI-1 行動変化とレセプター結合に対する作用

	項目	動物種*	プロクロルペラジン	クロルプロマジン
抗 ド バ ミ ン 作 用	アンフェタミンによる運動亢進の抑制	ED ₅₀	マウス	2.08 mg/kg p.o.
	アポモルフィンによるよじ登り行動の抑制	ED ₅₀	マウス	1.55 mg/kg p.o.
	アポモルフィンによる嘔吐の抑制	ED ₅₀	イヌ	1.96 mg/kg p.o.
	ドバミン受容体(D ₂)への親和性	Ki	ラット 線条体	1.9 nmol/L
抗 ノ ル ア ド レ ン 作 用	ノルアドレナリンによる致死への拮抗	ED ₅₀	マウス	56.72 mg/kg p.o.
	ノルアドレナリン受容体(α ₁)への親和性	Ki	ラット 大脳皮質	42 nmol/L
自発運動抑制作用		ED ₅₀	マウス	4.39 mg/kg p.o.
ニ抗 ンセ 作 用 ト	トリプタミンによる首振り運動の抑制	ED ₅₀	マウス	7.08 mg/kg p.o.
	セロトニン受容体(5-HT ₂)への親和性	Ki	ラット 大脳皮質	30 nmol/L
条件反射抑制作用		ED ₅₀	マウス	9.49 mg/kg p.o.
				15.09 mg/kg p.o.

*：系統；マウス(DS系雄)、ラット(Wistar系雄)、イヌ(ビーグル雄)

ED₅₀：50%有効量、Ki：阻害定数

2) 本剤の薬理作用と臨床効果の関係

- ① 条件反射抑制作用を含めた抗ドパミン作用は、幻覚・妄想や概念の統合障害等の陽性症状の改善及び恶心・嘔吐の改善に関連する。
- ② 自発運動抑制作用を含めた抗ノルアドレナリン作用は、躁状態や緊張状態の改善に関連する。
- ③ 抗セロトニン作用は、思考の貧困化や感情鈍麻等の陰性症状の改善に関連する。

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 臨床試験で確認された血中濃度


該当資料なし

(参考)

健康高齢女性 6 例(69.3 ± 2.3 歳、mean \pm S.E.)にプロクロルペラジン 3.125 mg を単回静脈内注射^{*}したときの血漿中濃度の推移を図VII-1 に示す⁵⁾。(外国人データ)

* : 承認外用法・用量(「V.3.用法及び用量」の項参照)

(ng/mL)



図VII-1 血漿中濃度 (プロクロルペラジン静脈内注射時)

(3) 中毒域

該当資料なし

(4) 食事・併用薬の影響

「VIII. 7. 相互作用」の項参照

2. 薬物速度論的パラメータ

該当資料なし

(参考)

健康成人 5 例にプロクロルペラジン 12.5 mg^{*}を単回筋肉内注射したときの薬物動態パラメータを表VII-1 に示す⁶⁾。(外国人データ)

* : 承認外用量(「V. 3. 用法及び用量」の項参照)

表VII-1 薬物動態パラメータ

投与量 (mg)	n	T _{1/2} (hr)	Vd (L/kg)	CL (L/min)
12.5	5	8.1±1.0	17.9±1.50	2.35±0.28

測定法 : HPLC

(mean ± S.E.)

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) 消失速度定数

該当資料なし

(4) クリアランス

該当資料なし

(参考)

「表VII-1 薬物動態パラメータ」参照(外国人データ)

(5) 分布容積

該当資料なし

(参考)

「表VII-1 薬物動態パラメータ」参照(外国人データ)

(6) その他

該当資料なし

3. 母集団(ポピュレーション)解析

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸收

該当資料なし

5. 分布

(1) 血液一脳関門通過性

該当資料なし

(参考)

フェノチアジン系化合物は血液一脳関門を通過することが報告されている⁷⁾。(外国人データ)

(2) 血液一胎盤関門通過性

該当資料なし

(参考)

フェノチアジン系化合物は血液一胎盤関門を通過することが報告されている^{4, 7)}。(外国人データ)

(3) 乳汁への移行性

該当資料なし

(参考)

フェノチアジン系化合物は母乳中へ移行することが報告されている⁴⁾。(外国人データ)

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

(6) 血漿蛋白結合率

90%以上⁴⁾ (外国人データ)

6. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

肝臓で S-オキサイド、3 位と 7 位の水酸化物、そのグルクロロン酸抱合体、N-脱メチル体等に代謝され、尿中、糞中に排泄される。(外国人データ)

(2) 代謝に関与する酵素(CYP 等)の分子種、寄与率

該当資料なし

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

初回通過効果の割合は大きい⁷⁾。(外国人データ)

(4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

該当資料なし

7. 排泄

尿中、糞中へ排泄される。

クロルプロマジンに比べて糞中への排泄が多い^{1, 5)}。(外国人データ)

(参考)

プロクロルペラジン 3.125 mg 単回静脈内注射※後 8 時間の尿中排泄総量⁵⁾

1.0±0.2μg (健康高齢女性 n = 5、mean±S.E.)。(外国人データ)

※ : 承認外用法・用量(「V. 3. 用法及び用量」の項参照)

8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

9. 透析等による除去率

(1) 血液透析

該当資料なし

(参考)

フェノチアジン系化合物は血液透析膜の透過性が低いとの報告がある⁸⁾。

(2) 直接血液灌流

該当資料なし

(参考)

フェノチアジン系化合物は直接血管灌流によって除去可能とされている⁹⁾。

10. 特定の背景を有する患者

該当資料なし

11. その他

該当資料なし

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由

設定されていない

2. 禁忌内容とその理由

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 昏睡状態、循環虚脱状態にある患者[これらの状態を悪化させるおそれがある。]
- 2.2 バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者[中枢神経抑制剤の作用を延長し増強させる。]
- 2.3 アドレナリンを投与中の患者(アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療、又は歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く)[10.1 参照]
- 2.4 フェノチアジン系化合物及びその類似化合物に対し過敏症の患者

<解説>

- 2.1 フェノチアジン系化合物には中枢神経抑制作用、末梢血管拡張作用による血圧降下作用があるので、昏睡状態、循環虚脱状態を悪化させるおそれがある。
- 2.2 バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中中枢神経抑制作用の増強や作用持続時間の延長がみられる。
- 2.4 再投与により重篤な過敏症を起こすおそれがある。

3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

「V.治療に関する項目」を参照すること。

4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

設定されていない

5. 重要な基本的注意とその理由

8. 重要な基本的注意

- 8.1 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
- 8.2 制吐作用を有するため、他の薬剤に基づく中毒、腸閉塞、脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化があるので注意すること。[11.1.4 参照]

<解説>

- 8.2 フェノチアジン系薬剤は CTZ (化学受容器引き金帯)におけるドパミン受容体遮断作用による制吐作用を有する。このため嘔吐症状が不顕性化されることがあるので、診断、治療等に注意が必要である。

6. 特定の背景を有する患者に関する注意

(1) 合併症・既往歴等のある患者

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 皮質下部の脳障害(脳炎、脳腫瘍、頭部外傷後遺症等)の疑いのある患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。高熱反応があらわれるおそれがあるので、このような場合には全身を氷で冷やすか、又は解熱剤を投与するなど適切な処置を行うこと。

9.1.2 血液障害のある患者

血液障害を悪化させるおそれがある。[11.1.3 参照]

9.1.3 褐色細胞腫又はパラガングリオーマ、動脈硬化症あるいは心疾患の疑いのある患者

血圧の急速な変動がみられることがある。

9.1.4 重症喘息、肺気腫、呼吸器感染症等の患者

呼吸抑制があらわれることがある。

9.1.5 てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者

痙攣閾値を低下させことがある。

9.1.6 高温環境にある患者

体温調節中枢を抑制するため、環境温度に影響されるおそれがある。

9.1.7 脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者

Syndrome malin (悪性症候群) が起こりやすい。[11.1.1 参照]

9.1.8 不動状態、長期臥床、肥満、脱水状態等の患者

肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されている。[11.1.9 参照]

<解説>

9.1.1 類薬のクロルプロマジンは体温調節に関与するノルアドレナリン、セロトニン等の受容体を遮断し、高熱反応を起こすことがある。また、脳出血、脳腫瘍、頭蓋骨骨折等の脳障害により体温調節機構が機械的に損傷されると発熱がみられる。

9.1.2 フェノチアジン系薬物による、顆粒球減少症等の種々の血液障害の発現が報告されている。

9.1.3 フェノチアジン系化合物は抗アドレナリン作用による血圧降下作用あるいは心臓に対する直接作用により、血圧の急速な変動を起こすことがある。褐色細胞腫は、大量のカテコールアミンを分泌し、血圧上昇を起こすが、抗アドレナリン作用のある薬剤投与中は起立性低血圧に注意する。

9.1.5 フェノチアジン系化合物は痙攣閾値を低下させ、痙攣発作を起こしやすくする。

9.1.6 抗精神病薬は体温調節に関与するノルアドレナリン、セロトニン等の受容体を遮断し、高熱反応を起こすことがある。高温多湿の環境下に置かれたとき等に突然高熱を発して虚脱状態に陥ることがある¹⁰⁾。

9.1.7 悪性症候群を発症した患者の8割以上が発症前に精神運動興奮による身体衰弱、拒食等による脱水や低栄養状態を呈している。したがって、栄養障害や脱水が著しく身体的疲弊の著明なものに対する抗精神病薬の投薬にあたっては、慎重かつ十分な監視の下に、できるだけ経口投与から始めること¹¹⁾。

9.1.8 欧州医薬品庁(EMA)は2009年10月に抗精神病薬の投与と静脈血栓塞栓症発現の因果関係が否定できないとの検討結果を公表し、添付文書に静脈血栓塞栓症に関する注意を記載するよう通達した。これを受け、同年12月にドイツ連邦医薬品・医療機器庁(BfArM)は、抗精神病薬の添付文書の警告、副作用の項に注意記載するよう通達した。国内においても、抗精神病薬の投与と関連があると考えられる肺塞栓症、静脈血栓症等の報告^{12~14)}があることから、使用上の注意「重要な基本的注意」の項に肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症発現の危険因子の追記及び「重大な副作用」の項に肺塞栓症、深部静脈血栓症を追記し、注意喚起を図ることとなった。(2010年3月追記)

(2) 腎機能障害患者

設定されていない

(3) 肝機能障害患者

9.3 肝機能障害患者

肝機能障害を悪化させるおそれがある。

<解説>

フェノチアジン系薬物による胆汁うっ滞を伴うびまん性肝炎(臨床症状として閉塞性黄疸)あるいは慢性肝障害の発現が報告されている。

(4) 生殖能を有する者

設定されていない

(5) 妊婦

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、投与しないことが望ましい。動物試験(マウス、ラット)で、催奇形作用(口蓋裂の増加)が報告されている¹⁵⁾。また、妊娠後期に抗精神病薬が投与されている場合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戦、筋緊張低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状があらわれたとの報告がある。

(6) 授乳婦

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。ヒトで母乳中へ移行することが報告されている(外国人データ)。

<解説>

フェノチアジン系化合物は乳汁中に移行するので、乳児に眠気を起こす可能性があり、また、ジストニアや遅発性ジスキネジアの危険性が増大する。ほとんどのフェノチアジン系化合物は母親のプロラクチン分泌を増加させる⁴⁾。

(7) 小児等

9.7 小児等

- 9.7.1 幼児、小児では錐体外路症状、特にジスキネジアが起こりやすい¹⁶⁾。
- 9.7.2 通常、小児には 0.1 mg/kg を筋肉内注射する。
- 9.7.3 生後 6 カ月未満の乳児への使用は避けることが望ましい。

(8) 高齢者

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。起立性低血圧、錐体外路症状、脱力感、運動失調、排泄障害等が起こりやすい。

<解説>

高齢者では体重、体内総水分量、アルブミンの減少等により血漿中濃度が上昇する傾向がある。したがって、初期投与量を減量し、徐々に增量する必要がある。

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

10.1 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アドレナリン (アナフィラキシーの救急治療、又は歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く) ボスマシン [2.3 参照]	アドレナリンの作用を逆転させ、血圧降下を起こすことがある。	アドレナリンはアドレナリン作動性α、β受容体の刺激剤であり、本剤のα受容体遮断作用により、β受容体刺激作用が優位となり、血圧低下作用が増強される ¹⁷⁾ 。

<解説>

アドレナリンはα及びβアドレナリン作動性を有する。本剤はαアドレナリン作動性のみを遮断するので、β作動性はそのまま残るため血管拡張作用のみが顕著となり低血圧が発現する。

(2) 併用注意とその理由

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤 (バルビツール酸誘導体、麻酔剤等)	睡眠(催眠)・精神機能抑制の増強・麻酔効果の増強・延長、血圧低下等を起こすことがあるので、減量するなど慎重に投与すること。 なお、バルビツール酸誘導体等の抗痙攣作用は、フェノチアジン系薬剤との併用によっても増強されることはないので、この場合抗痙攣剤は減量してはならない。	相互に中枢神経抑制作用を増強させることがある。
降圧剤	起立性低血圧等を起こすがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	相互に降圧作用を増強させることがある。
アトロピング様作用を有する薬剤	口渴、眼圧上昇、排尿障害、頻脈、腸管痙攣等を起こすがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	相互にアトロピング様作用を増強させることがある。
アルコール (飲酒)	眠気、精神運動機能低下等を起こすことがある。	相互に中枢神経抑制作用を増強させることがある。
ドンペリドン メトクロプラミド	内分泌機能調節異常又は錐体外路症状が発現するおそれがある。	ともに中枢ドパミン受容体遮断作用を有する。
リチウム	心電図変化、重症の錐体外路症状、持続性のジスキネジア、突発性の Syndrome malin (悪性症候群)、非可逆性の脳障害を起こすおそれがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。	機序は不明であるが、併用による抗ドパミン作用の増強等が考えられている。
ドパミン作動薬 (レボドバ製剤、プロモクリプチンメシル酸塩)	相互に作用を減弱があるので、投与量を調節するなど慎重に投与すること。	ドパミン作動性神経において、作用が拮抗することによる。
有機燐殺虫剤	縮瞳、徐脈等の症状があらわることがあるので、接触しないように注意すること。	本剤は有機燐殺虫剤の抗コリンエステラーゼ作用を増強し毒性を強めることがある。
アドレナリン含有歯科麻酔剤 リドカイン・アドレナリン	血圧低下を起こすことがある。	アドレナリンはアドレナリン作動性 α 、 β -受容体の刺激剤であり、本剤の α -受容体遮断作用により、 β -受容体刺激作用が優位となり、血圧低下作用が増強されるおそれがある。

<解説>

- ① バルビツール酸誘導体：相互に中枢神経抑制作用が増強され、睡眠の延長と低血圧、眼気、精神機能の抑制等が増強される。長期併用は相互に代謝酵素を誘導するので、相互に作用が減弱される。
- ② 麻酔剤：相互に中枢抑制作用が増強され、重篤な血圧低下、循環障害が生じることがある。ほかに電解質異常、高熱、呼吸抑制を起こすことがある¹⁸⁾。
- ③ 降圧剤：本剤は交感神経遮断作用、血管拡張作用を有し、心機能に対して抑制的に作用するため、血圧降下作用を増強して、重篤な起立性低血圧を起こすことがある。
- ④ アトロピン様作用を有する薬剤：本剤も抗コリン作用を有するため、口渴、かすみ目、眼圧上昇（緑内障の悪化）、排尿障害、頻脈、腸管痙攣、散瞳等の作用が増強される¹⁹⁾。
- ⑤ アルコール：本剤はエタノールの存在下で、肝臓のCYPによる代謝が抑制される。このため本剤の中枢神経抑制作用が増強され、種々の精神運動機能（判断力、集中性、協調運動や複雑な機械操作能力等）の低下、更に過鎮静、低血圧、低体温を起こすことがある。
- ⑥ ドンペリドン、メトクロプラミド：ドンペリドン又はメトクロプラミドとの併用により、手指振戦、筋硬直等の錐体外路症状やプロラクチン分泌亢進による乳汁分泌、無月経等の内分泌機能調節異常が発現しやすくなることがある。
発現機序は、本剤及びドンペリドン、メトクロプラミドが共に線条体や下垂体のドパミン受容体遮断作用を有するためと考えられている。
- ⑦ リチウム：発現機序は不明であり、プロクロルペラジン等のフェノチアジン系薬剤とリチウムの併用により、心電図変化、重症の錐体外路症状、持続性のジスキネジア、突然性のSyndrome malin（悪性症候群）、非可逆性の脳障害を起こすとの報告がある。
- ⑧ ドパミン作用薬：共にドパミン受容体(D₂)に作用するため、本剤とドパミン作動薬の併用は相互に作用を減弱することがある。
- ⑨ 有機燐殺虫剤：フェノチアジン系化合物は有機燐殺虫剤の抗コリンエステラーゼ作用を増強し、その毒性を強める。食欲不振、発汗、流涎、吐気、嘔吐、腹痛、下痢、倦怠感、頭痛、めまい等の症状があらわれることがある。

8. 副作用

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(1) 重大な副作用と初期症状

11.1 重大な副作用

11.1.1 Syndrome malin (悪性症候群)(頻度不明)

無動緘默、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理と共に適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血清 CK (CPK) の上昇がみられることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎障害へと移行し、死亡した例が報告されている。[9.1.7 参照]

11.1.2 突然死(頻度不明)

血圧低下、心電図異常(QT 間隔の延長、T 波の平低化や逆転、二峰性 T 波ないし U 波の出現等)に続く突然死が報告されているので、特に QT 部分に変化があれば投与を中止すること。また、フェノチアジン系化合物投与中の心電図異常は、大量投与されていた例に多いとの報告がある。

11.1.3 再生不良性貧血、無顆粒球症、白血球減少(頻度不明)

[9.1.2 参照]

11.1.4 麻痺性イレウス(0.1%未満)

腸管麻痺(食欲不振、恶心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうつ滞等)を来し、麻痺性イレウスに移行することがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止すること。なお、この恶心・嘔吐は、本剤の制吐作用により不顕性化することもあるので注意すること。[8.2 参照]

11.1.5 遅発性ジスキネジア(0.1～5%未満)

長期投与により、口周部等の不随意運動があらわれ、投与中止後も持続することがある。

11.1.6 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(0.1%未満)

低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと^{20, 21)}。

11.1.7 眼障害(頻度不明)

長期又は大量投与により、角膜・水晶体の混濁、網膜・角膜の色素沈着があらわれることがある。

11.1.8 SLE 様症状(頻度不明)

11.1.9 肺塞栓症、深部静脈血栓症(頻度不明)

肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸痛、四肢の疼痛、浮腫等が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。[9.1.8 参照]

<解説>

11.1.1 Syndrome malin (悪性症候群)²²⁾

発生原因：不明な点が多いが、ドパミン受容体遮断作用による視床下部、基底核、脳幹機能のドパミン作動性の急激な低下によるとの説がある。

処置方法：投与を即時中止する。(ただし、併用している抗パーキンソン病薬は、症状が悪化するので急に中断しない。)補液、気道確保、体温冷却、ドパミン作動薬のプロモクリップチル酸塩と末梢筋弛緩薬であるダントロレンナトリウム等を投与する。

11.1.4 腸管麻痺²²⁾

発生原因：抗コリン作用による腸管の蠕動や分泌の低下による。

処置方法：投与を中止し、浣腸、ガス排泄、腹部の温あん、ネオスチグミンメチル硫酸塩の筋肉内注射等を行う。

注意：フェノチアジン系薬剤を投与中の急性腸管麻痺又は腸閉塞による死亡例の報告がある。腹痛、胃痛、腹部膨満感等の腹部症状にも注意が必要である。

(2) その他の副作用

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症			過敏症状、光線過敏症
錐体外路症状 ^{注)}			パーキンソン症候群(手指振戦、筋強剛、流涎等)、ジスキネジア(口周部、四肢等の不随意運動等)、ジストニア(眼球上転、眼瞼痙攣、舌突出、痉性斜頸、頸後屈、体幹側屈、後弓反張、強迫開口等)、アカシジア(静坐不能)
血液			白血球減少症、顆粒球減少症、血小板減少性紫斑病
肝臓		肝障害	
循環器			血圧低下、頻脈、不整脈、心疾患の悪化
消化器			食欲亢進、食欲不振、舌苔、恶心・嘔吐、下痢、便秘
眼			縮瞳、眼圧亢進、視覚障害
内分泌系	体重増加、女性化乳房、乳汁分泌、射精不能、月経異常、糖尿		
精神神経系			錯乱、不眠、眩暈、頭痛、不安、興奮、易刺激
その他			口渴、鼻閉、倦怠感、発熱、浮腫、尿閉、無尿、頻尿、尿失禁、皮膚の色素沈着

注) 錐体外路症状が強い場合には、抗パーキンソン剤を投与するなど適切な処置を行うこと。

<解説>

①過敏症又は光線過敏症²²⁾

発生原因：アレルギー反応による。(光感作が関連していると考えられる。)

処置方法：投与を中止する。

②顆粒球減少症²²⁾

発生原因：アレルギー反応によるものと考えられる。投与後3～8週に発症のピークがある)

処置方法：投与を中止することにより治癒する例が多い。

③肝障害²²⁾

発生原因：一種のアレルギー反応によるものと考えられる。投与後2～4週間以内に起こる。

処置方法：投与を中止し、肝庇護薬を投与することにより2～3週間で消失する。

④血圧低下²²⁾

発生原因：抗ノルアドレナリン作用による。

処置方法：投与初期の起立性低血圧は投与継続により程度は軽くなる。投与後30分程度臥床させることで予防可能である。重篤な低血圧を生じたらショック体位をとらせ、頭を低く、下肢を高くする。昇圧剤を用いる場合にはノルアドレナリンを用いる。(アドレナリンは作用を逆転させことがある。)

⑤ジストニア^{16, 23, 24)}

発生原因：ドパミン受容体遮断作用による。治療開始後2～3日に最も出現しやすく48時間syndromeともよばれる。小児、高齢者では起こりやすい。特に嘔吐、食欲不振による脱水症を伴う場合は発現しやすいので注意が必要である。メトクロラミドとの併用により錐体外路症状が発現しやすくなるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること。

臨床症状：眼球がひきつる、視線が固定する、舌が自然に突出する、顎が動かない、首が曲がる、体がねじれる、背中が反りかえる、手足の痙攣等が発現する。

処置方法：抗パーキンソン薬(プロメタジン塩酸塩、乳酸ビペリデン等の抗コリン薬)の筋肉内注射により短時間で改善する。

⑥縮瞳、眼圧亢進、視覚障害²²⁾

発生原因：抗コリン作用及び抗ノルアドレナリン作用による。

処置方法：眼圧亢進は投与を中止する。視覚障害(かすみ目等)は一過性のものである。訴えの強い場合には減量する。

⑦女性化乳房、乳汁分泌、射精不能、月経異常²²⁾

発生原因：ドパミン受容体遮断作用によりプロラクチン分泌が増加する。

処置方法：薬剤を変更又は減量する。

⑧興奮、易刺激²²⁾

発生原因：抗コリン作用による。

処置方法：減量又は他剤に変更する。必要に応じて対症療法を行う。

9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

(参考)

(1) 尿検査

尿色調変化(紫赤～赤褐色)を起こすことがある²⁵⁾。

ビリルビンの偽陽性反応を起こすことがある^{4, 26)}。

(2) 生化学的検査

血清中尿酸値の上昇(排泄上昇)を起こすことがある²⁷⁾。

血中Na値の減少を起こすことがある(Clの排泄に伴うNaの喪失)²⁸⁾。

(3) 免疫学的検査

免疫学的妊娠反応は偽陽性を起こすことがある^{4, 29)}

10. 過量投与

13. 過量投与

13.1 症状

傾眠から昏睡までの中枢神経系の抑制、血圧低下と錐体外路症状である。その他、激越と情緒不安、痙攣、口渴、腸閉塞、心電図変化及び不整脈等があらわれる可能性がある。

<解説>

13.1 [症 状]²²⁾

(1) 初期には、錯乱や失見当識を有する譫妄ないし興奮状態を示すが、次第に意識障害が進行し、昏睡に至る。痙攣、ジストニー様運動、痙攣等が神経症状として出現する。瞳孔は縮小し、深部反射は減弱する。また、脳波は汎性徐波と低電圧を示す。心循環系障害として、頻脈と著明な低血圧が主症状であるが、ときに不整脈が出現する。ショックの遷延や心停止は死の原因となる。

(2) 急性中毒症状の治療は対症療法であり、特異的な解毒剤はない。

[処 置]

- (1) 痙攣発作に対しては、ジアゼパム、フェニトインの静注でコントロール可能である。
- (2) 心電図によるモニタリングを行う。
- (3) 臨床症状や血液ガス分析により、必要があれば酸素吸入、人工呼吸を行う。
- (4) 低血圧に対しては、乳酸添加リンゲル液等の等張液やブドウ糖液の点滴静注を行うが、輸液のみで回復しない際には、ノルアドレナリンを加える。
- (5) 不整脈や循環不全が起きたらリドカイン、フィゾスチグミン(昇圧作用のないもの)を点滴中に加える。

11.適用上の注意

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

接触皮膚炎等の過敏症状を起こすことがあるので、直接の接触を極力避け、付着のおそれのあるときはよく洗浄すること。

14.2 薬剤投与時の注意

14.2.1 筋肉内注射時

筋肉内注射にあたっては、組織、神経等への影響を避けるため下記の点に注意すること。

- 同一部位への反復注射はなるべく行わないこと。また、低出生体重児、新生児、乳児、幼児、小児には特に注意すること。
- 神経走行部位を避けるよう注意すること。
- 注射針を刺入したとき、神経に当たったと思われるような激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合は、直ちに針を抜き、部位をかえて注射すること。
- 筋肉内注射により、局所の疼痛、発赤、発熱、腫脹、壊死、化膿、硬結等がみられることがある。

14.2.2 投与速度

起立性低血圧があらわれることがあるので、注射方法について十分注意し、その注射速度はできるだけ遅くすること。

12. その他の注意

(1) 臨床使用に基づく情報

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。

15.1.2 外国で実施された認知症に関連した精神病症状(承認外効能・効果)を有する高齢患者を対象とした 17 の臨床試験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群と比較して死亡率が 1.6 ~ 1.7 倍高かったとの報告がある。また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報告がある。

(2) 非臨床試験に基づく情報

設定されていない

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」の項参照

(2) 安全性薬理試験

抗コリン作用 (*in vitro*) ³⁰⁾

表IX-1 アセチルコリンによる摘出回腸の収縮の抑制

薬剤	IC ₅₀ (g/mL)
プロクロルペラジン	3.84 × 10 ⁻⁶
クロルプロマジン	0.95 × 10 ⁻⁶

IC₅₀ : 50%阻害濃度 (Hartley 系雄性白色モルモット)

表IX-2 アセチルコリン受容体への親和性

薬剤	Ki (nmol/L)
プロクロルペラジン	390
クロルプロマジン	81

(Wistar 系雄性ラット大脳皮質)

(3) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

表IX-3 急性毒性試験 ³¹⁾

(LD₅₀ mg/kg)

動物種	薬剤	投与経路	
		静脈内	皮下
マウス	プロクロルペラジン	90	400
	クロルプロマジン	75	300

(2) 反復投与毒性試験

慢性毒性試験(ラット、イヌ)

ラット及びイヌに 10, 30, 50 mg/kg/日を 4 週間経口投与した試験では、全般的に耐薬性は非常に良好で、肝腎機能及びその実質組織に変化は認められなかった ³¹⁾。

(3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

(4) がん原性試験

該当資料なし

(5) 生殖発生毒性試験

(参考：マウス等)

マウス、ラット及びウサギを用いた試験において、マウスでは 50 mg/kg/日の経口投与、また、ラットでは 70 mg/kg/日の経口投与で催奇形作用(口蓋裂)が報告されている¹⁵⁾。

(6) 局所刺激性試験

該当資料なし

(7) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的項目に関する事項

1. 規制区分

製 剤：ノバミン筋注 5 mg 処方箋医薬品^{注1)}

注 1) 注意—医師等の処方箋により使用すること

有効成分：プロクロルペラジンメシル酸塩 該当しない

2. 有効期間

4 年

3. 包装状態での貯法

室温保存

4. 取扱い上の注意

20. 取扱い上の注意

光により分解変色する。着色の認められるものは使用しないこと。

5. 患者向け資料

患者向医薬品ガイド：有り
くすりのしおり：有り

6. 同一成分・同効薬

同一成分薬：なし
同 効 薬：クロルプロマジン塩酸塩、レボメプロマジン塩酸塩等

7. 国際誕生年月日

不明

8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

表X-1 承認年月日及び承認番号

履歴	製造販売承認 年月日	承認番号	薬価基準収載 年月日	販売開始 年月日
旧販売名 ^{注)} ノバミン注	1958年12月18日	13327KUZ11220001	1959年10月1日	1959年3月
販売名変更 ノバミン筋注 5mg	2006年8月17日 (代替新規承認)	21800AMX10788	2006年12月8日	〃
製造販売承認承継	〃	〃	〃	2018年4月

注) 経過措置期間終了 2007年8月31日

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

一部変更承認年月日：1992年11月10日

再評価結果に伴う効能又は効果、用法及び用量の一部変更

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

再評価結果公表年月日：1973年11月21日

11. 再審査期間

再審査は実施されていない

12. 投薬期間制限に関する情報

該当しない

13. 各種コード

表X-2 各種コード

販売名	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJ コード)	HOT (9桁)番号	レセプト電算処理 システム用コード
ノバミン筋注 5mg	1172404A1037	1172404A1037	101329002	620004718

14. 保険給付上の注意

該当しない

X I . 文献

1. 引用文献

- 1) 日本薬局方外医薬品規格. 2002. 日本公定書協会. 東京. pp. 557-558 (D-000299)
- 2) Newton, D. W. et al. : Drug Intell. Clin. Pharm. 1978 ; 12 : 546-554 (D-000014)
- 3) 福嶋鶴行ほか : 注射剤の配合変化第二版. エフ・コピント・富士書院. 札幌. 2002 ; pp. 141-146 (D-000300)
- 4) USP DI ; Vol. I , Drug Information for the Health Care Professional. 27th ed. 2007 ; pp. 2351-2373. Thomson Micromedex. Greenwood Village (D-000050)
- 5) Isah, A. O. et al. : Age and Ageing. 1992 ; 21 : 27-31 (PMID : 1553856) (D-000048)
- 6) Hessell, P. G. et al. : Inter. J. Pharmaceut. 1989 ; 52 : 159-164 (D-000047)
- 7) Martindale ; The complete drug reference. 33rd ed. (Sweetman, S. C. et al. ed.), 2002 ; pp. 660-667. 701-702. Pharmaceutical Press. London (D-000046)
- 8) 佐藤喜一郎 : 神経精神薬理. 1984 ; 6 (8) : 507-515 (D-000061)
- 9) 須崎紳一郎 : 治療. 1983 ; 65 (3) : 647-655 (D-000003)
- 10) 白石弘巳ほか : 精神医学. 1992 ; 34 (6) : 627-635 (D-000056)
- 11) 伊藤 斎ほか : 臨床精神医学. 1976 ; 5 (9) : 1157-1170 (D-000055)
- 12) 丸橋達也ほか : Therapeutic Research. 2004 ; 25 (6) : 1227-1230 (D-000013)
- 13) 浜中聰子ほか : 日本救急医学会雑誌. 2003 ; 14 : 688 (D-000012)
- 14) 上條吉人ほか : 日本臨床救急医学会雑誌. 2000 ; 3 : 173 (D-000011)
- 15) Szabo, K. T. et al. : Lancet. 1974 ; 1 (7857) : 565 (PMID : 4132006) (D-000051)
- 16) 志村稔美, 他 : 小児科診療. 1978 ; 41 (7) : 914-918 (D-000052)
- 17) Martin, W. R. et al. : J. Pharmacol. Exp. Ther. 1960 ; 130 : 37-45 (PMID : 14421747) (D-000114)
- 18) Gold, M. I. : Anesth. Analg. (N.Y.) . 1974 ; 53 (6) : 844-848 (PMID : 4473925) (D-000113)
- 19) Warnes, H. et al. : Can. Med. Assoc. J. 1967 ; 96 (15) : 1112-1113 (PMID : 6021058) (D-000010)
- 20) Matuk, F. et al. : Arch. Neurol. 1977 ; 34 (6) : 374-375 (PMID : 860939) (D-000009)
- 21) 山本節 : 精神医学. 1981 ; 23 (8) : 827-828 (D-000054)
- 22) 上島国利ほか : 精神科治療学. 1991 ; 6 (6) 655-665 (D-000053)
- 23) 木谷信行 : 小児科臨床. 1972 ; 25 (9) : 1217-1220 (D-000008)
- 24) 前川喜平 : 治療. 1975 ; 57 (2) : 595-602 (D-000007)
- 25) 林 康之 : 臨床検査 MOOK. 1982 ; 10 : 1-7 (D-000049)
- 26) 林 康之 : 臨床医. 1987 ; 13 (10) : 2014-2017 (D-000112)
- 27) 村井哲夫 : 薬局. 1993 ; 44 (7) : 993-997 (D-000002)
- 28) 村井哲夫 : 薬局. 1993 ; 44 (6) : 821-825 (D-000001)
- 29) 高木繁夫ほか : Medicina 臨時増刊号. 1984 ; 21 (12) : 2118-2119 (D-000111)
- 30) 塩見輝雄, 他 : 薬理と治療. 1984 ; 12 (10) : 4419-4441 (D-000006)

31) Courvoisier, M. S. et al. : C. R. Soc. Biol. 1957 ; 151 (6) : 1144-1148 (PMID : 13511848)
(D-000057)

2. その他の参考文献

該当資料なし

X II. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

カナダ、ニュージーランド等

Index Nominum : International Drug Directory, 20th ed.,(pharma Swiss ed.),
2011, pp. 1529–1530, Medpharm, Stuttgart

注) 外国では、ライセンス関係のない企業が販売している。

2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

X III. 備考

1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

(1) 粉砕

該当しない

(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

該当しない

2. その他の関連資料

該当資料なし

® : 登録商標