

ウゴービ®皮下注 0.25mg SD 1.7mg SD
0.5mg SD 2.4mg SD
1.0mg SD

ご使用に関するお願い



ウゴービ®は新たに承認された「肥満症」治療薬です。

- 「肥満症」治療以外の目的(美容・痩身・ダイエットなど)で使用しないでください。主治医の指示に従って、正しく安全にご使用ください。
- 主治医の指示に従い、食事・運動などの生活習慣の改善を継続した上で本剤を使用してください。



2型糖尿病の治療に、以下のいずれかのお薬を使用していませんか？

ウゴービ®はGLP-1受容体作動薬であるセマグルチドを含有しており、他のセマグルチド含有製剤あるいはその他のGLP-1受容体作動薬、GIP/GLP-1受容体作動薬とは併用できません。以下の薬剤を使用していないことをご確認ください。

ウゴービ®以外のGLP-1受容体作動薬等(2型糖尿病治療薬)

一般名	製品名
チルゼパチド	マンジャロ®皮下注 2.5mg/5mg/7.5mg/10mg/12.5mg/15mgアテオス®
セマグルチド	リベルサス®錠3mg/7mg/14mg*
セマグルチド	オゼンピック®皮下注0.25mg SD/0.5mg SD/1.0mg SD/2mg
インスリン グラルギン/ リキシセナチド配合製剤	ソリクア®配合注ソロスター®
インスリン デグルデク/リラグルチド	ゾルトファイ®配合注フレックスタッチ®
デュラグルチド	トルリシティ®皮下注0.75mgアテオス®
リキシセナチド	リクスミア®皮下注300μg
エキセナチド	バイエッタ®皮下注5μgペン300、10μgペン300
リラグルチド	ビクトーザ®皮下注18mg

*は飲み薬、その他はすべて注射薬

※発売順(2024年3月現在)

上記の製品を使用している場合は、主治医やかかりつけ薬局の薬剤師にご相談ください。

3

オゼンピック®と間違えないようご注意ください。

ウゴービ®と2型糖尿病治療薬のオゼンピック®には、同じ形状の注入器があります。製品名及び注入器の色を確認し、ウゴービ®であることを確認してください。ウゴービ®の注入器は白色、オゼンピック®の注入器は薄い青色もしくは青色です。



4

正しい用量を投与するようご注意ください。

ウゴービ®には5種類(0.25mg、0.5mg、1.0mg、1.7mg、2.4mg)あります。注入器にはそれぞれ週1回投与分の薬液があらかじめ充填されています。

主治医に指示された用量の注入器であるかをご確認ください。

2本以上組み合わせて使用しないでください。

ウゴービ®の投与について

ウゴービ®は1週間に1回投与の皮下注射剤です。

週1回0.25mgから投与を開始し、その後は4週間の間隔で、週1回0.5mg、1.0mg、1.7mg及び2.4mgの順に増量し、以降は2.4mgを週1回皮下注射します。

ウゴービ®は、毎週同じ曜日に投与してください。

ウゴービ®皮下注 0.25mg SD/0.5mg SD/1.0mg SD/1.7mg SD/2.4mg SD(週1回投与)



お薬を正しく安全に使用するために、お薬手帳を利用しましょう
不明点は、主治医やかかりつけ薬局の薬剤師にお問い合わせください