

別紙 1

【薬効分類】 2 1 9 その他の循環器官用薬

【医薬品名】 セレキシパグ

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

【「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」（平成29年6月8日付け薬生発0608第1号局長通知）に基づく改訂（新記載要領）】

下線は変更箇所

現行			改訂案
2. 禁忌 <u>クロピドグレル含有製剤を投与中の患者</u>			2. 禁忌 (削除)
10. 相互作用			10. 相互作用 (削除)
10.1 併用禁忌			
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
<u>クロピドグレル含有製剤</u>	<u>本剤の活性代謝物の血中濃度が上昇するおそれがある。</u>	<u>CYP2C8を阻害することにより、本剤の活性代謝物の代謝が抑制されると考えられる。</u>	
10.2 併用注意			10.2 併用注意

(新設)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<u>CYP2C8の阻害作用を有する薬剤（クロピドグレル含有製剤、デフェラシロクス等）</u>	<u>クロピドグレルとの併用で、本剤の活性代謝物のC_{max}及びAUCが増加したとの報告がある。</u> <u>本剤の投与中にこれらの薬剤を開始する場合には、本剤の減量を考慮すること。これらの薬剤の投与中に本剤を開始する場合には、本剤を1日1回に減量して投与を開始すること。</u>	<u>CYP2C8を阻害することにより、本剤の活性代謝物の代謝が抑制されると考えられる。</u>