

NO.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	備考
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	女 10歳未満	百日せき, ジフテリア, 破傷風の予防 (なし)	0.5mL 1回	<b>急性脳症</b> 接種日 : 本剤接種(I期追加)。 接種3日後 : 眼球固定し, 意識消失する発作1分未満。 接種5日後 : 同様の発作。 接種7日後 : 同様の発作, この日から発作間欠期も元気なくなり, 発語なくなる。意識変容と考えられる。 接種11日後 : 同様の発作数回みられた。発作時の脳波で $\theta$ 波burst認めた。 入院となる。臨床的には無症状。 検査結果: 髄液細胞数 3/3。 血中抗体 PT 3EU/mL, FHA 89EU/mL。 髄液抗体 PT < 1EU/mL, FHA < 1EU/mL。 入眠時の脳波 $\theta$ 波左右差あり。 頭部CT, 頭部MRIともに異常所見なし。 接種21日後 : 軽快。	企業報告
併用薬: なし					

NO.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	備考
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
2	男 1歳未満	百日せき,ジフテリア,破傷風の予防 (なし)	0.5mL 1回	<b>けいれん重積,発熱</b> 接種日:午前中本剤を接種。 夕方より38 台の発熱。 接種1日後:熱40 に上昇。 セフジトレンピボキシル,アセトアミノフェン処方され様子を見ていた。 けいれん出現。 (全身性間代性けいれん) 救急車で来院。来院時けいれん持続。 ライン確保後,ジアゼパム3mg(iv)×2回 にもけいれん持続するため,フェニトインナトリウム約25mg(iv)にて消失。 接種7日後:軽快退院。	企業報告
併用薬:なし					