

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用		備考
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置		
1	女 70代	右膝痛 (甲状腺機能亢 進症, 間質性肺 炎, 右膝痛)	7.5g 119日間	<b>間質性肺炎</b> 投与約16年前 大動脈弁狭窄症のため, 当科に通院中であつた。 投与約3年前 肺の線維化を認めたが, 右下葉の一部に限局していた。 投与開始日 右膝痛にて, 本剤投与開始。 投与110日目 37.4 までの体温上昇と乾性咳, HJ IV~Vの労作時呼吸困難が出現するようになった。 投与119日目 (投与中止日) 当科外来を受診して, 右上下肺野を中心に新たに広範なスリガラス様陰影が出現していたため, 同日緊急入院した。 胸部所見, CRP上昇, 微熱等から, 非定型肺炎も否定できなかったため, クラリスロマイシンを投与し本剤を中止し, 安静にして経過観察したところ, 症状は軽快した。 中止42日後 退院。外来で経過観察中である。 中止50日後 症状の悪化は認めていない。		企業報告

### 臨床検査値

	投与前	投与55日目	投与119日目 (投与中止日)	中止29日後	中止50日後
白血球数 (/mm <sup>3</sup> )	4100	4000	5800	4400	4700
好酸球 (%)	0.3	0.2	8.0	2.4	0.7
LDH (IU/L)	193	209	243	208	

### 血液ガス

	投与119日目 (投与中止日)	中止9日後	中止29日後
pH	7.432	7.436	7.405
PaO <sub>2</sub> (torr)	70.1	69.2	84.6
PaCO <sub>2</sub> (torr)	37.9	38.2	40.1

### 免疫血清検査

	投与119日目 (投与中止日)	中止1日後
RAテスト	陰性	
抗核抗体		陽性
補体CH50		49

### DLST (S.I.)

	中止10日後
本剤	523%

併用薬: チアマゾール, 塩酸ジルチアゼム, エチゾラム