

| No. | 患者 | | 1日投与量 投与期間 | 副作用 |
|--|----------|--|-----------------|---|
| | 性・ 年齢 | 使用理由 (合併症) | | 経過及び処置 |
| 1 | 女 70代 | 心身症 (糖尿病, 高血圧, 慢性 膵炎, 萎縮性胃 炎, 高脂血症, 便秘, 背部痛, 食欲不振) | 7.5mg 1年26日間 | 一過性前向性健忘 投与開始日 心労のため不眠を訴え本剤7.5mg屯服不眠時処方開始(実際 使用量3.75~7.5mg/回)。 投与132日目 屯服から, 7.5mg眠前処方へ変更。このころから毎日7.5mg服 用。食事が心労により減少しており, 医師より食事をとるよ うに言われる。 投与約5ヵ月目 この間に, 本剤を服用すると悪夢もしくは知らない間に夜中食 事をすることがあり, 投与約1年1ヵ月目には本剤を服用する と必ずこの症状が出るようになる。 投与1年11日目 本剤服用せずに, 床についてみると眠れる。また, 悪夢も夜間 の食事も見られない。アルコール2回/週 数回試してみるが, 服用しなければ症状なし。 投与1年26日目 本剤処方中止となる。 (投与中止日) 中止1ヵ月後 本剤全面的に中止すると症状出ない。 |
| 併用薬: ベシル酸アムロジピン, プラバスタチンナトリウム, センノシド, オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤, テプレノン, 塩酸チ ザニジン | | | | |

| No. | 患者 | | 1日投与量 投与期間 | 副作用 |
|---|----------|--|---------------|---|
| | 性・ 年齢 | 使用理由 (合併症) | | 経過及び処置 |
| 2 | 男 80代 | 不眠症 (関節リウマチ, 帯状 疱疹, 低血圧, 便秘, 尿失禁) | 7.5mg 1日間 | 失禁, 夜間夢遊, 記憶欠損 投与日 不眠に対して本剤7.5mg投与後, もうろうとして以下の記憶がない。 投与3時間後 ぬれた下着を脱いでいる。 投与6時間後 トイレ歩行。 投与9時間後 夜間うろろしていて, 失禁していたらしいが自分でははっきりした記憶がない。 |
| 併用薬: スリンダク, 牛車腎気丸, コバマミド, ヌクレオシド・スプリフェン塩酸塩, メシル酸ジヒドロエルゴタミン, パンテチン, 酸化マグネシウム, 塩酸オキシブチニン, センノシド, アシクロビル | | | | |