

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
2	女 70代	脳梗塞 (胸部解離性動脈 瘤)	6.9mg (0.17mg/kg) 1回	<p>大動脈瘤破裂 脳梗塞発症。 発症50分後</p> <p>CT, MRI検査実施。 Early CT signなし, 出血なし, 浮腫なし。 責任病巣: 右内頸動脈穿通枝及び皮質枝領域 梗塞巣の大きさ: 中・大(実測1.5cmを超える) 意識障害レベル: JCS2</p> <p>発症1時間30分後 NIHSS12。 測定時刻不明 本剤投与前血圧134/73mmHg(臥位)。 発症1時間42分後 本剤静脈内投与開始(投与所要時間12分)。 発症1時間55分後 投与13分後に状態悪化(血圧95/52mmHg, 脈拍数68/分)のため, 本剤 投与中止(総投与量6.9mg)。 発症1時間57分後 中止2分後に意識障害が出現し, ショック状態となる。 発症2時間10分後 胸部CT検査を行ったところ, 心タンポナーデ, 胸部解離性動脈瘤と判 明。 発症2時間35分後 心肺停止となったため, 心臓マッサージ実施。 発症3時間11分後 死亡確認。 死因: 大動脈瘤破裂</p>

臨床検査値

	投与開始前	発症1時間55分後	発症1時間57分後	発症2時間35分後
収縮期血圧(mmHg)	134	95	50台	0
拡張期血圧(mmHg)	73	52	—	—
脈拍数(/分)	—	68	—	—

併用薬: エダラボン