

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
1	男 60代	皮疹 (高血圧)	7.5 g 11日間	間質性肺炎 投与開始日 頭部の皮疹に対し本剤投与開始。 投与11日目 本剤投与終了。 (投与終了日) 終了8日後 発熱。 終了11日後 当科入院。胸部CTにて左肺はほぼ全般、右肺にも一部スリガラス影出現。ARDS、重症肺炎の診断のもと、ステロイドパルス、メロペネム水和物及びミノサイクリン塩酸塩投与開始。 終了13日後 胸部X線上、スリガラス影はほぼ完全に消失。 終了14日後 ステロイドパルス終了。 終了15日後 メロペネム水和物投与終了。 終了19日後 ミノサイクリン塩酸塩投与終了。 終了24日後 軽快退院。 症状改善後、肺炎の原因追求のため気管支鏡を勧めたが、同意が得られなかった。

臨床症状

	終了11日後	終了24日後
発熱	高度	なし
痰	なし	なし
咳	軽度	なし
息切れ (HJ 分類)	III	I

臨床検査値

	終了11日後	終了12日後	終了15日後
白血球数 (/mm ³)	6300	4890	9410
LDH (IU/L)	249	223	196
KL-6 (U/mL)	—	342	—
SP-D (ng/mL)	—	215.3	—
CRP (mg/dL)	7.1	8.4	0.7

免疫血清検査

	終了11日後
抗核抗体	陰性
クラミジア	陰性

DLST

	終了35日後
本剤	陽性

血液ガス

	終了11日後	終了12日後
pH	7.46	7.451
PaO ₂ (torr)	47.7	80.6
PaCO ₂ (torr)	37	38.8
HCO ₃ (mEq/L)	25.9	26.6

併用薬：ニフェジピン