

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	女 60代	インフルエンザ免疫 (なし)	0.5mL 1回	<b>アレルギー性肉芽腫性血管炎 (Churg-Strauss 症候群)</b>	
				気管支喘息あり。気管支喘息に対し吸入ステロイドを使用。 慢性好酸球性肺炎，慢性副鼻腔炎の既往あり。好酸球性肺炎は接種9年前から再発なし。 接種7ヵ月前より好酸球増多(10-20%)があったが症状はなかった。 花粉アレルギーあり。	
				接種18日前 季節性インフルエンザワクチン接種。	
				接種9日前 食欲不振あり。他の症状なし。	
				接種日 新型インフルエンザワクチン接種。	
				接種3日後 両下肢に紫斑，発赤出現。	
				接種4日後 両下肢の痺れ，疼痛，歩行困難。 好酸球は50%以上に増加。Churg-Strauss症候群の疑いあり。	
				接種5日後 精査加療目的で入院。	
				接種9日後 注射用メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 1000mg/日×3日間投与。	
				接種12日後 プレドニゾロン 60mg 内服開始。	
				接種41日後 プレドニゾロン 55mg へ減量。	
				接種48日後 プレドニゾロン 50mg へ減量。	
				接種62日後 プレドニゾロン 45mg へ減量。	
				接種76日後 プレドニゾロン 40mg へ減量。	
				Churg-Strauss症候群の転帰は後遺症あり(症状：末梢神経障害，多発性単神経炎)。	
<b>臨床検査値</b>					
	接種5日後	接種7日後	接種12日後	接種20日後	接種46日後
酸球(%)	54.5	56	0	0.5	0
白血球数(/mm <sup>3</sup> )	16170	15770	9960	7750	6910
血小板数(×10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup> )	21.3	19.6	29.4	34.5	20.6
CRP(mg/dL)	1.8	4.2	0.2	0.1	0.1
併用薬：ブデソニド，モンテルカストナトリウム					

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
2	女 60代	インフルエンザ免疫 (高血圧)	0.5mL 1回	<b>皮膚粘膜眼症候群</b>	
				接種日	本剤接種。
				接種1日後	左腋窩の腫脹疼痛。
				接種2日後	徐々に全身に発疹，40 前後の発熱，口腔内びらんを認めるようになり，増悪傾向。摂食不良，幻覚認める。
				接種4日後	A整形外科受診。オロパタジン塩酸塩，ジクロフェナクナトリウム処方されたが，症状変わらず。
				接種6日後	B内科受診。リケッチア感染症疑いで，検査したが陰性。一般生化学検査で，肝機能異常とCRP高値。39.6 の発熱，四肢軀幹に発疹。左上腕ワクチン注射部周囲に発赤・熱感あり。
				接種9日後	口腔内びらんがひどく，眼のチカチカした痛みもあり，食事もとれていないためC病院へ紹介入院。D皮膚科往診にて「皮膚粘膜眼症候群」と診断。 プレドニゾロン60mgから3日ごとに10mgずつ漸減（接種9日後～29日後まで）。 ・注射用スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム2g/日（接種9日後～14日後まで）。 ・グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩水和物20mL/日（接種9日後～23日後まで）。 ・ファモチジン注射液10mg/日（接種9日後～23日後まで）。
接種14日後	全身の発疹（多形滲出性紅斑）は軽減し，ほとんど消失。眼のチカチカした痛みも消失。肝機能障害は接種12日後の採血で改善。				
接種24日後	口腔内粘膜のびらん改善し，退院。				

**臨床検査値**

	接種6日後	接種9日後	接種12日後	接種15日後	接種23日後
白血球数 (/mm <sup>3</sup> )	11200	7050	9030	12010	9040
赤血球数 (×10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup> )	489	526	445	453	436
ヘマトクリット (%)	43.3	45.8	40	41.4	40.5
ヘモグロビン (g/dL)	14.7	15.9	13.3	13.6	13.1
血小板数 (×10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup> )	19.7	17.9	35	42.5	26.9
CRP (mg/dL)	14.39	10.91	2.54	0.75	0.12
AST (GOT) (IU/L)	52	48	23	18	11
ALT (GPT) (IU/L)	36	48	32	27	16
γ-GTP (IU/L)	37	—	—	—	—
LDH (IU/L)	246	279	180	187	113
総ビリルビン (mg/dL)	—	0.5	0.5	0.4	0.5
BUN (mg/dL)	16.1	22.9	13.6	20.2	18.4
クレアチニン (mg/dL)	0.69	0.9	0.6	0.6	0.7
Na (mEq/L)	130	132	141	143	141
K (mEq/L)	4.1	3.6	3.8	4.4	4.2
Cl (mEq/L)	94	95	98	104	103

併用薬：バルサルタン，シンバスタチン