

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用				
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置				
1	女 70代	多発性骨髄腫 (心房細動, 腰椎すべり 症,慢性腎不 全,洞不全症 候群,気管支 喘息,消化管 出血)	100mg 13日間	肺塞栓症				
				投与約1年7ヵ月前	多発性骨髄腫を発症。			
				投与約2ヵ月前	MP療法を実施(約1ヵ月間)。			
				投与開始日	本剤100mgの投与を開始。			
				投与11日目	DVT様症状が認められ,入院。			
				投与12日目	造影スキャンにてDVT,肺塞栓と診断。 ヘパリンナトリウムの投与を開始。			
				投与13日目 (投与中止日)	本剤の投与を中止。 アスピリン,ワルファリンカリウムの投与を開始。			
中止4日後	軽快。 ワルファリンカリウムによるコントロールが良好であるため,アスピリン,ヘパリンナトリウム治療を中止し,ワルファリンカリウムにて経過観察。							
臨床検査値								
			投与11日目	投与12日目	中止2日後	中止4日後	中止5日後	
			FDP (µg/mL)	44.3	—	14.3	—	12.6
			D-dimer (µg/mL)	22.75	16.53	6.21	6.5	8.7
併用薬:メルファラン,プレドニゾロン,スルファメトキサゾール・トリメトプリム,アンプロキシソール塩酸塩,モンテルカストナトリウム,エスタゾラム,センナ・センナ実,レバミピド,ラクトミン,沈降炭酸カルシウム,ニコランジル,アルファカルシドール,オメプラゾール,メコバラミン								

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
2	男 70代	多発性骨髄腫 (不安症候 群)	200mg 9日間	脳梗塞	
				投与約4ヵ月前	多発性骨髄腫と診断。MP(メルファラン10mg+プレドニゾロン30mg 4日間)療法を4週に1度実施。
				投与開始日	本剤200mg及びデキサメタゾン40mgの投与を開始。
				投与5日目	デキサメタゾンの投与を中止。
				投与9日目 (投与中止日)	譫妄状態が発現。本剤の投与を中止。
				中止4日後	MRIにて左前頭葉白質に脳梗塞を認める。
中止約1.5ヵ月	回復。				
併用薬:デキサメタゾン					

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用				
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置				
3	女 60代	多発性骨髄腫 (腰椎圧迫骨折)	50mg 7日間	薬剤性肺炎(間質性肺炎)				
				投与約1年5ヵ月前	多発性骨髄腫を発症。			
				投与開始日	本剤50mgの投与を開始。			
				投与5日目	倦怠感が出現。			
				投与7日目 (投与中止日)	高熱が出現し、患者が本剤の服用を中止。			
				中止1日後	呼吸困難が出現したため救急受診し緊急入院。 胸部CTにて全肺野に間質影(スリガラス影)を認める。 心不全徴候を認めず、間質性肺炎のマーカーも上昇したため間質性肺炎と診断。 入院後ステロイドパルス、BIPAP導入を行い救命、ステロイド後療法を施行。 ステロイドパルス中にDLST検査を実施し、検査結果は陽性。			
				中止16日後	酸素療法を中止し、ステロイドを減量。退院。			
中止34日後	軽快。							
臨床検査値								
			投与開始日	中止2日後	中止3日後	中止8日後	中止71日後	
			LDH (IU/L)	191	674	796	687	406
			KL6 (U/mL)	—	—	576	3221	—
併用薬: なし								

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
4	女 70代	多発性骨髄腫 (便秘, 高血圧症, 四肢しびれ, 糖尿病, 心不全)	100mg 22日間	心不全悪化	
				【既往歴】心不全, 2段脈	
				投与約1年10ヵ月前	多発性骨髄腫を発症。 MP療法を実施(約1年3ヵ月間)。
				投与約4ヵ月前	高用量デキサメタゾンの投与を実施(約2ヵ月間)。
				投与約3ヵ月前	ボルテゾミブ及びデキサメタゾンの投与を実施(約3ヵ月間)。
				投与開始日	本剤100mgの投与を開始(合併症として心不全あり)。
				投与13日目	四肢浮腫があり、レントゲン及び症状より心不全の悪化と判断。
				投与16日目	フロセミドの投与を開始。
				投与22日目 (投与中止日)	本剤の投与を中止。
				中止7日後	浮腫及び心不全治療のため入院加療。
中止87日後	軽快。				
併用薬: ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩, アスピリン, アムロジピンベシル酸塩, エナラプリルマレイン酸塩, タカヂアスターゼ・生薬配合剤, カルベジロール, ベンフォチアミン・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン配合剤, アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン, トコフェロールニコチン酸エステル, ボグリボース, セチリジン塩酸塩, クレマスチンフマル酸塩, 酸化マグネシウム, オキシコドン塩酸塩水和物, ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル					