

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	男 80代	便秘症 (なし)	7.5g 73日間	間質性肺炎	
				投与開始日	便秘症に対し本剤投与開始。
				投与 69 日目	発熱・低酸素血症，胸部X線で両肺びまん性の陰影あり。他科にて注射用スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム投与開始。
				投与73日目 (投与中止日)	抗生剤投与開始するも改善なく，当科受診。胸部CTでびまん性のスリガラス陰影あり。本剤投与中止。
				中止 3 日後	メチルプレドニゾロン1gパルス×3日間。 以降，呼吸状態，胸部X線での陰影改善。

臨床症状

	投与 69 日目	投与 73 日目 (投与中止日)	中止 3 日後	中止 5 日後	中止 9 日後
発熱	中等度	中等度	高度	なし	なし
痰	なし	なし	なし	なし	なし
咳	軽度	軽度	軽度	なし	なし
息切れ (HJ 分類)	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ

臨床検査値

	投与 69 日目	投与73日目 (投与中止日)	中止 9 日後	中止 1 6 日後
白血球数 (/mm ³)	7000	7600	9200	6500
LDH (IU/L)	181	—	190	184
CRP (mg/dL)	5.85	7.32	1.03	2.27
KL-6 (U/mL)	—	1170	1600	1580
SP-D (ng/mL)	—	260	382	208

BALF 所見

	中止 1 日後
総細胞数 (×10 ⁵ /mL)	4.6
マクロファージ (%)	22
リンパ球 (%)	73
好中球 (%)	4
好酸球 (%)	1
CD4/CD8 比	9.67

血液ガス

	中止 1 日後	中止 6 日後
pH	7.482	7.491
PaO ₂ (torr)	56	80
PaCO ₂ (torr)	34	33.1
HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	24.9	24.7

併用薬：センノシド，クロナゼパム，ピコスルファートナトリウム水和物，ハロペリドール，ランソプラゾール，シロドシン，ベタネコール塩化物，ジスチグミン臭化物，トラセミド，アンブロキシール塩酸塩