

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用			
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置			
1	女 70代	医学的観察： 早期中部食道癌 (結腸腺腫， 気管支喘息)	不明 (1回1 日間)	喘息重積発作			
				投与日 (投与終了日)	本剤にて院内製剤のルゴール液を調製し，ルゴール染色による食道癌の内視鏡検査を実施し終了。		
				終了30分後	咳が始めたのを契機に呼吸苦出現。SpO ₂ 80～82%，酸素マスク10L開始。		
				終了35分後	酸素吸入中，胸部背部の聴診にて喘鳴あり。既往歴に気管支喘息あり。喘息の発作を考え，電解質輸液（乳酸リンゲル液）500mL＋アミノフィリン注射液250mg，ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注300mg＋生理食塩水20mLを投与。SpO ₂ 79～80%，呼名に反応なし。チアノーゼ進み呼吸状態も悪化。		
				終了50分後	挿管		
				終了60分後	血圧105/82，脈拍116，右足背に電解質輸液（乳酸リンゲル液）500mL投与。嘔吐あり。吸引施行。SpO ₂ 98%		
				終了65分後	SpO ₂ 98%，手足動かし，呼名にうなづく。		
				終了90分後	プロポフォール注500mg 10mL投与。		
				終了1日後	抜管		
				終了7日後	退院		
臨床検査値							
			終了130分後	終了8時間後	終了1日後	終了2日後	終了6日後
	白血球数 (×10 ³ /μL)		15.1	10.5	9.5	6.8	5.8
	赤血球数 (×10 ⁴ /mm ³)		348	338	314	321	328
	ヘモグロビン (g/dL)		11.0	11.0	9.9	10.2	10.5
	ヘマトクリット (%)		34.4	33.3	31.4	32.1	31.7
	血小板数 (×10 ⁴ /μL)		20.4	20.3	16.8	16.2	17.5
併用薬：ヨウ化カリウム							