

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	女 70代	大腸内視鏡 検査 (心臓弁膜疾 患, 高血圧, 不整脈)	1L 1日間	意識消失 投与1日前 投与開始日	<p>ピコスルファートナトリウム水和物内服しているが反応はなく、当日の排便はなし。</p> <p>朝、ピコスルファートナトリウム水和物内服後の最終排便あり。本剤1L服用；服用中に排便あり。</p> <p>本剤1L服用後；意識消失。頸動脈触知不可。四肢冷感あり。血圧測定不可。</p> <p>ストレッチャー移動，ER室へ。</p> <p>意識消失15分後；開始液を500mL投与開始。血圧42/30mmHg, 心拍数40回台/分。</p> <p>開始液投与開始後3分；血圧72/40mmHg, 心拍数40回台/分。</p> <p>アトロピン硫酸塩水和物0.5mg投与。</p> <p>アトロピン硫酸塩水和物投与16分後；血圧97/51mmHg, 心拍数70回台/分, 意識レベル回復。経過観察。</p> <p>アトロピン硫酸塩水和物投与4時間7分後；血圧112/59mmHg, 心拍数64回/分。大腸内視鏡検査中止して帰宅した。</p>
併用薬：カルベジロール，テルミサルタン，オメプラゾール，ベラパミル塩酸塩					

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
2	女 70代	大腸内視鏡 検査 (高血圧, リウマチ性 障害)	1.2L 1日間	<p>意識消失</p> <p>投与開始日 大腸内視鏡検査のため、来院。 本剤1.2L+水0.6L服用中；排便あり。 排便後；意識消失。自発呼吸なし。 意識消失1分後；嘔吐し、自発呼吸回復。血圧118/56mmHg, SpO<sub>2</sub>；98%，心拍数54回/分。意識クリア。 意識消失3分後；乳酸リンゲル液（マルトース加）500mL投 与開始。車椅子にて、処置室へ移動（移動中吐き気、ふらつ き等の症状なし）。 意識消失15分後；血圧110/68mmHg, SpO<sub>2</sub>；95%，心拍数60 回/分。意識クリア。経過観察。 意識消失45分後；医師の問診に若干のふらつき残るも、返答 に問題なし。 意識消失90分後；看護師付き添いの元、トイレへ（血圧 120/58mmHg, 心拍数72回/分） 意識消失95分後；自宅安静と水分摂取を指示、家族付き添い の元、帰宅。</p>
併用薬：なし。				