

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用					
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置					
1	男 70代	特発性肺線維症 (なし)	300mg 35日間	<p>血小板減少, 呼吸不全, 肺胞出血 既往歴: 視床出血, 間質性肺疾患</p> <p>投与1日前 在宅酸素療法 (HOT) 導入のため入院。 投与開始日 本剤の投与開始。 投与14日目 肝機能軽度上昇 (非重篤) 発現。血小板軽度減少発現。 症状安定していたため退院。 投与35日目 (投与中止日) 喀血で緊急外来受診。呼吸苦, 血小板減少 (PLT: 7,000/μL) のため入院。 肺胞出血も認めステロイドパルス (メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 1,000mg/日, 投与35日目~37日目) 施行。 血小板輸血開始 (10単位)。非侵襲的陽圧換気療法 (NPPV) での呼吸管理を開始。 本剤投与中止。 投与中止1日後 血小板輸血 (10単位)。 投与中止2日後 血小板輸血 (10単位)。 投与中止3日後 呼吸器での挿管管理は希望されず, 肺胞出血による呼吸不全にて死亡。</p>					
臨床検査値									
	投与 1ヶ月前	投与 1日前	投与 7日目	投与 9日目	投与 13日目	投与 24日目	投与 35日目	投与中止 1日後	投与中止 2日後
T-bil (mg/dL)	0.48	0.51	0.46	0.56	0.55	0.33	0.85	-	1.10
AST (IU/L)	39	37	63	81	61	87	62	-	51
ALT (IU/L)	20	18	53	58	53	82	40	-	36
BUN (mg/dL)	14	11	12	-	11	14	12	-	25
Cre (mg/dL)	0.75	0.78	0.74	-	0.68	0.73	0.68	-	0.60
WBC (cells/ μ L)	8,700	6,900	6,100	-	5,700	6,300	11,300	12,900	10,900
Hb (g/dL)	14.9	15.1	14.5	-	13.9	14.7	12.6	11.0	10.0
PLT (x 10000cells/ μ L)	16.4	17.0	11.7	-	11.0	9.6	0.7	0.3	0.3
Fiblin D dimer (ng/mL)	-	-	-	-	-	-	2.18	-	1.88
併用薬: オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン									