

ソホスブビル及びリバビリン 症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用		
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置		
1	女 60代	C型肝炎 (なし)	400mg 8日間	副作用：高血圧，低カリウム血症，頻脈 高血圧の既往：なし アルコール摂取：機会飲酒，喫煙者 日付不明 心拍数 60/min 投与開始日 本剤及びリバビリン投与開始。 カリウム (K) 値 3.8mEq/L，血圧 150mmHg 投与8日目 高血圧，低カリウム血症，頻脈発現のため入院。 (投与中止日) 本剤及びリバビリン投与中止。 血圧211/115mmHg，心拍数132/min，K値 3.0mEq/L 高血圧，低カリウム血症，頻脈に対し，スピロラクトン， ニフェジピンを投与。 投与中止1日後 血圧124/62mmHg，心拍数 60/min，K値 3.9mEq/L。 高血圧，低カリウム血症，頻脈の転帰回復。 投与中止4日後 退院。本剤再投与せず。		
臨床検査値						
			投与前 (日付不明)	投与開始日	投与8日目 (投与中止日)	投与中止 1日後
			60	—	132	60
			—	150	211/115	124/62
			—	3.8	3.0	3.9
併用薬：リバビリン，ロキソプロフェンナトリウム水和物，フルスルチアミン塩酸塩，レバミピド，ファモチジン，イソロイシン・ロイシン・バリン，プロチゾラム						