

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用											
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置											
1	女 70代	胆管炎 (慢性糸球体腎炎、膵臓癌)	2g 6日間	舞踏病様運動 投与1日前 慢性糸球体腎炎で維持透析施行中、膵臓癌のため化学療法導入目的に入院。 投与開始日 発熱および血圧低下を認め、胆管炎の診断で本剤投与開始。 投与6日目 四肢に舞踏病様運動が出現。 (投与中止日) 本剤の投与中止しゲンタマイシンに変更。 中止1日後 不随意運動みられた。 中止2日後 不随意運動消失。											
臨床検査値 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>投与中止日 (当日の投与前)</th> <th>投与中止 1日後</th> <th>投与中止 4日後</th> <th>投与中止 7日後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本剤血清中濃度 (μg/mL)</td> <td>450</td> <td>488</td> <td>428</td> <td>195</td> </tr> </tbody> </table>							投与中止日 (当日の投与前)	投与中止 1日後	投与中止 4日後	投与中止 7日後	本剤血清中濃度 (μg/mL)	450	488	428	195
	投与中止日 (当日の投与前)	投与中止 1日後	投与中止 4日後	投与中止 7日後											
本剤血清中濃度 (μg/mL)	450	488	428	195											
併用薬：情報なし															