

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
1	男 60代	2型糖尿病 (腎機能低下 (クレアチニン2.6), 高血圧, 高脂血症, 高尿酸血症, リウマチ)	0.75mg/週 50日間	<p>腹痛 嘔吐 脱水 腎前性腎不全 既往歴：不明 アレルギー歴・家族歴・前治療歴：不明 過去の副作用歴：なし 腎疾患、腎血管疾患、膠原病性脈管疾患、腎結石症、その他の血管疾患（例：網膜症等）：なし</p> <p>投与開始日 外来にて本剤0.75mg/週を導入 投与1ヵ月後 診察時には副作用を訴えることなく投与を継続 投与50日後 本剤最終投与 (投与中止日) 投与中止7日後 腹痛，嘔吐あり (発現日) 投与中止12日後 救急外来受診。 炎症反応上昇，発熱等感染を疑わせる所見なし 脱水所見を認めたため，入院の上，補液加療を開始 鎮痛薬も服用（詳細不明） 腹痛，嘔吐は軽快，食事摂取も良好となった 脱水による腎前性腎不全を認めた（ショック等の急激な腎血流低下のエピソードあり） 夜間頻尿，嗜眠あるいは傾眠，ミオクローヌス，浮腫，精神状態変化，発作，昏眠，その他の徴候/症状：なし 補液，飲水励行し，脱水，腎前性腎不全は軽快</p> <p>投与中止17日後 腎機能が改善したため，退院 本剤の再投与なし</p>

臨床検査値

	投与中止 12日後	投与中止 13日後	投与中止 14日後	投与中止 17日後
ノロウイルス抗原	(-)	-	-	-
総蛋白 (g/dL)	7.3	-	-	-
BUN (mg/dL)	65	-	65	42
クレアチニン (mg/dL)	3.44	-	3.88	2.44
eGFR (mL/min/1.73m ²)	15	-	13	22
尿比重	-	1.019	1.012	1.012
尿蛋白 (mg/日)	-	100	30	100
尿糖	-	(-)	(-)	(-)
尿ケトン体	-	(-)	(-)	(-)
尿潜血	-	(-)	(-)	(-)
カリウム (mEq/L)	4.2	-	3.9	4.3
ナトリウム (mEq/L)	134	-	135	137
クローム (mEq/L)	97	-	101	105
カルシウム (mg/dL)	9.2	-	8.2	7.8
白血球 (/μL)	10500	8900	10100	9000
CRP (mg/dL)	0.077	-	0.031	-

併用療法：食事療法，運動療法

併用薬：サラゾスルファピリジン，プレドニゾロン，インスリン リスプロ，グリメピリド，ピオグリタゾン，ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド，フェブキソスタット，シルニジピン，ピタバスタチンカルシウム